

光緒二十五年新年鑄

皮膚新編



北京中医药大学图书馆版权所有

皮膚新編

皮膚諸症論

夫皮膚之症不一而足大抵初患症者該處之皮則或變色及畧發紅或生鱗及生癢粒或生水泡及生大水泡或生小瘡及生細軟肉瘤其各種形狀醫者宜平日洞悉於中也若患症畧久者則該皮或變爛或出嚙或結靨或生疤甚至全愈後而該處尙多暗昧醫者概宜細察也○一皮之變色有五 其一患症之處該皮則失去原色而變卻白色 其二細驗患處而恍若有枝相連者

則皮色因而變壞 其三若因疔毒而致者皮亦變色 其四或因微絲血管而血滯於內則該處之皮卽生黑點 其五或服硝強銀水等藥過多則皮亦將變黑色也○一皮色發紅有兩種 一因皮膚有患而卽行發出者 一因體內有症而始行發出者 蓋患症之處始則發紅漸則畧腫而且按之則熱及有刺痛大約經數日而各弊始散也散後則或脫去上面之皮或出嚙或該處皮畧生厚醫者亦宜驗及○一論癢粒蓋癢粒之形畧尖畧凸而畧硬其色則白或畧帶紅而惟粒底則不甚覺紅也若小粒之頭

間或畧函清水而一經搔破則將有水及微血流出大抵其生在四肢之外者該粒則雖小而頗硬其生在四肢之裏及面頸等處者該粒則畧大而頗軟惟手心腳心則鮮生是症他如因疔毒而致者其癢粒則較大此則或散開而生或合聚而生也而惟合聚於一處者則將由漸而生潤所以患此症者時有作癢皮亦因而畧厚斷非一朝一夕所能治者也○一論小水泡蓋此泡先由內層水漲故外層之皮卽凸起也顧此症有分開而生者有相連而生者該泡若破卽流清水迨清水流畢而患口仍有膿水滲出將

來結靨卽在此患處也又有濁水流之過多及出嚙畢而頓變爲乾者如此則患處多屬紅色或並有裂罅也○一論大水泡夫生此泡者或小如白豆或大如朱李而要之小者亦未幾而變大也大抵將起症處先發紅色而後生泡其泡所函之水始則甚清漸則變黃久則變紅而一經破後則或結黃靨或結黑靨若將該靨挑去則見其靨下之肉紅且爛也且此泡有只生一顆者有迭生數顆者若屬數顆則或散開而生或連環而生醫者亦宜察也○一論小瘡凡起小瘡者亦先由內層膿水發漲故外層之皮卽凸

起也但此症有兩種 一種係一起卽函膿者 一種係始則函
水未幾而變爲膿者而且該瘡形狀亦有三者不同 一係尖而
硬的其瘡底畧帶紅色此則多生於毛管之處也 一係生而較
大者其形凸其色紅而瘡底亦頗硬迨至結靨其靨亦厚而黑也
一係其形甚尖而多生於頭上者醫者概宜細辨○一論生鱗
蓋鱗有兩種 一係由皮膚有患而生者 一係由體內有症而
後生者而且該鱗之形復有二者各殊 一種因外層之皮生多
搔之卽墜此其畧似鱗者則幼而薄也然而鱗亦有白而厚乾而

硬者醫者正宜分辨 一種按其鱗生之處若有油膩者醫者當
覈以顯微鏡則見其形而恍如有枝相連焉但此症時有發癢若
揭去該鱗而鱗底之肉則甚紅又况受症若深而患處則並有裂
罅也凡生鱗一症不外如此若夫結靨則不入生鱗之類學醫者
宜分晰焉○一論毒瘤蓋此瘤較大於癢粒而多屬軟的然亦間
有硬者也患此症者或由漸出膿或不久自消彼俗名大沙蹄與
蠶食桑之症卽屬此種而且西醫所謂間沙欹賚及附廉卑時了
等症亦屬此類但此症有受毒甚深者有受毒尙淺者其在深症

則週身有毒縱將患處割去而仍慮復發其在淺症則惟患處有
毒若將該處割去卽不復發也 已上一切病狀學醫者皆宜深
究



北京中医药大学图书馆版权所有

第二册

目錄正十二節至卷之十三節 論以醫入儒以儒入醫

第二册

目錄正十二節至卷之十二節 論五臟六腑之原

第一册

目錄一節至卷之十一節 論五臟六腑之原

史傳全卷

共一百二十人論 內參八册

第二册

目錄正十二節至卷之十二節 論五臟六腑之原

第一册

目錄一節至卷之十一節 論五臟六腑之原

史傳全卷

共一百二十人論 內參八册

史傳全卷



北京中医药大学图书馆版权所有

皮膚新編目錄

皮膚全卷

共一百二十八節

內分八冊

第一冊

自第一節起至第十一節止○論皮膚諸症之大端

第二冊

自第十二節起至第五十二節止○論皮膚之乾症

第三冊

自第五十三節起至第七十三節止○論皮膚之濕症

第四冊

自第七十四節起至第八十八節止○論皮膚發膿瘡

第五冊

自第八十九節起至第九十八節止○論皮膚浮腫

第六冊

自第九十九節起至第一百零六節止○論皮膚色變



中國醫藥大學圖書館版權所有

第七冊

自第一百零七節起至第一百一十九節止○論皮膚之症專向毛髮等處而生

第八冊

自第一百二十節起至第一百二十八節止○論皮膚之症係因疔毒而致及大小雜症

另附各藥方

第三冊

自第五十三節起至第六十三節止○論皮膚之症

第二冊

自第十二節起至第五十二節止○論皮膚之症

第一冊

自第一節起至第十一節止○論皮膚之症

皮膚全卷

共一百二十八論 內發八冊



南京中医药大学图书馆藏

皮膚新編

美國 嘉約翰口譯

莆田 林湘東筆述

皮膚全卷 共一百二十八節○內分八冊

第一冊 自第一節至第十一節○論皮膚諸症之大端

第一節 大抵皮膚之症甚多學醫者正宜細察蓋皮膚初患症時原易分別若日久則形狀變更將類於別症是豈得不留心細辨乎推其故固由患症已深而或因衣服觸傷或因發癢搔破等



情亦能令形狀之變更也又况皮膚等症有不能傳染於人者亦有能傳染於人者學醫者宜先熟悉各種形圖而後臨症庶能辨別

第二節 凡皮膚發炎而症即起焉其生出諸般病狀蓋較諸內皮發炎爲更多也醫者欲分斷各症則平日宜將各種形狀考覈清楚始有定見

第三節 人身之皮有三層而惟外層之皮則毛管極多也蓋該管有生毛者有發汗者有出油者誠以該管之裏則有微細脈管



中國醫藥大學圖書館版

微細迴血管與及腦氣筋而後有此功用也若夫皮之有微凸者
在西國則名爲霸卑離倘霸卑離生大卽屬俗名飯嚙之類至外
層之皮或變厚硬則將起雞眼之症醫者悉當深察之也

第四節 皮上出油之管倘有室礙則該管處漸起黑暗之色此

因油積滯而然也若用指捻之使出則管口所出者恍如纖細之

蟲他如該管發炎西國則名爲阨呢

卽俗名紅酒蠟

醫者嘗以顯微鏡覈

之則見其管裏而有微蟲所伏也但該蟲之頭每多向入此不過
油積所致而要不能爲患至若管口阻塞脹大而致成細瘤西醫

則名爲摩羅士金此尤宜細驗也

第五節 皮膚之症其恍如有枝相連者蓋有三種大抵生於髮裏者則有兩種屬於皮膚生鱗者則有一種醫者欲觀其形卽於患處取些髮鱗而先浸以鈎養水後覈以顯微鏡則見其形狀參差而若有枝相連也

第六節 此論天呢了化逋沙之症而有枝相連者也其症詳下

第一百零八節

圖見第一

第七節 此論天呢了

丹蘇欄之症而有枝相連者也其症詳下

第一百一十三節

圖見第二

第八節

此論人身生

蝨宜祓除也但蝨有三種

一種生於髮

內者若小兒髮內有蝨

則將因此而生別症也

一種生於衣裏

者若老人衣裏有蝨則

將因此而生癢癬也

一種生於陰毛之

處

即俗名三角蝨

患此蝨者亦

將生癢癬也

圖見第三

第九節

此論濕癩之有蟲者也若手上生之則該癩之旁將現

出一曲路之形而即有微蟲伏在路後由是該蟲復生縈於路上

則為患將漸深矣顧此蟲無論牝牡均有八足所少異者牝蟲則

畧大而牡蟲則畧小耳至該蟲所生之癩大約歷十一日則成爲小蟲迄十八日則先生六足於是小蟲並脫去上面之皮而卽生齊八足也圖見第四醫者欲驗該癩之蟲宜先令其洗淨大抵癩粒之旁而見有白點發現者此卽有蟲伏在裏也醫者宜用小刀尖輕輕挑破上面之皮卽行取出此蟲放在玻片而用顯微鏡覈之則該蟲之形自可細察至於癩粒之旁其有現出一路者亦有不現出一路者醫者又宜辨也○又法欲驗該蟲宜用鎊養五分清水八錢和勻卽揭起癩靨放入同煎俟水滾則倒在磁杯此杯宜上潤下尖的