

三

醫
術
學
心
悟



南京中醫藥大學圖書館版權所有

醫學心悟第三

天都普明子程國彭鍾齡著

中風門

中風者真中風也。有中腑中臟中血脈之殊。中腑者中在表也。外有六經之形症。與傷寒六經傳變之症無異也。中太陽用枝枝湯。中陽明葛根湯加桂枝。中少陽小柴胡湯加桂枝。其法悉具。傷寒門茲不贅。中臟者中在裏也。其人眩仆昏冒不醒人事。或痰聲如曳鋸。宜分臟腑寒熱而治之。假如其人素痰虛寒。或暴中新寒。則風水相遭。寒水徹骨。而風爲寒風矣。假如其人素有積熱。或鬱火暴發。則風乘火勢。火借風威。而風爲熱風矣。爲



熱風多見閉症其症牙關緊急兩手握固法當疏風開竅先用
搐鼻散吹之次用牛黃丸灌之若大便閉結腹滿張悶火勢極
盛者以三化湯攻之爲寒風多見脫症其症手撒脾絕眼合肝
絕口張心絕聲如鼾肺絕遺尿腎絕更有兩目直視搖頭上竄
髮直如粧汗出如珠皆脫絕之症法當溫補元氣急用大劑附
子理中湯灌之若痰涎壅盛以三生飲加人參灌之間亦有寒
痰壅塞介乎閉脫之間不便驟補者用半夏橘紅各一兩濃煎
至一杯以生薑自然汁對沖頻頻灌之其人卽甦然後按其虛
而調之然子自揣生平用附子理中治愈者甚多其用牛黃丸
治愈者亦恒有之惟三化湯一方並未舉用此必天時地土人



事之不同。然寒熱之劑。屹然並立。古方具在。法不可泯。故兩存之。以備參酌。中血脉者。中在經絡之中也。其症口眼歪斜。半身不遂是也。大秦朮湯主之。偏在左。倍用四物湯。偏在右。佐以四君子湯。左右俱病。佐以八珍湯。並虎骨膠丸。此治真中之大法也。

口噤角弓反張。癱病也。但口噤而兼反張者。是已成癱也。小續命湯。口噤而不反張者。是未成癱也。大秦朮湯。其癱病俱見。前傷寒兼症中。宜細加查核。

不語有心脾腎三經之異。又有風寒客于會厭。卒然無音者。大法若因痰迷心竅。當清心火。牛黃丸。神仙解語丹。若因風痰聚。



于脾經當導痰涎二陳湯加竹瀝薑汁並用解語丹若因腎經虛火上炎當壯水之主六味湯加遠志石菖蒲若因腎經虛寒厥逆當益火之源劉河澗地黃飲子或用虎骨膠丸加鹿茸若風寒客于會厭聲音不揚者用甘桔湯加疎散藥遺尿謂之腎絕多難救然反目遺尿者為腎絕若不反目但遺尿者多屬氣虛重用參耆等藥補之則愈

桂枝湯

葛根湯

小柴胡湯

俱見傷寒

搐鼻散

治一切中症不醒人事用此吹鼻中有嚏者生無嚏

者難治

細辛

去葉

皂角

去皮弦 各一兩

半夏

生用 五錢



為極細末、磁瓶收注、勿泄氣、臨用吹一二分入鼻孔中、取嚏

牛黃丸 治中風痰火閉結、或癩癰癰癩、語言蹇澁、恍惚眩暈

精神昏憤、不省人事、或喘嗽痰壅、煩心等症

牛黃 六錢

射香

龍腦 以上三味另研 羚羊角

當歸 酒洗

防風

黃芩 米白炒

柴胡 炮炙

白朮 酒洗

麥冬 去心

白芍 各七錢

桔梗 大對

白茯苓

杏仁 去尖

川芎

大豆黃卷 刮不

阿膠 各八錢 五分

蒲黃

人參 去蘆

神曲 各一兩 錢五分

雄黃 另研 四錢

甘草 二兩

白斂 五錢

肉桂 去皮

乾薑 各三錢 七分

犀角 一兩

乾山藥 三兩

大棗 五十枚 蒸

爛去皮



金箔 六百五十片內
存二百片為衣

為細末、煉蜜同棗膏丸、每兩作十九丸、用金箔為衣、每服一丸、溫水化下、

三化湯 治中風入臟、熱勢極盛、閉結不通、便溺阻隔、不行及風火相搏、而為熱風者、本方主之。設內有寒氣、大便反鞭、名曰陰結、陰結者、得和氣、煖日寒冰自化、不可誤用攻藥、誤即能復救、慎之、慎之、

厚朴 姜汁炒

大黃 酒蒸

枳實 麩炒

羌活 各一錢五分

水煎服

附子理中湯 見中寒 治寒風中臟、陰冷極盛、脫症隨見、此風。



水相遭而為寒風者急服此藥猶可得生夫病屬脫症設設用疏通開竅之藥如人既入井而又加以石也必須參附大劑飲之方為合法

三生飲 治寒風中臟六脈沉細痰壅喉響不省人事乃寒痰厥逆之候

厥逆之候

生南星

生烏頭去皮尖

生附子各一錢五分

生薑五斤

生木香五分

水煎服○薛立齋云三生飲乃行經絡治寒痰之涼藥斬關

奪旗之神劑每服必用人參兩許駕馭而行庶可驅外邪而

補正氣否則不惟無益適以取敗觀先哲用芪附木附參附



等湯其義可見

大秦芎湯

治風中經絡口眼歪斜半身不遂或語言蹇澀及

血濁不能養於筋宜用養血疏風之劑經云治風先治血

行風自滅是也

秦芎

一錢五分

甘草

炙

川芎

當歸

芍藥

生地

熟地

自製

茯苓

羌活

獨活

白朮

防風

白芷

黃芩

酒炒各八分

細辛

水煎服如或煩躁口渴加石膏一錢五分陰雨加生薑三片

春夏加母八分



竊謂本方初時宜用若日久則以四物四君為主而以風藥

佐之庶收全功

四物湯 四君子湯

八珍湯 俱見虛症

虎骨膠丸 見痺症

小續命湯 見傷寒發瘧

六味湯 見後類中門

甘桔梗湯 見傷寒咽痛

神仙解語丹

白附子 炮

石菖蒲 去毛

遠志 去心甘草水炮炒

天麻

全蝎 去尾甘草水洗

南星 牛膽製多次更佳各一兩

木香 五錢

右為末麵湖丸龍眼大每服一丸薄荷湯下



二陳湯

陳皮

茯苓

半夏

薑汁炒

炙草

各一錢五分

加入大棗二枚水煎服

地黃飲子

熟地

九晒晒二錢

巴戟

去心

萸肉

去核

肉蓯蓉

酒浸倍

石斛

附子

炮

五味

炒

白茯苓

各一錢

石菖蒲

去毛

桂心

麥冬

去心

志遠志

去心甘草水

入薄荷少許薑一片棗二枚水煎服。氣虛加人參

二錢

甘桔湯

見傷寒咽痛

類中風



類中風者。謂火中虛中溼中寒中暑中氣中食中惡中也。共有八種。與真中相類而實不同也。然類中有與真中相兼者。須細察其形症而辨之。凡真中之症。必連經絡。多見歪斜偏廢之候。與類中之專氣致病者。自是不同。然而風乘火勢。邪乘虛入。寒風相搏。暑風相炫。飲食招風。種種變症。所在多有。務在詳辨精細。果其爲真中類。則用前驅風法。果其爲類中風。則照本門施治。果其爲真中類中相兼也。則以兩門醫法合法之。斯無弊耳。

茲舉類中諸症。詳列於左。俾學者觸目洞然也。

一曰火中。火之自外來者。名曰賊寔火也。火之自內出者。名曰子虛火也。中火之症。良由將息失宜。心火暴盛。腎水虛衰。不

能制之故卒然昏倒不可作寔火論假如怒動肝火逍遙散
心火鬱結牛黃清心丸肺火壅遏貝母瓜蒌散思慮傷脾加
味歸脾湯腎水枯涸虛火上炎者六味地黃湯若腎經陽虛
火不歸原者八味地黃湯劉河澗地黃飲子並主之此治火
中之法也或問火中而用桂附者何也答曰腎陽飛越則丹
田虛冷其痰涎上壅者水不歸原也面赤煩躁者火不歸原
也惟桂附入味能引火歸原火歸水中則水能生木木不生
風而風自熄矣

二曰虛中凡人體質虛弱過于作勞傷損元氣以致痰壅氣浮
卒然昏倒宜用六君子湯主之中氣下陷者補中益氣湯主



之。

三日溼中溼中者。卽痰中也。凡人嗜食肥甘。或醇酒乳酪。則溼從內受。或山嵐瘴氣。久雨陰晦。或遠行涉水。坐臥溼地。則溼從外受。溼生痰。痰生熱。熱生風。故卒然昏倒。無知也。蒼白。陳湯主之。

四日寒中。凡人暴中于寒。卒然口鼻氣冷。手足厥冷。或腹痛。下利清穀。或身體強硬。口噤不語。四肢戰搖。此寒邪直中于裏也。宜用姜附湯。或附子理中湯。加桂主之。

五日暑中。凡人務農于赤日。行旅于長途。暑氣逼迫。卒然昏倒。自汗面垢。昏不知人。急用千金消暑丸灌之。其人立甦。此藥

有回生之功。一切暑藥皆不及此。村落中各宜預備。灌醒後以益元散清之。或以四味香薷飲去厚朴。加丹參、茯苓、黃連。治之。虛者加人參。餘詳論傷暑門。

六日氣中七情氣結。或怒動肝氣。以致氣逆痰壅。牙關緊急。極與中風相似。但中風生熱。中氣身涼。中風脈浮。中氣脈沉。且病有根由。必須細究。宜用木香調氣散主之。

十日食中醉飽過度。或着腦怒。以致飲食填塞胸中。胃氣不行。卒然昏倒。宜用橘紅二兩。生薑一兩。炒鹽一撮。煎湯灌而吐之。次用神木散和之。其最甚者。胸高滿悶。閉而不通。或牙關緊急。厥暈不醒。但心而溫者。卽以獨行丸攻之。藥既下咽。其

人或吐或瀉自應漸甦若瀉不止者以冷粥湯飲之即止

八日惡中登塚入廟冷屋棲遲以致邪氣相侵卒然錯落妄言

或頭面青黯昏不知人急用葱薑湯灌之次以神木散調之

蘇合丸亦佳

加味逍遙散 治肝經鬱火胸脇脹痛或作寒熱甚至肝木生

風眩暈振搖或咬牙發瘕一目斜視一手一足搐搦此皆肝

氣不和之症經云木鬱遠之是已

柴胡

甘草

茯苓

白朮

當歸

白芍

丹皮

黑山枝

薄荷

各一錢五分

水煎服



牛黃清心丸

見真中門

貝母瓜蒌散

貝母 二錢

瓜蒌仁 一錢五分

胆南星 五分

黃芩

橘紅

黃連 炒各一錢

甘草

黑山梔 各五分

水煎服

加味歸脾湯

黃耆

一錢五分

人參

白朮

茯神

當歸

棗仁

炒各一錢

遠志

去心

甘草

各七分

丹皮

黑山梔

各八分

元眼肉五枚水煎服

