

治準繩第四冊目錄

諸痛門

頭痛

偏頭風 眉稜骨痛

雷頭風

真頭痛 頭風屑

犬頭痛 頭重

頭搖

面痛

頸項強痛

心痛胃脘痛

膈痛 心痞

胸痛

腹痛

少腹痛

脇痛

腰痛

腎着 零軟

腰膝痛

脊痛脊強

肩背痛

臂痛

身體痛 身體拘急

痿痺門

痺

行痺

即走注疼痛

痛痺

即痛風

着痺

即麻木

痿

痿厥

脚氣

訂治準繩第四冊

金壇王肯堂輯

頭痛

偏頭風
眉稜骨痛

雷頭風

大頭天行

頭風屑

頭重

頭搖

醫書多分頭痛頭風爲二門然一病也但有新久去留之分耳淺而近者名頭痛其痛卒然而至易於解散速安也深而遠者爲頭風其痛作止不常愈後遇觸復發也皆當驗其邪所從來而治之世俗治頭痛不從風則從寒安知其有不一之邪乎試考內經論頭痛所因以明之

如風從外入振寒汗出頭痛新沐中風爲首風
當先風一日頭痛不可以出內大寒內至骨髓
髓以腦爲主腦逆故頭痛齒亦痛少陽司天之
政初之氣風勝乃搖候乃大濕其病氣怫於上
頭痛二之氣火反鬱白埃四起其病熱鬱於上
頭痛少陽司天火淫所勝民病頭痛發熱惡寒
如瘧歲金不及炎火乃行復則陰厥且格陽反
上行頭腦戶痛延及腦頂發熱太陽之勝熱反
上行頭項頂巔腦戶中痛目如脫太陽之復心

痛痞滿頭痛太陰司天濕淫所勝腰脊頭項痛
時眩太陰在泉濕淫所勝病衝頭痛目似脫項
似拔太陰之復頭項痛重而掉憊尤甚陽明之
復欬噦煩心病在膈中頭痛傷寒一日巨陽受
之頭項痛腰脊強靈樞謂風痺股脛爍足如履
水時如入湯煩心頭痛時眩悲恐短氣不出三
年死凡此皆六氣相侵與清陽之真氣相薄而
痛者也至於頭痛甚則腦盡痛手足寒至節死
頭痛巔病下虛上實注以腎虛不能引膀胱之

氣故爾心煩頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生
心熱病者卒心痛煩悶頭痛面赤刺手少陰太
陽肺熱病者頭痛不堪汗出而寒刺手太陰陽
明腎熱病者項痛員員澹澹然刺足少陰太陽
靈樞謂厥頭痛面若腫起而煩心取足陽明太
陰厥頭痛頭脉痛心悲善泣取血與厥陰厥頭
痛貞貞頭重而痛取手足少陰厥頭痛意善忘
按之不得取頭面左右動脉後取足太陰厥頭
痛項先痛腰脊爲應先取天柱後取足太陽厥

頭痛頭痛甚耳前後脉湧有熱瀉出其血後取
足少陽頭痛不可取於膺者有所擊墮惡血在
於內若肉傷痛未已可側取不可遠取也頭痛
不可刺者大痺爲惡日作者可令少愈不可已
頭半寒痛先取手少陽陽明後取足少陽陽明
膀胱足太陽所生病頭顙頂腦戶中痛膽足少
陽所生病頭痛凡此皆藏府經脉之氣逆上亂
於頭之清道致其不得運行壅遏經隧而痛者
也蓋頭象天三陽六府清陽之氣皆會於此三

陰五藏精華之血亦皆注於此。於是天氣所發
六淫之邪，人氣所變五賊之逆，皆能相害。或蔽
覆其清明，或瘀塞其經絡，因與其氣相薄鬱而
成熱。則脉滿滿則痛。若邪氣稽留，則脉亦滿而
氣血亂，故痛甚。是痛皆爲實也。若寒濕所侵，雖
真氣虛，不與相薄，成熱然其邪客於脉外，則血
泣脉寒。寒則脉縮卷，緊急外引小絡而痛，得溫
則痛止。是痛爲虛也。如因風木痛者，則抽掣惡
風。或有汗而痛，因暑熱痛者，或有汗或無汗，則

皆惡熱而痛因濕而痛者則頭重而痛遇天陰
尤甚因痰飲而痛者亦頭昏重而痛憤憤欲吐
因寒而痛者絀急惡寒而痛各與本藏所屬風
寒濕熱之氣兼爲之狀而痛更有氣虛而痛者
遇勞則痛甚其脉大有血虛而痛者善驚惕其
脉芤用是病形分之更兼所見證察之無不得
之矣 東垣曰金匱真言論云東風生於春病
在肝俞在頸項故春氣者病在頭又諸陽會於
頭面如足太陽膀胱之脉起於目內眦

顛直入絡腦還出別下項病則衝頭戶

陽膽之脉起於目銳眥上抵頭角病則頭角額
痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客經絡
令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其
陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭
痛也頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣
虛頭痛也如氣上不下頭痛顛疾者下虛上實
也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也有
厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓以腦爲主

腦逆故令頭痛齒亦痛有心煩頭痛者病在膈
中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也凡頭痛
皆以風藥治之者總其大體而言之也高巔之
上惟風可到故味之薄者陰中之陽自地升天
者也然亦有三陰三陽之異 太陽經頭痛惡
風寒脉浮緊川芎獨活之類爲主 少陽經頭
痛脉弦細往來寒熱用柴胡黃芩主之 陽明
經頭痛自汗發熱不惡寒脉浮緩長實者升麻
葛根石膏白芷主之 太陰經頭痛

重或腹痛爲痰癖脉沉緩者蒼朮半夏南星主之
少陰經頭痛三陰三陽經不流行而足寒氣逆爲寒厥其脉沉細麻黃附子細辛湯主之
厥陰經頭疼項痛或吐痰沫冷厥其脉浮緩吳茱萸湯主之
三陽頭痛藥羌活防風荆芥升麻葛根白芷柴胡川芎芍藥細辛葱白連鬚
陰證頭痛只用溫中藥如理中薑附之類
風濕熱頭痛上壅損目及腦痛偏正頭痛年深不愈並以清空膏主之如苦頭痛每料中加細辛

二錢如太陰脉緩有痰名曰痰厥頭痛去羌活
防風川芎甘草加半夏一兩半如偏頭痛服之
不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍如發
熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加白芷
丹溪云東垣清空膏諸般頭痛皆治惟血虛頭
痛從魚尾相連痛者不治又云治少陽頭痛如
痛在太陽厥陰者勿用蓋謂二巔痛也

頭旋眼黑頭痛宜安神

散川芎散

熱厥頭痛雖嚴寒猶喜風寒微來

暖處或見煙火其痛復作宜清上瀉火湯後用

補氣湯

風熱頭疼石膏散荆芥散

寒犯腦令人腦痛齒亦痛名曰厥逆也

中宜羌活附子湯 頭痛胸中痛 長減少咽嗑

不利寒冷脉左寸弦急宜麻黃吳茱萸湯 濕

熱在頭而頭痛者必以苦吐之輕者用透頂散

搐鼻取涎 新沐中風爲首風頭面多汗惡風

當先風一日則病甚至其風日則少愈大川芎

丸主之 風氣循風府而上則爲腦風項背怯

寒腦戶極冷神聖散主之 凡治頭痛皆用芎

芷羌防等辛溫氣藥升散者由風木虛不能升

散而土寡於畏得以壅塞而痛故用此助肝木
散其壅塞也若風盛踈散太過而痛服辛散藥
反甚者則宜用酸澀收而降之乃愈乳香盞落
散之類是也

已上
外因

頭痛耳鳴九竅不利腸胃

之所生東垣以爲此氣虛頭痛也用人參黃芪

主之

羅謙甫治栢叅謀六十一歲先患頭昏

悶微痛醫作傷寒解之汗出後痛轉加復汗解
病轉加而頭愈痛每召醫用藥雷同到今痛甚
不得安卧惡風寒不喜飲食脉弦細而

促嬾言語經曰春氣病在頭今年高氣

不能上升頭面故昏悶此病本無表邪因發汗
數四清陽之氣愈虧損不能上榮亦不能外固
所以病增甚宜升陽補氣頭痛自愈製順氣和
中湯經曰陽氣者衛外而爲固也誤汗之衛外
之氣損故黃芪甘溫補衛實表爲君人參甘溫
補氣當歸辛溫補血芍藥味酸收衛氣爲臣白
朮陳皮炙甘草苦甘溫養衛氣生發陽氣上實
皮毛腠理爲佐柴胡升麻苦辛引少陽陽明之