

未 1

4341

外科輯要

上海千頃堂書局印行



中華民國八年五月

外科輯要

周毓邵署



干頃堂書局商標



南京中醫藥大學圖書館版權所有

外科輯要序

如春少客平湖受醫學於子雨邵先生後挈家與居鄰昕夕就教益饜飫所聞先生知識絕人遇事必以全力為之精思妙悟直抉軒岐之奧嘗述宋儒言曰閉門閱古方三年天下無不治之疾及出而施藥又患無可用之方無他聞見力竭應變為難耳故其治病也應若桴鼓踵門乞命者日數十輩晚年養病多暇遴選生平經驗之方有同於古者有不惜兼金購得者各萃一編蓋為不能醫者作也不能醫而使之能醫凡名物性味銖兩一一疏通證記之詮解其製方之法以著其已然之效以應山陬海澨倉卒之急若乃隨手之變神而明之即謂為能醫者作亦無不可也道光七年七月先生既捐館舍遐邇益神其方借鈔者廣至嗣君莘漁松樓昆仲因雕版公諸世屬如春任校訂之役謹釐為四卷名曰濟世外科輯要竊慨先生脩學勵行與年俱進惓惓愛人利物之念僅見諸醫今者聲歎已遠賸簡寥寥又未足以盡先生之學世之讀是編者其諸同明相照乎其諸得免忘蹄乎邇而行之推而廣之斯無負先生之仁心也已

道光九年七月既望門人周如春拜撰

凡例

一是編所集有出自醫方通用者有出自家藏秘錄者有得之友朋經驗者不拘一格惟用藥精當不複不漏期於中病

一集中所選方御纂醫宗金鑑為最多以金鑑彙萃羣書得其精要用者實能應驗如響先君子嘗謂瘍科方帙雖繁終不若此編可以折衷

一外科方論甚少是編取立方精義一一指明使用方者於陰陽虛實多寡因時變化知所棄取

一方有不著論者或方義明顯或已經前賢論定故無贅詞

一世傳經驗簡便之方藥品微賤取效每多神奇鄉村僻遠最能利濟所有諸方類附各症之後

一是集先君子為家塾便於幅閱而設本非欲以此行世故不著總論蓋以諸書無有不具者也近因友戚借抄者衆遂付梓人以公同善榆等亦不敢妄為增補

一先君子於各種醫書無所不覽義有疑誤每以單詞隻句解之而散見諸帙未易搜羅雖榆等錄成醫學偶評四卷亦僅十之一二仍慮觀者不見全書反生扞格故未敢梓行惟此種彙集成編自有部署凡瘍科諸症得其意而變通之可無入海遺珠之憾矣

乙丑七月男榆謹識

外科輯要卷一

當湖邵澍子雨氏輯

仙方活命飲

治癰疽瘡痂初起不論陰陽俱可服未成者即消已成者即潰為外科第一方

穿山甲炮

草節

土貝

花粉

白芷

各一錢腹募以此為君

皂角刺

背俞以此為君

赤芍

沒藥乳

香各五分

歸尾

陳皮

半各錢

銀花

二錢四股以此為君

防風

七分

右水酒冬半煎如單用酒煎將乳沒烘去油研末冲服恣飲盡醉更妙

加減法

在胸次加瓜蒌仁錢半疔瘡加草河車二錢

古方藥品無二惟分兩諸藥各一錢內銀花陳皮各三錢服法全上

此方如遇寒冷之時欲消散者須去銀花花粉加蘇葉荊芥兼引經藥方能有效如太陽麻黃羌活陽明升麻葛根白芷少陽柴胡太陰升麻白芷茅朮少陰細辛獨活厥陰川芎

六經各有部位各有現症不及備錄

托裏消毒散

治癰疽已成因氣血不足起發腐潰遲滯者服之令速起速潰真外科虛弱之神方初起潰後俱可服

生黃芪

人參

生白朮

歸身

川芎

白芍

銀花

茯苓

各一錢

白芷

角刺

桔梗

甘草各五

右十二味水兩盞煎八分食遠服

此方參芪朮草芍苓熟數味當大補者妙否則不固生則宣熱則滯故也



古方藥品內少結稜角刺二
味多連翹五五分兩稍殊

附 薛立齋加減六十二法

托裏諸方無過於此况有薛氏加減諸法條叙甚明醫者若能察表裏陰陽虛實寒熱增損一二味方為上工矣

高腫焮痛熱毒也加黃連

漫腫微痛氣虛也去銀花加參朮

漫腫微痛亦有因氣血滯者因胃寒者因冷藥圍敷者

頭痛發熱表邪也加川芎羌活

有表邪而元氣實者暫用剋防敗毒散

有裏邪而元氣實者可用黃連內疎等湯及貴金丸表裏俱實者可用神授衛生五香連翹等湯

色白惡寒表虛也去銀花加參芪

色白惡寒亦有冒寒亦有純陰

大熱飲冷便秘實熱也去參芪朮加大黃

微熱飲熱便溏內虛也去銀花加參朮

寒熱飲冷小便濇肝滯熱也去參芪加柴胡山梔不作膿膿不潰氣虛也去銀花加參朮桂

如不應暫用十全大補湯

腫赤作痛血凝滯也本方加乳香沒藥如不應暫用仙方活命飲

膿出反痛氣血虛也去銀花白芷角刺加參芪歸地

肉赤不斂血虛有熱也去銀花芒刺加生地丹皮

肉黯不斂陽氣虛寒也去花刺芒加參芪白薇桂

肉黯不斂亦有盡不化者腐肉不去者穢氣觸者

漫腫不痛或死肉不潰脾氣虛也去花芒加參朮不應加薑桂更不應急加附子

漫腫不痛死肉不潰



南京中醫藥大學圖書館藏

有寒凝者氣血
滯者毒不化者

肉白不飲陽氣虛也去花芷刺加參芪歸朮

膿多不飲氣血虛也去花芷刺加參芪歸朮地如不應暫用十全大補湯

食少不飲胃氣虛也去花芷刺加參芪不應暫用補中益氣湯

飲食難化瘡口不飲脾氣虛也去花芷刺加參朮不應暫用六君子湯更不應佐以八味丸

膿少而帶赤血虛也去芷刺加參歸地不應用八珍湯加丹皮

忿怒晡熱而出血肝火血虛也去芷刺加丹皮生地黑梔如不應暫用八珍湯送六味丸

晡熱而出血有肝氣
實者有陰虧發熱者

面青脇脹而出血肝虛不能藏血也去芷角刺加山萸山藥五味子如不應兼用六味丸

食少體倦而出血脾虛不能統血也去花刺加參芪朮歸地兼鬱結少寐加遠志棗仁茯

神龍眼如不應暫用歸脾湯

欲吐作嘔或內外涼藥所致或感寒邪穢氣而作或痛甚者胃氣虛也去花刺加藿香參

朮欲嘔作吐有外感風寒者
內傷飲食者毒氣上攻者

飲食少恩腸鳴腹冷腹痛泄瀉脾氣虛寒也去花芷刺加炮薑木香

手足逆冷脾氣虛寒也去花芷刺加炮薑木香附子送四神丸

飲冷作渴熱毒也加赤小豆知母不應暫用竹葉黃芪湯

善食作渴胃火也加石膏山梔不應暫用竹葉石膏湯

膿多作渴氣血虛也去芷刺加熟地五味不應暫用十全大補湯加五味麥冬

口乾舌燥腎氣虛也去花芷刺加熟地山萸山藥如不應兼用六味丸更不應佐以補中益

氣湯

口乾舌燥亦有餘熱未清者內傷津液者脾不運者

自汗內熱口乾胃氣虛也去花芷刺加參芪歸朮如不應用六君子湯

盜汗內熱口乾陰血虛也去芷刺加地黃麥冬五味如不應暫用當歸六黃湯

莖中痛而小便不利精內敗也去花芷刺加山萸山藥澤瀉如不應佐以六味丸

莖中痛而小便不利亦有餘熱未清者

濕熱下陷者

愈便愈痛愈痛愈便精氣竭也去花芷刺煎送六味丸

食少體倦口乾飲熱小便黃短脾肺虛熱也去花芷刺加五味子山萸如不應暫用六味丸

勞役便黃氣下陷也去花芷刺加升麻柴胡

午後溺短赤腎虛熱也去花芷刺加升麻如不應煎送六味丸

口燥便數腎水虧也去花芷刺加五味山萸山藥熟地如不應送六味丸

口燥便數亦有熱邪未徹者

四肢逆冷腎氣虛寒也去花芷刺加桂附不應佐以八味丸

食少體倦作渴胃虛也去花芷刺加參芪朮不應暫用補中益氣湯

體倦頭痛或眩暈中氣虛也去花芷刺加參麻不應暫用補中益氣加蔓荊子

體倦頭痛或眩暈亦有肝

風者陰
虧者

日晡頭痛或眩暈陰血虛也去花芷刺加熟地不應佐以六味丸

夢泄滑精頭痛眩暈或痰喘氣促者腎虛不能納氣也去花芷刺芎四味佐以六味丸如不

應是虛寒也用八味丸

脫血煩躁面目赤色煩熱作渴脉大而虛者去花芷刺加芪歸不應暫用當歸補血湯血脫症有

似白虎症氣脫症有似承氣症臨時極當謹慎

身熱惡衣欲投於水脉沈微細者氣脫發躁也去花芷刺加桂附不應暫用附子理中湯伯云陰虧脉必沈細沈極必浮細極必大陽

虧脉必浮大浮極必沈沈大極必細

多思不寐體痛盜汗脾血虛也去花芷刺加茯神遠志棗仁龍眼不應暫用歸脾湯

骨蒸寢汗口燥不能多飲腎氣虛也去花芷刺加五味子送六味丸

飲食而出汗胃氣虛也去花芷刺加參芪歸朮五味不效用六君子湯

睡後飽滿盜汗食滯也去花芷刺參朮加半夏不效用六君子湯食滯亦當兼化滯諸品

胸滿多痰脾氣虛也去花芷刺加桔夏不效用六君子加枳桔

晡熱多痰脾血虛也去花芷刺加參朮歸地不效用六君子加芎歸地

咳嗽多痰腎虧液泛也去花芷刺加山萸山藥熟地不效佐以六味丸咳嗽多痰亦有因外感者肺脾不運化者

忿怒胸痞肝氣滯也加柴胡山梔不效暫用補中益氣湯加枳桔或逍遙散

倦怠胸痞中氣虛也去花芷刺加參朮苓不效用八珍散加柴胡口苦寒熱往來肝火血虛也去芷刺加柴胡熟地口若寒熱往來亦有少陽本病者肝氣不和者

因怒寒熱往來肝火血虛也加柴胡酒炒黃芩不效用八珍加炒山梔炒棗仁酒炒黑龍胆

草

體倦寒熱往來肝脾氣滯也去花芷刺加參芪歸朮不應暫用補中益氣湯寒熱往來亦有少陽者當用小柴

胡湯是瘧疾兼痢疾治法無此二件方可照此加減法

內熱晡熱或寒熱往來陰血虛也去花芷刺加芍歸丹皮柴胡不效用八珍加丹皮

畏寒或寒熱往來胃氣虛也去花芷刺加參苓白朮升麻不效用補中益氣湯

脇痛痞滿或寒熱往來肝氣滯也去花芷刺加青皮木香不效用是氣血虛也更加芍歸參朮

婦人勞役恚怒或通經行發熱譫語或夜間熱甚此邪在血分也去花芷刺加生地丹皮柴

胡不效暫用加減四物湯此為熱入血室經適來而斷者為實宜小柴胡湯去參加桃仁紅花歸尾赤芍等通瘀之品適去而病者為虛宜小柴胡湯兼四物

湯

或誤服剋伐之劑或膿血大泄或因吐瀉或因入房或因勞損以致發熱頭痛小便淋瀝或

滑脫便血目赤煩喘氣短頭暈體倦熱渴意欲投水身熱惡衣揚手擲足腰背反張鄭聲自

汗此陽氣欲脫之假熱症也去花芷刺桔芎急加桂附脫陽症最易誤認承氣白虎等法

畏寒頭痛咳逆嘔吐耳瞶目矇小便自遺瀉利腸鳴裏急腹痛玉莖短縮牙齒浮痛肢體麻

木或厥冷身疼或咬牙齧唇此陽明欲陷之真陰症也去花主刺桔急加桂附真陰症仲景有四逆湯等法

以前加減諸法治未潰者少治已潰者多因潰後宜溫宜補故也用者審之然其中或有疑義各註於每條之後以待臨時酌用

人參敗毒散治癰疽瘡痂初起惡寒發熱頭痛體疼筋骨急拘者服之即能消散若金石膏梁諸發及丹毒大毒或已成潰後元虛者俱不可服

人參羌活獨活前胡柴胡桔梗枳殼川芎茯苓生甘草錢各一

右水煎服

附加減法

秉氣實者去參表邪重者加荆防各一錢鸕鷀瘟檢頸瘟加薄荷一錢炒粘子錢半元虛者

人參加倍

此方朱南陽所定凡春秋之間一切瘡痢內外諸難症初起元實者用之若神

神授衛生湯治癰疽疔瘡對口丹瘤諸毒症服之宣熱散風行瘀活血消腫解毒乃表裏兩實之劑功效甚速元虛者不可服潰後不可服

角刺歸尾金銀花天花粉草節石決明錢各一防風羌活白芷甲片炮

連翹紅花各六分乳香沈香各五分大黃錢半酒炒

右水煎服病在上先飲酒一盃服藥病在下服藥後飲酒一盃

症有外因者為風寒暑濕所致有內因者為金石膏梁所致此方治內外兩因故表裏並用

但有表者敗毒散但有裏者內疏黃連湯無表裏者仙方活命飲元虛者托裏消毒散加減若果疔毒惡瘡必須兼服奪命丹梅花點舌丹蟾礬丸護心散諸藥方能濟

內疏黃連湯治瘡瘍陽毒在裏惡熱發狂便秘煩渴六脉沈數有力者急服之以除裏熱有表症者不可服元虛潰後亦不可服

山施仁 連翹 薄荷 川連 條芩 桔梗 當歸 白芍炒 生木香 花檳榔錢各

生草梢五 大黃錢半元虛者酒製

右水煎食前服如生蜜二三匙亦妙

此即涼膈散去芒硝加當芳和陰木香檳榔和氣耳若果裏實脉有力者方可暫服一二劑否則必不可服以防內陷之患涼膈加當歸一錢名曰轉舌膏

陽和湯治陰毒白疽一切陰症兼治寒凝疼痛紅腫陽症勿服

大熟地一兩 白芥子炒二錢 鹿角膠錢三 肉桂桂枝更妙 生甘草錢各一 炮薑炭 麻黃各五分

右水煎服後更飲酒一盃以助藥力未成即消已成即潰

前托裏消毒散但能治氣血不足之症若真陰症未必有致雖古方頗多回陽溫經諸法皆剛燥之藥於氣血虛弱者不宜推王洪緒立此方真能從至陰之處透至陽分轉重為輕允稱良劑故近時吳江徐氏每逢虛弱者用鹿角霜陰症用鹿角膠凡剛燥之藥盡知迴避焉知非此方之力歟

方內麻桂得熱地則不致熱地得麻桂則不膩白芥子者驅經絡中之寒痰即向道之意耳

陽和一為白疽骨疽流注而設故熱地為君大滋腎水鹿膠為臣溫養腎氣佐以白芥

炮薑宣通經絡使以麻桂開通腠理何不以加附子以為少陰報使自內及外連建奇功

何反用甘緩留連之品耶似有可議

回陽湯治白疽初起平塌不痛症屬純陰者此因脾胃虛寒或損元或腹痛泄瀉嘔吐厥逆

炮薑 熟附 歸身 炙草 陳皮錢各二 人參 生白朮 生綿芪錢各三 升麻 柴胡各五

分

水酒各半煎服

此乃大補脾胃之藥內加薑附升柴以生發陽氣因脾主肌肉陽明為百脉長故也錢前

陽和湯雖同為熱藥而一潤一燥一氣一血一脾一腎大相迥別用者審之若有一毫熱

象用不合宜非但不能消散起發反增痛若耳

營衛返魂湯

治氣血不和發為腫毒流注能消散於未成之

前拔根於既愈之後兼治傷折脚氣諸症

生首烏

鐵不犯

全當歸

赤芍

烏藥

枳殼

白芷

不見

茴香

炒

木通

生甘草

各等

右水酒各半煎在上食後服在下食前服

此方乃厥陰藥首烏當加倍用自有神效其義較前方輕淺而穩當過之大約三陽七陰

加減法

欲散可加荊芥防風補托可加參芪托毒可加角刺山甲止痛可加乳沒

首烏一名紅見消為外科之聖藥古方少用惟此以之為君其餘諸藥無非活血和氣溫

中通絡耳大約症之稍屬陰者宜之畧為加減以之羽翼仙方活命飲可為瘡瘍初起之

神方以之羽翼托裏消毒散可為溫通血分之良劑以之羽翼陽和湯可為白疽陰症之

常藥用者審之

附古加減法

錄

癰腫初起減當歸恐多則生血生瘡不絕也

癰疽胃寒生痰加半夏風鬱成痰加桔梗並用薑汁

宿痰失道結聚腫硬或如瘰癧或如雞卵加南星半夏外用玉龍敷之輕者自消重者即潰

一切內癰加忍冬藤甘草節以解毒清熱

流注加獨活以利氣血凝若餘熱未清加升麻蘇葉頭痛加川芎

癰疽因寒藥歷久不愈去木通加厚朴不效更加白蔻仁

流注因冷藥變為骨疽其痛在骨者加製附子

疝氣血氣而嘔逆水漿不下者加木香

打破傷折者去木通在上者更去枳殼加川芎活血加蘇葉紅花破瘀加破骨脂五靈脂

腰痛加萆薢玄胡

脚氣加檳榔木瓜穿山甲

凡人泄瀉者不可便用宜先止其瀉蠟礬丸米飲下候瀉止以此方收用

古法往往以五香連翹飲內補十宣散榮衛返魂湯三方出入引用以為初起消散托裏之方而連翹飲中一派香竄之藥加以苦寒之品十宣散又犯剛燥之戒故丹溪立齋諸

先生皆非之

濟陰湯

治腫瘍初起紅腫熱痛症屬純陽者此因膏梁積熱所致以之清熱解毒外敷抑陽散若半陰半陽及有表者元虛者大非所宜

川連炒

條芩炒

山梔仁炒

甘草生

連翹各一錢

白芍

錢五

銀花

錢三

丹皮

錢五

右水煎服大便秘量加酒製大黃



此方乃解毒湯三黃湯加味耳以治熱毒深重之症可以稍減其勢若欲消散必不能馬

保安湯

治癰疽瘡癤及乳癆跌撲損傷初起者調和榮衛解熱清毒止痛活血其效如神未

黃瓜婁

打碎炒

沒藥

乳香

草節

忍冬花

加全歸五錢

右酒煎服有加生薑者恐寒涼傷胃也有加蘇木當歸者欲其活血也可臨時斟酌

此乃潔古所定若無表裏諸症而

元氣又實者可服便瘡者忌之

透膿散

治氣虛血弱不能托毒膿已成而不穿破者可以此代針外敷替針九更驗然陰毒

生黃芪

川芎

當歸

甲片

角針

右水煎服瘡在上先飲酒後服藥在下者反之

此方乃鼓舞氣血之藥加通經托毒之品耳所以能代針者全在角刺一味不以為君反

以為使方稱神妙破膿法有用補托藥中加自出蠶繭者一個一窠加茅針者一枝一眼茅取其形繭取其

乳沒為外科定痛之聖藥甲片角刺為外科托毒之聖藥因乳能行氣滯沒能行血滯甲

黃芪定痛散

治癰疽發背等瘡因元氣不能勝毒致疼痛不可忍服之立止毒重者不可

生芪

人參

草節

白芍炒

川芎

熟地

歸身

陳皮

乳香

藥各五

右水煎量病之上下分食前後服如法

此乃八珍湯去白朮加陳皮粟殼乳沒耳去白朮加陳皮者避其滯而取其疎也加粟殼者欲氣血有所歸聚則毒氣不致散漫也至於乳沒之加俱為行氣活血而設若無毒而但虛痛者不加可也

定痛之方有名歸身定痛者以粟殼為君佐之以芍歸使之以乳沒此因氣滯而設有各白芷定痛者亦以粟殼為君佐之以陳皮白芷使之以乳沒此因血滯而設有各痛者以大黃為君佐之以蘇木綠豆使之以乳沒此因潰後餘毒未清而設惟此意義可見定痛無一定之法也方不具錄

絡石定痛散

治毒氣聚作痛不止者若筋骨

絡石

生用藤葉開於不者勿用一名鬼繫腰緣樹石而生細藤對葉形有三角夏開白花者如無以薜荔代之薜荔即鬼鍵豆藤也

角刺

黃炒去皮散

錢

乳香油

去藥一錢

甘草

分三

右水酒各半煎服

薜荔本治癰疽初起以其能通經活血也絡石薜荔同類故以為君角刺攻堅潰毒為臣清熱破結以之為臣乳沒行氣活血以為佐使甘草不用可也

三仙散

治一切無名腫毒發背跨馬等癰未成即消已成即潰功力浩大用無不效胃弱者

黃明膠

用蛤粉生用亦可

白蠟

甲片各三錢

右用無烟酒化膠令淨復入二末頓服之取醉為效

諸膠皆能內消腫毒惟黃明膠為最因牛筋大力而屬土故能使氣血頓長邪無所容豈真能消毒哉佐以蠟蠟化風解結山甲通經托毒方能捷奏奇功除去二味亦能自效但稍緩耳

何茹散

治對口腦疽鬚疽未成即潰其效如神

三仙散乃太陰陽明藥若能稍為加減合陽和榮衛二湯以治三陰諸症尤覺神奇合保安活命二湯以治內外三因更能捷效此皆神驗之劑在用之者達權通變耳