

新刊醫林狀元壽世保元戊集卷之五

太醫院吏目金紫雲林龔廷賢子才編

男龔定國校

眩暈

脈風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩風浮寒緊濕細暑虛涎弦而滑虛

脈則無治眩暈法尤當審諦先理痰氣次隨證治

眩者言其黑暈言其轉冒言其昏眩暈之與冒眩其義一也其狀目閉眼眩身轉耳聾如立舟車之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一途而取軌也風則有汗寒則無痛暑則熱悶濕則重滯此四氣乘虛而眩暈也喜怒哀樂悲恐憂思鬱而生痰隨氣上厥七情致虛而眩暈也淫慾過度腎家不能繼氣歸原使氣逆奔而止此眩暈之出於氣虛也明矣吐衄漏崩肝家諸不能收攝榮氣使諸血失道妄行此眩暈之生於血虛也又明矣以致新產之後血海虛損或瘀不行皆能眩暈是可不推尋致病之因乎治法隨機應敵其

間以升降鎮墜行焉最不可妄施汗下然而眩暈欲解自汗則有之若諸逆發汗劇者言亂目眩與夫少陰病下利止而頭眩時時自汗者此虛極而脫也識者將有採薪之憂

清暈化痰湯

主方治眩暈之總司也

陳皮

去白

半夏

姜汁炒

白茯苓

去皮各一錢半

枳實

麸炒一錢

川芎

黃芩

酒炒各八分

白芷

細辛

南星

洗汁

防風

羌活

各七分

甘草

三分

右剉一劑生羌三片水煎服以此作丸亦可○氣虛加人參七分白朮去蘆一錢○血虛加當歸倍川芎○有熱加黃連薑炒七分

○一論頭旋眼黑惡心煩悶氣短促上喘無力言語心神顛倒目不敢開如在風雲中頭若裂身重如山四肢厥冷不得安睡此乃胃氣虛損停痰而致也半夏白朮天麻湯方見頭痰

○一論勞役之人饑寒眩暈者脈虛弱也

補中益氣湯

方見內傷

依本方加半夏天麻白芍熟地黃○一眩暈屬氣虛有

濕痰者依本方去柴升加白茯苓川芎半夏天麻桔梗白芷

○一論陰虛火動眩暈者脉必數也

清離熈坎湯方見勞瘵依本方加川芎天麻山梔竹瀝少許

○一論真陽不足上氣喘急氣短自汗虛極欲倒如坐舟車眩暈手足冷脉沉細也

參附湯

人參 五錢
大附子 炮三錢

右剉一劑生薑十片水煎熱服

○一論眩暈之症因氣虛痰火炎上故也

清陽除眩湯

人參 六分
白朮 去蘆 一錢
白茯苓 一錢
陳皮 一錢
半夏 湯泡 一錢

天麻 八分
檳榔 八分
旋復花 八分
甘草 四分

右剉一劑生薑三片水煎服

○一論肥白人日常頭眩眼花卒時暈倒者名曰痰暈

清痰祛眩湯

南星 薑泡
半夏 羌汁
天麻
蒼朮 米泔
川芎
陳皮
茯苓 去皮

桔梗

枳殼去穢

烏藥

酒苓

羌活

各入分甘草三分

右剉生薑水煎臨服入竹瀝薑汁全服

○一論體虛之人一時為寒所中口不能言眩暈欲倒手足厥冷
薑附湯

乾薑一兩

大附子

主去皮臍一兩

右剉每五錢水煎溫服

○一論一切失血過多眩暈不醒者

芎歸湯

川芎

當歸各等分

右剉水煎溫服○虛甚加炮過大附子

○一論氣血兩虛而挾寒作頭目眩暈者

十全大補湯

方見補益

依本方如有痰加陳皮半夏

○一治一人形體魁梧不慎酒色因勞怒頭暈仆地痰涎上壅手足麻痺口乾引飲六脉洪數而虛子以為腎經虧損不能納氣歸原而頭暈不能攝水歸

而為痰陽氣虛弱而麻痺虛火上炎而作渴以補中益氣湯合地黃丸料治之而已

○一人氣短痰暈服辛香之劑痰盛遺尿兩尺浮大按之如無予以為腎家不能納氣歸元香燥致甚可用八味丸料三劑而愈八味丸

見補益

○一人形體豐厚勞神喜怒面帶陽色口渴吐痰或頭目眩暈或熱從眼起左三脉洪而有力予為足三陽虧損用補中益氣湯加麥門五味及加減八味丸而愈

○一大方痰暈湯

半夏

法製橘紅

一錢

赤茯苓

一錢

黃芩

酒洗

白朮

一錢

川芎

五分

黃連

五分

黃柏

酒炒

知母

七分

石膏

一錢

薄荷

五分

甘草

炙五

右剉一劑生薑三片水煎臨臥服

一生員形體魁梧不慎酒色因勞怒頭暈仆地痰涎上湧手足麻痺口乾引飲六脉洪數而虛余以為腎經虧損不能納氣歸源而頭暈不能攝水歸源而為痰陽氣虛熱而麻痺虛火上炎而作渴補中益氣合六味丸料治之而

愈其後或勞役或入房其病卽作用前藥而愈

○一孟都憲氣短痰暈服辛香之劑痰盛遺尿兩尺浮大按之如無余以爲腎家不能納氣歸元香燥致甚耳用八味丸料三劑而愈

○一孫都憲形體豐厚勞神善怒面帶陽色口渴吐痰或頭目眩暈或熱從腹起左三脉洪而有力右三脉洪而無力余謂是三陰虧損用補中益氣加麥門五味及加減八味丸而愈

十全大補湯 見補益 補中益氣湯 見內傷 八味丸 見補益

麻木

脉浮而濡屬氣虛關前得之麻在上體關後得之麻在下體也脉浮而緩屬濕爲麻痺脉緊而浮屬寒爲痛痺脉澁而乳屬死血爲木不知痛癢內經曰風寒濕三氣合而爲痺故寒氣盛者爲痛痺濕氣勝者著痺河間曰留着不去四肢麻木拘攣也經又曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病人入深榮衛之行澁經終時疎故不痛皮膚不榮故爲不仁夫所謂不仁者或

周身或四肢唧唧然麻木不知痛癢如蠅扎縛初解之狀古方名爲麻痺者是也丹溪曰麻是氣虛木是濕痰死血然則曰麻曰木者以不仁中而分爲二也雖然亦有氣血俱虛但麻而不木者亦有虛而感濕麻木兼作者又有因虛而風寒濕三氣聚之故周身掣痛兼麻木併作者古方謂之周痺治法宜先汗而後補也醫者宜各以類推而治之不可執一見也

加味八仙湯

當歸酒洗 川芎 熟地黃各七 白芍酒炒 人參六分 白朮去蘆
陳皮八分 半夏曲七分 白茯苓去皮 桂枝三分 柴胡四分 川羌活五分
防風五分 秦艽六分 牛膝六分 甘草炙三分

右剉一劑生薑一片棗一枚水煎食遠服○氣虛加黃芪蜜炒八分
一論麻是渾身氣虛也

加減益氣湯

黃芪蜜炒

人參

白朮去蘆

陳皮

當歸錢

升麻

柴胡

水香

各五分

香附

青皮

去膜

川芎

各八分

桂枝

甘草

各三分

右剉一劑生薑棗煎服

○一論十指盡麻并面目皆麻此亦氣虛也

補中益氣湯 依前方去青皮川芎桂枝加麥門冬羌活防風烏藥其十四味

○一論本是濕痰死血也

雙合湯

當歸

川芎

白芍

生地黃

陳皮

半夏

各一錢

桃仁

去皮

白茯苓

去皮

紅花

白芥子

一錢

甘草

三分

右剉一劑薑十片水煎熟入竹瀝薑汁同服

○一論手足麻痺因濕所致也

香蘇散

方見感冒

依本方加蒼朮麻黃桂枝白芷羌活木瓜

○一論感風濕手膊或痛或木或遍身麻木

五積散

方見中寒

一論婦人七情六鬱氣滯經絡手足麻痺宜

開結舒經湯

紫蘇

陳皮

香附

白烏

川芎

蒼朮

米泔浸

羌活

南星

半夏

當歸各八分

桂枝四分

甘草三分

右剉生薑三片入薑汁竹瀝服

○一論口角麻木涎及嘴角頭面亦麻或嘔吐痰涎或頭眩眼花惡心遍身麻木止渴消痰飲

黃連

半夏

瓜蒌仁

黃芩

白茯苓

桔梗

枳殼鹽炒

陳皮

天麻

細辛

南星

甘草

右剉生薑三片水煎服○血虛加當歸○氣虛加人參○亦有十指麻木胃中有濕痰死血加蒼朮白朮少佐熟附子行經中死血者四物湯加紅花桃仁韭葉忌生冷魚腥發風發熱之物

○一論十指疼痛麻木不仁

大附子木香各等分每服三錢薑三片水一碗煎七分服

一論婦人遍身麻痺謂之不仁皆因血分受風濕所致用祛風散送下五

補丸

祛風散

生川烏

白朮

去蘆

白芷

各三錢

甘草

二錢

右爲細末酒調吞下五補丸

五補丸

黃芪

密炒

八參

五錢

附子

一个

當歸

三錢

白芍

酒炒五錢

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服五七十九祛風散送下

一論不仁者謂不凝和也痛痒不知針灸不知是也經曰諸乘虛寒而鬱冒

不仁蓋其血氣虛弱不能周流於一身於是正氣爲邪氣所伏故肢體頑麻

不知痛癢寒過厥如死屍而鬱且冒也用桂麻各半湯不愈者補中益氣湯

入薑汁設或汗如油喘不休喘而直視水漿不入者此爲命絕也

○一論風熱血燥皮廬瘙痒頭面手足麻

清涼潤燥湯

當歸

酒洗

生地黃

各一錢半

黃連

黃芩

白芍

煨

川芎

各一錢

天麻

防風

羌活

荆芥

各八分

細辛

大分

甘草

五分

右剉水煎食遠服麻甚加川烏炮三分

一論而上木處可將桂枝爲末用牛皮膠和少水花開調敷之厚一二分若腳底硬木處可將牛皮鎔化入生薑汁調和仍入南星末五錢和勻膠用厚紙攤貼二三分乘半熟裹貼腳底用溫火烘之此外治也

一治兩手指麻木四肢困倦怠惰嗜臥乃熱傷元氣也

黃芪

八錢人參

五錢白芍

三錢柴胡

二錢升麻

二錢五味子

一百四十個

生甘草

五錢

炙甘草

二錢

右剉水煎稍熱空心服

一治兩腿麻木沉重無力多汗喜笑口中涎下身重如山語聲不出右寸脉

洪大

黃芪

三錢

當歸

二錢

蒼朮

四錢

陳皮

五錢

桑本

三錢

黃柏

酒炒一錢

柴胡

三錢

升麻

知母

酒炒一錢

五味子

一錢

生甘草

二錢半

右每剉一錢水煎空心服少待以早飯壓之

一治皮膚間有麻木乃肝氣不行故也

黃芪

一兩

白芍

一兩半

橘皮

一兩半

澤瀉

五錢

炙甘草

二兩

右判水煎溫服

癲狂

癲脉搏大滑者生沉小緊急不治○狂脉實天生沉小死○癲脉虛可治實則
內經曰巨陽之厥則腫首頭重足不能行發為胸仆胸搖其目也是蓋陽氣逆亂
故令人卒然暴仆而不知人氣復則甦此則癇之類也又曰陽明之厥則癲
疾欲走呼腹滿不得卧面赤面熱妄見妄言又曰甚則棄衣而走登高而歌
踰垣上屋罵詈不避親疎是蓋得之於陽氣太盛胃與大腸實熱燥火鬱結
千中而為之耳此則癲狂之候也曰癲曰狂分而言之亦有異乎難經謂重
陰者癲重陽者狂素問註云多喜為癲多怒為狂然則喜傷於心而怒傷於
肝乃二臟相火有餘之症難經陰陽之說恐非理也大抵狂為痰火實盛癲
為心血不足多為求望高遠不得志者有之癇病獨主乎痰因火動之所作
也治法癇者宜吐狂宜下癲則宜安神養血兼降痰火雖然此三証著若神
脫耳目眩如愚癡者縱有千金我酌吾未如之何也已矣○癲者喜笑不常

顛倒錯亂之謂也○狂者大開目與人語所未嘗見之事為狂也又云狂者
狂亂而無正定也○譫語者合目自言日用常行之事為譫也又蓄血症則
重復語矣○鄭聲顫無力不相接續造字出於喉中為鄭聲也○陰附
陽則狂陽附陰則癡脫陰者目盲脫陽者見鬼
一論癡者心血不足也此方主癡狂喜笑不常
養血清心湯

人參

白朮

去芦

白茯苓

去皮

遠志

去心

酸棗仁

炒

川芎

各一錢

生地黄

錢一

石菖蒲

錢一

當歸

錢半

甘草

五分

麥門冬

錢半

右剉一劑水煎服

○一論狂者痰火實盛也宜後清心滾痰丸主之若風熱盛者宜

防風通聖散

方見中風

依本方加牡丹皮生地黃桃仁主之一切大風

癲狂之疾

○一論喜笑不休者心火之盛也

以海鹽二兩火燒令紅研細以河水一大碗煎三五沸待溫三次啜之以斂

探吐熱痰次服

黃連解毒湯

方見感冒

依本方加半夏竹葉竹瀝姜汁少許

○一論婦人癲疾歌唱無時踰垣上屋者乃營血迷於心包所致也
加味逍遙散

當歸

白芍

炒

白朮

去苦

白茯苓

去皮

柴胡

生地黃

遠志

去心

桃仁

去皮尖

蘇木

紅花

甘草

右剉一劑煨薑一片水煎服有熱加小柴胡湯生地辰砂水煎服

○一論發狂無時披頭大叫欲殺人不避水火古人治狂謂之失心人參主心
腹結氣故足以治時熱狂言

苦參丸

苦參為末煉蜜為丸如梧子大每服二三十丸薄湯送下

○一論一切癲癩風狂或因驚恐怖畏所致及婦人產後血虛驚氣入心并室
女經脉通行驚邪蘊結頓服此此經効

抱膽丸

水銀

二兩

一錢

硃砂

一兩

研鉛

一兩半

乳香

一兩

研

右將鉛入銚內水銀結成砂子次下朱砂滴乳汞熱用柳木棍研勻丸如芡實大每一丸空心井花水吞下病者得睡切莫驚動覺來卽安再服一丸除根○一方薄荷湯化下亦可

○一論癲狂失心不寐此方用朱砂能鎮心安神酸可使收引故棗仁能歛神歸心香可使利竅故乳香能豁達心志許學士加入人參亦謂人參能寧心耳
寧志膏

辰砂一兩

酸棗仁炒五錢

乳香五錢

加入參一兩

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸薄荷湯化下

○一論癲狂失心此病因憂鬱得之痰涎包絡心竅此藥能開鬱痰
白金丸

白礬二兩

鬱金七兩

右爲末米糊丸每服五十丸溫水送下

一論癲狂五癇驚悸一切怪症此皆痰火實盛也

清心滾痰丸

大黃

酒蒸

黃芩

四兩

青蒙石

錢五

沉香

二錢

牙皂

錢五

犀角

錢五

麝香

五分

朱砂

五錢

爲衣

右爲細末

水爲丸

每服四五十丸

滾水送下

一論心風者何蓋君火在心因怒發之相火助盛痰動于中脇氣上攻迷其心竅則爲癲爲狂所怒之事膠固於心輒自談失其條序謂言之心風與風何干也若痰不盛者則有感亦輕

○一論久患心風癲狂健忘怔忡失志及恍惚驚怖入心神不守舍多言不定此藥大能安神養血寧心定志

紫河車一具長流水洗淨慢火焙乾爲末煉蜜爲丸空心酒送下

○一人癲狂亂打走叫上房用瓜蒂散吐出其痰數升又以承氣湯下之卽愈

○一人氣心風卽痰迷心竅發狂作用真花藥石煨黃酒淬一次爲細末每服

一錢黃酒送下

○一論癲狂五癰眩暈時作時止痰涎壅盛心神昏憤此屬氣血虛而挾風痰

鬱火也

驅風化痰湯

人參

白朮去片

白茯苓去皮 半夏姜炒

陳皮

枳實酒炒

當歸酒洗 川芎

白芍酒炒 桔梗去告

南星

遠志甘草水炮去心

瓜蒌仁 白附子

礬石

天麻

黃連姜炒

黃芩酒炒 甘草

右剉一劑生薑五片水煎溫服

○一癲狂健忘失志及恍惚驚怖入心神不守舍多言不定一切真氣虛損用

紫河車入補藥內服之大能安神養血寧志治健忘驚悸怔忡不寐以六味

九加遠志石菖蒲人參白茯苓當歸酸棗仁炒

○一治心恙狂惑

用無灰酒一碗真麻油四兩共和勻楊枝二十條逐一條攪一二下攪遍

楊枝直候油酒相和如膏煎至八分強者強灌之令熟睡或吐或不吐覺

來即醒

○一治狂言鬼語

用蝦蟆一个燒爲末酒調服

○一治癲狂諸病