


168  
吳氏醫方彙編

目錄

蟠蛇串	熱瘡	疥癬	凍瘡	漆瘡
翻花瘡	瘡殭肉	枯箭	蠻箭血痣	瘧毒
乳症	陰菌	胎前生瘡	產後生瘡	產後流注
適經生瘡	妊娠忌藥	幼女纏足	纏足生瘡	鉗扣風
失容疽	女面黧斑	黑子	白屑風	腳風作痒
甲風	丹毒	奶癬	胎瘤	痘瘡
頭瘡	體氣	楊梅	大麻風	白禿



蛄蟆串

此症乃思慮傷脾，氣鬱結所致。其患多生於兩手初起，骨中作痒，漸生漫腫，堅硬不熱，不紅連腫，數塊久則出如豆漿串通諸竅，寒熱交作，首尾俱宜。益氣養榮為主，補而不應者氣血滙盡而已矣。

益氣養榮湯

治懷抱抑鬱或氣血損傷，四肢頸項等處患腫，不問軟硬，赤白腫痛，瘰癧馬刀已潰未潰，或潰而不欲。

人參 茯苓 陳皮 貝母 香附 當歸 川芎

黃芪

薑炒

熟地

白芍

炒各一錢

災艸

桔梗

各五分

白朮

炒二錢

紫胡

六分

姜一片水煎服

熱瘡

此症皆濕熱而生，其名不一。初起即生白膿，名膿窠，如毒極淺，只出黃汁。

瘡痂積累名肥瘡如似肥皂喜着手足常相對生名癟瘡初起黃汁  
流出即結薄痂汁之到處即成瘡名黃水瘡以上四症只以滲湿润清涼祛風  
之藥為末敷之即愈

### 疥癬

夫疥癬者脾之濕熱及肺之風毒客於肌膚所致也癬發於肺而疥又薰  
乎脾疥之初起先見于手又則延及遍身或作痛痒或成膿漿或有鮮血  
搔之皮起乾痂症雖不一皆有細虫而能染人癬之狀初如癰疹漸生有  
如錢形有如熟繩者浸淫若虫行者有如牛領之厚皮而且堅者乾濕雖異  
而生赤小虫則同宜服當歸飲子以散其風濕外用殺虫滲濕之藥即愈戴  
元使云此雖皮膚小疾不足為害然瘡有惡瘡癬有頑癬疥有疥癬不

當只有外敷之藥湏內服宣毒之劑方能奏功

○苦參丸

治遍身癩痒疥癬瘡瘍

苦參

四兩

元參

黃連

獨活

枳殼

防風

黃芩

枝子

菊花

各一錢

右為細末煉蜜和搗千餘下丸如桐子大每服

三十九食後漿水下日進三服茶酒任下壯人加大黃

防風通聖散

麻黃

防風

芒硝

荆芥

大黃

滑石

梔子

薄荷

石膏

桔梗

黃芩

連翹

白朮

甘草

當歸

白芍

川芎

弱者去大黃芒硝加參芪

右為末每服三錢姜湯煎服。本方去大黃芒硝名雙解散

。疥癩方

蛇床子

蕪荑各一錢

川椒

五丁

硫黃

五丁

苦參

一錢

雄黃

五丁

大楓肉

二十丁

枯礬

錢二丁

輕粉

二錢

朝腦

二錢

共為末或猪油白油核桃油俱可調搽每一付分作三丸搽患處再加

水銀更妙

治癬瘡驗方

土蜂窩

生用

黃芩

炒黃

黃柏

炒黃

官粉

炒黃

水銀

各一錢

燈草

燒灰

五十

全研至不見水銀星為度入冰片少許

香油調敷

遇癬除根方

水銀

鉛製

雄黃

錢半

硫黃

一錢

銅青

錢半

龍骨

五丁

麝香

三丁

共為細末先以薑擦過用醋調藥擦一次

七日愈忌見水

。鯉魚散

治頑癬

用鯉魚一尾

去首尾

及鱗臍

桃花信

三錢

入魚腹中用濕紙包紙裹

炭火煨存性

為末陳醋調擦患處

變金錢

治金錢癬

用鵝花末敷或鍋底灰香油調搽之效甚者用黑礬為末掩

之汁出再掩汁盡痂乾而愈

一八面風

治一切癬症

里礬入棗燒炭連棗為末如有一斤加硫黃陀僧各五錢脂

油調搽

不過三

治大疥  
硫黃二兩頭髮一斤炒粘離火為末

用鐵勺一個將硫黃化開若黃燃則

以醋噴殺再熬為汁入髮灰攪勻深埋地內俟三五天後去其毒性方可為末香油調搽再以桿竹火烘之不過三次而愈

治惡癬

斑蝥 生半夏 為末等分先抓破瘡痂以陳醋搽忍痛湏臾黃水

流出即愈神驗

疥癬

四

陰癬 生在兩腿合縫間痛痒不已

野根宕菜疣瘡 剁成三四分厚片用釀醋浸五

七日搓之

愈癬膏 治湿痒結痂甚厚按時而發者

柏油 四錢 黃柏 二錢 黃丹 五錢 樟腦 三錢 各為末 猪膽 取汁用黃蠟 三分

將柏油熬滾入蠟化開再入三末調勻離火入膽汁攪成膏攤貼  
治一切癬症

頑癬散

川槿皮 二錢 輕粉 一錢 雄黃 一錢 百藥煎 二錢 斑毛 全用 大黃 一錢 海

桐皮 一錢 蒼朮 錢半 百部 一錢 共為細末以陰陽水調成稀糊先用

川山甲刮淨敷之

癬瘡方 用棒搗碎 一名莽牛墩 抹根洗淨常搽患處黃水出即愈

一名馬狼墩

治癬驗方 大露蜂房不拘多少以生白礬填入孔內用破罐底盛之

仰口朝上用炭火煅合白凡化盡為度取出研末搽癬上一二次即愈

諸色癬方

川烏

艸烏各一錢

椿樹皮

錢半

白花蛇

錢八分

共為末將大碗上加竹簾一塊糊蓋放米糠一層上放藥又蓋以米糠燒之其油墮于碗底取以搽之甚效

治一切疥癩

大楓肉

二分

枯白礬

二分

輕粉

一分

柏油

六分

樟腦

三錢

溶化合勻搽之

治癬疥效方

棟樹根皮

一分

花椒

五錢

白礬

五錢

豬板油

一塊

共為細末用豬板油調勻為大丸 患人洗浴後將藥捲上再服

後方三四劑

疥癩

五

川芎一錢 彌身三錢 白芍三錢 生地五錢 赤首烏二錢 白蘚皮二錢

山甲 炒二錢 水煎服

濕癬 桃樹青皮 陰乾為末 醋合頻敷

董濟驗方

此方三伏天不宜輕用

大木蠶子仁一個

祁艾一錢

黃香五十

共研極爛撒于火紙上撮成捲置陰陽瓦內將外腎用綿色密以  
被繞項裹固方可燃火薰之俟藥捲盡徐去被次日疥焦頭  
脫痂即愈

癬症

柏油四兩 猪膽二斤

黃柏二錢 黃芩二錢

共煤枯去渣入黃蠟一斤

熬成軟膏敷之 如濕癬加蒼朮二錢作痒加荆芥穗二錢痛甚加白

芷二錢

凍瘡

此症乃嚴冬寒風侵人或着耳面手足先癟後破輕者腫痛重者遇冷即發先痒後痛者是也只以蠣蓋炒炭為末香油調搽即愈

八背散 蠣蓋 炒炭為末 香油調搽

金頂砒散 密陀僧為末生姜搗汁調塗

洗凍瘡方 蒜瓣一掛 白菜菔二斤 前湯浴之

手足破裂 猪脂 姜汁 調勻熱搽少頃即合數次即安

漆瘡

此症乃氣虛肺熱之人以感漆氣週身腫痒形若熱癧先用柳葉前湯浴之再以鷄子黃熬油塗之蠣黃更捷內服解毒化斑湯

凍瘡

漆瘡

翻花瘡

瘡瘍肉

枯筋箭

六

解毒化斑湯 治三焦火風熱毒致生火丹遍身痒痛並治漆瘡

元參 知母 石羔 人中黃 黃連 升麻 連翹

牛子各一錢 甘草五分 沒竹葉廿片 水煎服

### 翻花瘡

由瘡潰後肝火血燥生風所致瘡口內胬肉突出形如芝菌或如蛇身長短不一斷不可悞用刀針蝕藥只以藜蘆為末加豬脂調敷即縮或烏梅燒炭敷之皆效

### 瘡殭肉

由瘡疽生肌太疾皮不能一時即斂見風成殭以寒水石煅研為末加水飛銅青末少許敷之其肉自斂即不作殭矣

# 枯筋箭

此症乃憂鬱傷肝以致筋氣外發初如赤豆枯點微高久則破裂贊出筋頭縫鬆枯槁多生胸乳間宜藥線齊根繫繫七天後其患自落再以珍珠散搽之

•珍珠散 青黛飛卒 珍珠製淨殼一錢 真輕粉共為細末 腐爛者甘草水

洗净猪脂調搽瘡不生皮者以此乾摻

# 血箭血癰

血箭之症發于心經火盛逼血從毛孔湧出血癰之症由于肝經鬱怒血熱初起紅如癰漸大如豆揩之血流

# 瘟毒

一大頭瘟乃濕熱聚於高巔之上初覺憎寒壯熱體重頭面腫如瓜瓠  
目不能開上喘咽喉不利不速治十死八九以普濟消毒飲主之內寃者  
加大黃如耳前後及額角紅腫加紫胡荽根發于頭腦項後用荆防  
敗毒散去參加芩連發于耳鼻面芩連消毒飲寃加牛子芒硝微利  
之不可大劑一捻頭瘟喉閉失音頸大腹脹如蝦蟆治以荆防敗毒  
散一楊梅瘡遍身紫塊發如癩瘡治以清熱解毒湯下人中黃散

一疣瘡瘍發塊如瘤遍身流走旦發夕死以三稜針刺入委中三寸出血  
及服人中黃散一玳瑁瘡其色黑如瑁故名必先泛口鼻至額頰目  
胞兩耳及手臂足頸甚則胸腹俱黑如墨色四圍有紅暈鮮澤若痘  
瘡根脚繫附如線他處肉色不變方許可治先與葛根黃芩黃連犀角

連翹荆芥防風人中黃解其肌表俟其邪毒發透乃以涼膈散加人中黃  
紫荆烏犀微下再與犀角地黃湯加人中黃之類調理如黑色枯焦不澤  
四圍無紅暈及灰白死黯者皆不可救也一葡萄瘧其患多有小兒感  
受四時不正之氣瘟毒遍鬱于皮膚不散結成大小青紫點色葡萄發  
在四體及頭面口內遲治傳于胃牙根出血初起宜涼血清瘟藥中加羚  
羊等又云瘟毒傷于氣者則頭項腫脹傷于血則肢體疮瘡傷於胃  
則嘔汁如血名瓜瓠瘧生角飲傷于腸則水泄不通名絞腸瘧復解散  
探出吐之若入臟則不知人而死大法以證為憑勿以脉論又有發頤痄腮  
之症感四時不正之氣所致其候發于面鼻耳項咽喉赤腫或結核令人  
增寒壯熱頭痛肢體痛或口乾便秘昧者當分表裏在表者發之升麻牛

子散或普濟消毒飲在裏者下之通聖散堅硬不赤不痛者為滯氣停  
疫宜疎之流氣飲加減外以化頑散或赤豆散調敷四圍

普濟消毒飲

黃芩炒 黃連酒炒 陳皮 甘草 元參 各二錢 連翹 牛蒡炒  
薄荷一錢 升麻七分 姜黃洗淨 紫胡 桔梗 各二錢 板藍葉一錢  
馬勃一錢 水煎服

荆防敗毒散

人參 茯苓 羌活 紫胡 只壳 桔梗 川芎 各一錢

甘草五分 獨活一錢 加荆防薄荷牛子入金汁內熱加酒連酒吞口渴

加天花粉