

驗方擇要卷三

鐵嶺儀臣鳳 岐輯

江夏薛棠戚克昌

會稽炳侯陳邦輝

校

目錄

癰毒宜戒

癰毒雜治

癰毒諸方

陰疽論

驗方擇要

卷三

目錄

陰疽治法

陰疽諸方

急救諸方

縊死

溺水

凍殭

壓跌

睡魔

中邪



南京中醫藥大學圖書館版權所

鬼迷

驚嚇

痰厥

氣厥

暴厥

解救諸毒

解百藥毒

誤吞毒物

諸毒須知



誤吞五金

諸骨卡喉

人畜咬傷

蛇蟲咬傷

湯火傷

跌打損傷

刑杖傷

銅鐵竹木入肉方

內外備用諸方



南京中医药大学图书馆版权所有

癰毒宜戒

癰毒宜戒

一戒走泄 凡患癰毒紅腫潰爛或已生管無論久近大小最忌走泄真元如有遺精及房事不謹醫治最難見功必先將遺精病證醫治全愈仍令夫婦分臥謹戒房事然後按方施治自易收功

一戒污穢 凡大癰惡毒一經污穢腫痛更甚難以收功婦女產後及行經時切戒近前以免污穢若婦女自患癰疽瘡癰遇行經時醫治鮮效必俟行經後

始能見功

一戒熏罨

諸瘡有熏罨一法瘡雖易愈然毒盡歸

腹定成鼓脹難治惟神燈照法不忌

一戒沐浴

凡溼熱諸瘡膿血淋漓或癢或痛莫不

以沐浴爲快然浴則溼氣更重難以速痊惟有溫泉之處不忌

癰毒雜治

毒氣攻心

凡患瘡毒心中難過或欲嘔吐或神昏不語此毒氣

攻心也急用護心散

見癰毒諸方

時時服之服至大半嘔

止神清再服醒消丸

見同前

以平其勢護心散如製不

及急服白沙糖三四兩亦可

瘡痛不寐

有人遍身生瘡疼痛手足尤甚並粘著衣被不能安

睡用

菖蒲

三四斤曬乾爲末

摻臥席上仍以被蓋臥且不

粘衣又能得睡五六日即愈

瘡癢難忍

金銀散

專治惡瘡癢極

硫黃

一兩

入銅器內在

燈火上鎔化

切忌放竈火及火爐上

加頂上銀硃

五錢

攪勻離

火倒油紙上候冷研極細

如香灰細不好醋調敷其細敷之作痛

好醋調敷其

癢即止如破爛孔內癢極者用白蜜調此藥敷之神

效

趕移瘡毒

移山過海散

治毒生於致命處用此移於無害部

位甚效用

雄黃 小麥麪 新鮮蚯蚓糞共爲末用好醋調勻

漸漸敷於致命處半邊自能移過不致命處

移毒散

凡毒發於骨節間用此藥移之或上或下使無殘疾之患屢試屢驗用

白芨

一兩六錢

紫花地丁

八錢

烏雞骨

煨

硃砂

雄黃

輕粉

各一錢

五倍子

二錢

煨黃

大黃

二錢

猪牙皂角

八分

共

爲末用好醋調敷毒之上截卽移至下截仍照人虛

驗方擇要

卷三

癰毒雜治

三



北京中医药大学图书馆版权所有

實內服藥餌

瘡中生管

退管丸

廟宇內陳年舊琉璃底

三錢麴皮 拌炒透

辰砂

飛水

另研人指甲

麴皮 拌炒

真象牙末

各一錢

蟬蛻

一錢五 分炒

製乳香

製沒藥

枯礬

各八分

各研細末共和勻用

黃蠟

三錢

鎔化入藥攪勻乘熱作速作丸如菉豆大初服

十粒逐日漸加一粒加至十六粒以後不必再加酒

送下患上身者加

川芎

六分

患上身者加

牛膝

六分

遠年者服一料全愈近年者半料收功雖患至

二十年者亦效屢試如神忌食蔥與有管之物百日並戒走泄查前癰毒宜戒便知

又方 京城礪砂膏貼之淺者七八日卽出深者半
月卽出無論久近皆效

瘡不收口

與後瘡愈復發各方參看

一切瘡毒久不收口內必有蟲照後各方治之必愈
如再不愈瘡內必有細骨照多骨疽各方治之若百
藥不效者恐是中邪用乾狗糞白色者燒煙熏之或
流毒水或出別物自愈



石灰水 整塊石灰 一斤 放盆內以清水 八斤 燒滾

傾入盆內待石灰化開用棍攪勻俟水澄清將水輕

輕傾出別器

不用石灰

再用細布漚清收貯瓶內聽用凡

瘡毒日久不能收口或不能生肌量瘡大小剪新布

一塊浸入水內一刻卽起卽貼患處俟一二時辰再

換一塊一日換兩三次數日收功神效莫測此西洋

秘方也

地龍水

白頸蚯蚓

又名地龍又名曲蟾

不拘多少放瓷碗內

加白沙糖一把蓋好一二日化成清水挑出少許入

瘡內數日收口

又方 蜈蚣一條 焙乾爲末麻油調敷數日收口止

痛如神

又方 鼈甲瓦上焙枯存性研細末摻之卽收口生

肌神效之至

又方 五倍子焙枯研末好醋調勻攤布上貼之細用

布糊紙一層神效
以免出氣



卷之五
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百



南京中医药大学图书馆版权所有
 1161

癰毒諸方

隔蒜灸法

一切癰疽腫毒惡瘡初起卽用此法使毒氣解散用藥施治亦易見功輕者灸過卽愈

大蒜頭

去皮又名老蒜

切片如三文錢厚

無蒜用者煮熟雞蛋白或生薑亦可完

竟不如蒜好

安瘡頭上用艾一團

大則約用一分小則如豆子大

於蒜上

燒之蒜壞另換若難辨瘡頭先以溼紙貼瘡上先乾

處卽是瘡頭或有十數頭生一處將蒜頭搗爛攤瘡

頭上鋪艾燒之艾火不論次數或十數次數十次或

百餘次總以痛者燒至不痛不痛者燒至痛惟頭不

宜灸宜向足三里穴

穴在膝下三寸
胫骨外兩筋內

灸之灸多者宜

先服護心散

見後

以防火毒入內

凡蛇蝎蜈蚣以及瘋犬咬傷各毒攤蒜於傷處鋪艾多燒之至不痛爲度拔出其毒以免內攻

糯米膏

凡腋肋臂膊腰腿等處忽如火熱腫硬如石

痛不可忍百藥不效者一二次卽愈神效

熱糯米飯少加葱與鹽共搗融敷過夜卽鬆或用熱



糯米酒糟亦可其渣務傾入池內或入河內

神燈照法

治發背對口乳癰乳巖魚口便毒及

一切無

名瘡毒不論已成未成已破未破破者尤妙

明雄

硃砂

眞血竭

沒藥

各一錢

麝香

二分

共爲

細末用棉紙裹藥捲成撚約一尺長每撚入藥三分

以眞麻油潤透燒撚離瘡半寸許自外而內周圍緩

緩照之瘡毒隨藥氣解散不致內攻初起三條漸加

至五條七條瘡勢漸平又漸減之每日照一次重者