

校正儒門事親

第六冊

儒門事親卷之十五

戴人張子和著
新安吳勉學校

瘡瘍癰腫第一

治蜈蚣瘡

良薑

白芨

瀝青

已上各等分

右為細末。嚼芝麻水同熬為膏。入冷水共定。用緋絹片火熨斗作膏藥。貼瘡上。

又方千年石灰

茜根燒灰

右為細末。用水調雞翎塗上。

水沉金絲膏

貼一切惡瘡。

瀝青

白膠

已上各一兩

春秋宜用油

夏宜油蠟二錢半

冬宜用油蠟四錢

右件鎔開油蠟。下瀝青白膠。用槐枝攪勻。綿子濾過。入冷水中扯一千餘遍。如瘡透

了。喫數丸。作劑于瘡口填者亦妙。攤紙上貼。勿令火炙。

乳香散

治下疳。

乳香

沒藥

輕粉

黃丹

龍骨

烏魚骨

黃連

黃芩

銅錄 已上各等分 麝香許

右為細末。先以溫漿水洗過貼疔瘡上。

治蛇傷方

右用蒲公英科根作泥塗貼于傷處。用白麪膏藥貼之大効。

紫金丹 治疔瘡

白礬兩四 黃丹兩二

右用銀石器內鎔礬作汁。下丹。使銀釵子攪之。令紫色成也。用文武火。無令太過。不及如有瘡。先以周圍挑破上藥。用唾津塗上數着。無令瘡乾。其瘡潰動。取疔出也。兼瘡顏色紅赤為効。如藥未成就。再杵碎炒令紫色。

治疔瘡

生蜜與隔年葱一處研成膏

右先將瘡周圍用竹鍼刺破。然後用瘡藥于瘡上攤之。用緋絹蓋覆。如人行二十里。覺疔出。然後熱醋湯洗之。

千金托裏散 治一切發背疔瘡。

連翹二錢

黃耆半兩

厚朴兩二

川芎兩一

防風兩一

桔梗兩一

白芷兩一

芍藥兩一

官桂兩一

木香錢三

乳香半錢

當歸兩半

沒藥錢三

甘草兩一

人參兩半

右為細末。每服三錢。用酒一碗。盛煎三沸。和滓溫服。膏子貼之。

三聖散 治諸瘡腫

黃丹兩二

白礬飛二兩

右為細末。每服乾摻瘡口上。後用保生錠子。捏作餅子貼之。

保生錠子

巴豆四十九箇另研文武火燒熟

金脚信錢二

雄黃錢三

輕粉兩半

硃砂錢二

麝香錢二

右件為末。用黃蠟一兩半。化開藥。將和成錠子。冷水浸少時。取出。旋捏作餅子。如錢

眼大。將瘡頭撥破。每用貼一餅子。次用神聖膏藥封貼。然後服托裏散。若瘡氣透裏

危者。服破棺散。用神聖膏貼之。

神聖膏藥 貼治一切惡瘡

當歸兩半

沒藥錢三

白芨兩半

乳香錢三

藁本兩半

琥珀兩半

黃丹錢四

水蠟子五箇去皮 膽礬錢一

粉霜錢一

黃蠟兩二

白膠兩三

巴豆二箇去皮

槐柳枝各長二把

清油斤一

右件一處。先將槐柳枝下油內煮焦。取出。次後下其餘藥物。煮得極焦。亦撈出。却將

油澄清再熬成膏子。用緋絹上攤貼之。

破棺丹

大黃半兩

甘草二兩

荆三稜半兩

山梔子二兩

牽牛末二兩

右為細末。煉蜜為丸。如彈子大。每服半丸。食後酒半盞研化服之。忌冷水。

三聖散 治臃瘡。疔瘡。搭手。背疽等瘡。

葱白一斤 馬薊一斤 石灰一斤

右三味濕搗為團。陰乾為細末。貼瘡如有死肉者。宜先用潰死肉藥。

潰死肉藥方

炊飯尖三兩各等

一等半兩入巴豆二箇

一等半兩入巴豆三箇

一等半兩入巴豆五箇

各銳子

右先用二巴豆納瘡。如不潰。再用納三巴豆。又不潰。用五巴豆者。更用丹砂炒紅色。摻瘡口。追出清水。其惡肉未盡。至追出赤水。是惡肉盡。更用三聖散貼之。用膏藥傅之。

治臃瘡久不愈者

用川烏頭黃藥各等分為末。用唾津調塗紙上貼之。大有効矣。

治一切惡瘡方

以天茄葉貼之。或為細末貼之亦妙。

又方 用臘月中白燒灰。油調塗瘡疥上。

又方 以瓦松不拘多少。陰乾為末。先用槐枝葱白湯洗之過。搽之立效。灸瘡久不斂者更妙。

又方 以蒲公英搗之。貼一切惡瘡諸刺。

替鍼丸 治一切惡瘡。

川烏錢二 草烏錢二 五靈脂錢二 輕粉分 粉霜分

又方 加班猫二十箇去翅 巴豆二十箇去皮

右將三件為末。研令勻。次入輕粉粉霜研勻。又入班猫巴豆。以水調糊為錠子。如是散

謂針頭散

懸蔓散 治發背惡瘡。

懸蔓一箇 大黃兩一 金銀花兩一 當歸兩半 皂角刺兩一

右剉碎。用酒一椀煎至七分。去滓溫服。如有頭者。加黍粘子。

治附骨癰及一切惡瘡。

當歸兩一 甘草兩一 山梔子兩一 木鱉子兩一

右為細末。每服三五錢。冷酒調服之。

治諸惡瘡

白殭蠶直者

大黃二味各等分

右為細末。生薑自然汁與蜜同和為劑。丸如彈子大。每服一丸。細嚼。

治惡瘡死肉錠子

巴豆破一錢去

五靈脂兩

黃丹二錢

加枯白礬錢

右為細末。以糊和丸。錠子入瘡內用之。

當歸活血散

治瘡瘍未發出。內痛不可忍。及婦人產前後腹痛。

當歸錢二

沒藥一錢半

乳香錢半

白芍藥錢三

瘡瘍者。加人參。木香。婦人加赤芍藥。

右為細末。每服一錢。水一中盞。煎至七分。和滓溫服。日二服。婦人酒煎。瘡既發不須用。

薰惡瘡方

紫花地丁

一名米布袋收

右取根曬乾。用四箇半頭。壘成爐子。燒着地丁。用絡埵埵一枚蓋了。使令埵眼內烟出。薰惡瘡。出黃水自愈。

治地瘡

用蒲公英科眼作塗。貼于傷處。用白膏藥封之。

接骨散 并治惡瘡

金頭蜈蚣一箇

金色自然銅

研半兩燒紅醋碎

乳香二錢為細末用之

銅錢

重半兩者或三文或五文燒紅醋研碎細

金絲水蛭

瓦一錢半作三截每箇上焙去氣道為度

沒藥三錢研細

右為細末如瘡腫處津調半錢塗立止痛如見得出膿先用粗藥末少許小油少半匙同打勻再入少半匙再打勻又入前藥接骨散半錢再都用銀釵子打成膏子用雞翎掃在瘡腫處立止痛天明一宿自破便効如打折骨頭并損傷可用前項接骨散半錢加馬兜鈴末半錢同好酒一大盞熱調連滓溫服如骨折損立接定不疼如不折了喫了藥立便止住疼痛此方屢經效驗不可具述服藥觀可以食前服食後服又外用接骨藥

陳爛麻根

兩把羊耳朶一對

亂絲一握多者更妙

右取肥松節劈碎約量輕重先放三兩根于新瓦上都於上外三味在上燒着存性就研為末如生再燒研為度後入五靈脂或半兩如疼入好乳香少許和藥如茶褐色為度用布條子約纏一遭先攤小黃米粥勻上撒上藥末勻纏定折處上又用軟帛三五重上又竹簞子纏勒得緊慢得中初三日換上一次再後五日換一次又七日再換上一次無有不接者

赤龍散

消散一切腫毒

用野葛桃根紅者去粗皮為末。新水調塗。腫上頻掃新水。

便癰方 本名血疔

牡蠣 大黃 甘草 已上各半兩 懸萆一箇

右酒浸露一宿服之。以利為度。

又方 冬葵子為末。酒調下三兩服。

又方 皂角不蛀者。燒過陰乾為末。酒調服。立効。皂角子七箇。水調服之。亦効。

又方 胡桃七箇。燒過陰乾。研為末。酒調服之。不過三服。大効。

又方 生蜜米粉調服。休喫飯。利小便為度。

治瘡無頭者

蛇退皮于腫處貼之。

又方 皂角刺燒灰陰乾。

右為末。每服三錢。酒調嚼。葵菜子三五箇。前藥送下。大効。

生肌斂瘡藥

白欬 定粉 各等分 黃丹少

右同為細末。洗淨瘡口乾貼之。

治諸瘡水度腫者

生白礬末水調塗之自消

接骨藥

銅錢半兩醋浸碎

木香錢

自然銅錢

射香鈔

右為極細末。如在上食後。每服三匙。頭嚼丁香一枚。乳香一粒。無灰酒一小盞。在下食前。如不折。其藥反出。服罷。其痛不可當。勿疑。待一日。如骨未接。再服如前。老者十餘少者不過五七日。

萬聖神應丹出箭頭

良岩科一名天仙子。取着中一科。根本枝葉花實全者佳。

右於端午日前一日。持不語。尋見良岩科。言道。先生。你却在這裏。那道罷。用柴灰自東南為頭。圍了。用木楔子。擷取了。根周迴土。次日端午日未出時。依前持不語。用鑊頭一隻。取出土。用淨水洗了。不令雞犬婦人見。于淨室中。以石臼搗為泥。丸如彈子。大黃丹為衣。以紙袋封了。懸于高處。陰乾。如有人着箭不能出者。用緋絹盛此藥。訖放臍中。用綿裹肚繫了。先用象牙末于瘡口上貼之。後用前藥。如瘡口生合。用刀子利開貼之。

治凍瘡

臘月雀腦子燒灰研細小。油調塗凍瘡口上。

又方 以正黃藥為細末。用乳汁調塗瘡口上。
又方 以山藥少許。生於新瓦上磨為泥。塗瘡口上。
治手足裂

白芨不以多少為末。水調塗裂處。

治面上瘡

用鐵子底黑煤。于小油中以匙打成膏子。攤在紙上貼瘡神効。

治金瘡血不止

用白薇末貼之立止。

善應膏藥

黃丹 斤二

南乳香 研

沒藥 研

當歸

木鼈子 生

白欬 生

官桂 寸三

杏仁 生

白芷 以上各一兩

新柳枝 各長一斤

除黃丹乳沒等。外八件用芝麻油五斤浸一宿。用鐵鍋內煎令黃色。藥不用。次入黃丹。鍋內柳條攪令黃色。方可擬下。用柳枝攪出大煙。入乳沒勻令冷。傾在磁盆內。候藥硬。用刀子切作塊。油紙裹。

接骨丹

五靈脂 兩一

茴香 錢一

右二味為細末。另研乳香為細末。于極痛處搽上。用小黃米粥塗了。後用二味藥末搽于上。再用帛子裹了。用水片子纏了。少壯人二日効。老者五六日見効矣。

治癬如聖丸

黃蘗

黃芩

黃連

防風

已上各半兩

白殭蠶兩

全蝎三錢

輕粉半錢

右為細末。羊蹄根汁浸蒸餅為丸。如梧桐子。每服二三十丸。嚼羊蹄根汁送下。隨病人上下分食前後。又羊蹄汁塗癬。

治小兒癬雜瘡

白膠香

黃蘗

輕粉

右為細末。羊骨髓調塗癬上。

治瘰癧方

班猫翅去頭足

赤小豆

白殭蠶

苦丁香

白丁香

磨刀泥

右各等分。為細末。十歲已上服一錢。二十已上服二錢。五更用新汲水一盞調下。比至辰時見効。女人小便見赤。白色三兩次。男子于大便中見赤色。白色為効。當日服白粘粥。不得喫別物。大忌油膩。患三四年者。只一服。七八年者。再一服。

玉餅子

治瘰癧。一切惡瘡。軟癰。

右用白膠一兩磁器內鎔開去滓再于磁開後以草麻子六十四箇作泥入膠內攪勻入小油半匙頭柱點水中試硬軟添減膠油如得所量瘡大小以緋絹攤膏藥貼之一膏藥可治三五癰

又方治瘰癧

小龍肚腸

一條乾

蟹殼裙欄

炮

川練子

五箇

牡蠣

大黃

牛蒡子

燒存性

皂角子

五箇

右為細末蒸餅為丸如菉豆大每服十五丸食後艾湯下日三服

又方將臘月貓糞用新瓦兩箇合在內外用鹽泥固濟燒成灰以小油調塗瘡口上又方取小左盤龍不以多少為末陳米飯搜和得所丸如梧桐子大每服三五十丸却用陳米湯送下

治眉煉頭瘡

小麥不以多少燒冷黑色存性為末以小油調塗瘡上

治小兒疣瘡

羊糞熬湯洗去痴用屋懸燥炒羅為末以小油塗瘡上

聖靈丹

治打撲胸損痛不可忍者

乳香

三錢另研

烏梅

五箇去核細切燂乾為末

白萬莖子

二兩八錢炒令黃搗為末

白米

一合細末

右再入乳鉢內研數百下。煉蜜為丸如粟大。細嚼熱湯下。病在上食後。在下食前。出醫方

右用蕎麥楷一擔。不爛者燒灰存性。入石灰半斤。同灰一齊過令火滅。然後以熱水霖灰窩淋下灰水。用鐵器內煮。以捺起攪成膏子。于醫上點自出。或先以草莖刺破亦可。

又方桑柴灰石灰淋汁熬成膏。草莖刺破點。以新水沃之。忌油膩等物。燒湯火方

多年廟上虫與走獸為末。小油調塗燒湯火瘡効。

又方生地黄汁入小油螞同熬成膏。磁器內盛用雞翎掃盪處。

又方牆上青苔燒灰。小油調塗燒燙處。

治燒燙方

生地黄旋取新者爛搗。取自然汁。入小油黃螞少許。銀石器中熬成膏子。用雞翎掃瘡上。

又方血餘灰用臘猪脂調塗。

又方寒水石燒過為細末。水調塗之。

枯瘤方

砒 硃砂 黃丹 雄黃 粉霜 輕粉 以上各等一錢

乳香錢三 沒藥錢一

同研為末。粥糊為丸。捏作碁子樣。爆乾。先灸破瘤頂三炷為則。上以瘡藥餅蓋上用黃蘗末以水調貼之。數日自然乾枯落下。

又方以銅碌為末。草刺破瘤。摻在上。以膏藥塗之。

治頭面生瘤子。用蛛絲勒瘤子根。三二日自然退落。

乳香散 貼杖瘡腫痛。

大黃 黃連 黃蘗 黃芩 已上各三錢 乳香研 沒藥研

以上各一錢 腦子抄

右四味為末。後入三味冷水調勻。攤于緋絹上。貼杖瘡上。

治疔瘡

馬明退燒灰錢三 輕粉抄 乳香抄

右研為細末。先以溫漿水洗淨。乾摻之。

治疔瘡久不愈者

海浮石燒紅醋 金銀花

右海石二停。金銀花一停。同為細末。每服二錢半。如簽茶一般。日用二服。瘡在上食。

後在下食前服如病一年服藥半年即愈。

瀉肺湯 治肺癰喘 坐卧不安。

桑白皮剉 甜葶藶隔紙焙 各一兩

右二味粗末每服三錢水一盞煎至六分去滓食後溫服以利為度。

桔梗湯 治肺癰吐膿。

桔梗剉半 甘草剉

右為粗末每服六七錢水二盞煎至半盞去滓空心服須臾吐膿立愈。

黃蘗散 治鵬窠微腰等瘡。

黃蘗 白芨 白欬 已上各等分 黃丹炒

右為細末涼水調塗。

口齒咽喉第二

地龍散 治牙痛。

地龍去土 玄胡索 華撥 已上各等分

右為細末每用一字用綿子裹隨左右痛于耳內塞之大効。

牙宣藥

華撥 胡椒 良薑 乳香研另 麝香 細辛 青鹽 雄黃

已上各等分

右為細末。先以溫漿水刷淨。後用藥末于痛處擦。追出頑涎沫吐了。嗽數十次痛止。
忌油膩一二日。

仙人散

刷牙

地骨皮二兩酒浸二宿

青鹽兩一

黍粘子

半兩

細辛酒浸一兩

右為細末。入射香少許。每用一字。臨卧擦牙。茶酒嗽良久吐出。

又方

石膏

細辛

柳樵

已上各等分

右為末擦之。

治牙疳

米二停

鹽一停

盆碱

射香許少

白礬

右相合。水半勺。紙包裹。燒黑焦為末。貼瘡上立愈。

治牙痛

口噙冰水一口。用大黃末紙燃。隨左右痛處。鼻內任之立止。

又方

韶粉錢二

好朱砂錢一

右為末。每用少許。擦痛處。