

癰科證治準繩卷之四

金壇王肯堂輯 門人新安閔承韶校

脇部

脇胘也肋脇骨也有骨曰肋無骨曰脇

○脇疔

靈樞云發於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也灸之其狀大癰膿其中乃有生肉大如赤小豆治之劉蔭薊草根各一升以水一斗六升煮之竭為取三升即強飲厚衣坐於釜上令汗至足已

疵疾瘻切甲乙經於赤小豆下作

治之劉蔭草素松根各一升

鬼遺云俠癰腫起發肋及兩肩

肘頭二十日不穴死九日可刺發赤白相間膿多可

治全無赤白者不治

又云兩肋起疽名為發肋初

腫盛至一數日不穴攻即腫大如杯碗高如鋸背痛

徹內腸絞刺左邊患應右邊痛右邊患應左邊痛唯

有此處多是內毒却入攻而歿者多人有斯患急以

針刺出膿血則免內攻傷內矣或問脇上生疽何

如曰是名脇疽屬手厥陰心包絡足厥陰肝火熱毒

怒氣相併而作活命飲加柴胡紫金丹烏金散選用

壯實者八陣散一粒金丹下之此證宜速治不然潰

爛不斂多致危困一人患此如胡桃微痛微腫月餘

漸大如杯醫作痰治或作肝積或云痞塊竟莫能効

數月遂大如益堅硬如石不甚疼痛微紅漫腫復得
暴怒胸腹脹滿小水不利脉遲而微投以化氣丸六
一散小便利胸次寬繼投烏金散奪命丹間服八陣
散月餘漸消

一人年踰五十腋下患毒瘡口不合右關脉數而渴
此胃火也用竹葉黃耆湯而止再用補氣藥而愈嘗
治午後發渴或發熱用地骨皮散効 一人性急味
厚常服燥熱之藥左脇一點痛輕診弦重扎知其痛
處有膿與四物加桔梗香附生薑煎十餘貼痛處微
腫如指大針之少時屈身膿出與四物調堙而安

一夫人左脇內作痛牽引胸前此肝氣不和尚未成
瘡用小柴胡加青皮枳殼四劑少可加芎歸治之愈
一人連年病瘧後生子三月病熱右脇下陽明少
陽之分生一癰甫平左脇下相對又一癰膿血淋漓
幾死醫以四物湯敗毒散數倍人參以香附為佐犀
角為使大料飲乳母兩月而愈踰三月忽腹脹生赤
癰如霞片取剪刀草汁調原蠶沙傅隨消又半月移
張入囊為腫黃瑩裂開兩丸顯露水出以紫蘇葉盛
麩炭末托之旬餘而合此胎毒證也 一婦因忿鬱
腋下結一核二十餘年因怒加腫痛完穀不化飲食

少思此腸胃虛也以六君子加砂仁肉桂乾薑肉豆

寇泄雖止而膿清瘡口不合用十全大補湯月餘而

愈機按前項二條腸瘡一因其性多躁急故用四物

柴胡疎理之劑以安靜之一因其肝氣不平故用小張通北人年踰

其性情為治不特專于攻毒也

四十夏月腋下患毒潰後不斂膿出清稀皮寒脉弱

腸鳴切痛大便溏泄食下即嘔此寒變而內陷也宜

大辛溫之劑遂以托裏溫中湯二貼諸證悉退更以

六君子加炮乾薑肉桂數劑再以十全大補湯而愈

一人腸腫一塊日久不潰按之微痛脉微而瀉此

形證俱虛也經曰形氣不足病氣不足當補不當瀉

宜用人參養榮湯彼不信乃服流氣飲虛證悉至方服前湯月餘少愈但腫尚硬以艾葉炒熱熨患處至十餘日膿成以火針刺之更灸豆豉餅又服十全大補湯百貼而愈 蓋流氣飲通行十二經諸經皆為所損况膽經之血本少又從而損之寧不傷生東垣曰凡一經受病止當求責其一經不可干擾餘經苟泛投剋伐之劑則諸經被戕寧無危乎 一人年三十素飢寒患右肋腫如覆瓢轉側作水聲脉數經曰陰虛陽氣湊襲寒化為熱熱甚則肉腐為膿卽此證也及按其腫處卽起是膿成遂濃煎黃芪六一湯令

先飲二鍾然後針之膿出數椀虛證並至遂用大補
三月餘而愈 大抵膿血大泄血氣俱虛當峻補之
雖有他病皆宜緩治蓋元氣一復諸病自退老弱之
人不問腫潰尤當補也 一人因勞發熱脇下腫痛
脉雖大按之無力此氣血虛腠理不密邪氣襲于肉
理而然也當補之以接虛怯之氣以補中益氣湯加
羌活四劑少可去羌活又百餘劑而愈 一人面白
神勞脇下生一紅腫如桃教用補劑不信乃用流氣
飲十宣散血氣俱憊而死 一人年踰二十腋下患
毒十餘日腫硬不潰脉弱時嘔予謂腫硬不潰陽氣

虛嘔吐少食胃氣弱宜六君子湯加砂仁藿香彼謂
腫瘍時嘔毒氣攻心潰瘍時嘔陰虛宜補予曰此丹
溪大槩言也若腫赤痛甚煩躁脉實而嘔爲有餘當
作毒氣攻心而下之以瘡屬心火故也腫硬不潰脉
弱時嘔爲不足當補之亦有痛傷胃氣或感寒邪穢
氣而嘔者雖腫瘍尤當助胃壯氣蓋腫瘍毒氣內侵
作嘔十有一二潰瘍濕氣內傷作嘔十有八九彼不
信飲攻伐藥愈甚復請診脉微弱而發熱予謂熱而
脉靜及脫血脉實汗後脉躁皆難治果歿

○內發丹毒

或問脇下至腰胯間腫痛赤色如霞何如曰此名內發丹毒治之稍緩毒攻於內嘔噦昏迷胃腹脹者死二便不通遍身青紫者死急砭出惡血服防風通聖散去白朮甘草紫金丹勝金丹汗之服汗劑得汗則生無汗則死嘔吐不食譫語者死

八腹部十一

○臍上疽

或問臍上寸許發疽何如曰此名衝疽又名中發疽
一名壅腎瘡由心火熾盛流入腎經所致腫高膿稠
色赤可治宜流氣飲活命飲勝金丹奪命丹選用若
平塌黑色膨脹惡心膿水清稀內腎疼痛渴甚瀉利
無度譫語直視者死潰久不斂者死 按後所言危
證只是虛耳如能大補不死也

○臍癰

或問當臍生癰何如曰此卽臍癰也由心經積熱流

於大小腸二經所致宜何首烏散活命飲加升麻及
紫金丹三生散選用壯實者一粒金丹下之 按臍
爲神闕穴禁針之所早消散之免使見膿爲上

○小腹痛

鬼遺云衝疽發小腹疼痛而振寒熱四日悄悄五日
變色可刺不刺及導引出膿毒不治五十餘日死
或問臍下發疽何如因此節小腹癰臍下一寸五分爲
氣海一寸爲丹田三寸爲關元皆屬任脉由七情不和
所致急服活命飲紫金丹奪命丹壯實者一粒金丹八
陣散下之老弱者黃芪木香散內補十宣散十全大補

湯選用若潰而低陷膿水清稀或潰爛久不斂者死
或問一人年十九患疽於小腹之左數月堅塊如石
寒熱間作飲食減少漸至羸廋何如曰是名緩疽屬
足太陰經積熱所致由醫不得法邪正相持耳投以
紫金丹活命飲間服十全大補湯半月而愈

○總論

薛腹癰謂瘡生於肚腹或生於皮裏膜外屬膏粱厚
味七情鬱火若漫腫堅硬肉色不變或脉遲緊未成
膿也四君加芩歸白芷枳殼或托裏散腫軟色赤或
脉洪數已成膿也托裏消毒散膿成而不外潰者氣

血虛也卧針而刺之腫焮作痛者邪氣實也先用仙方活命飲隔蒜灸以殺其毒後用托裏以補其氣若初起欲其內消當助胃壯氣使根本堅固而以行經活血之藥佐之若用尅伐之劑欲其消散則腫者不能潰潰者不能斂若用疎利之藥下其膿則少壯者多為難治老弱者立見危亡

一人年踰三十腹患癰腫脉數喜冷齊氏曰瘡瘍腫起堅硬者實也河間曰腫硬脅悶煩躁飲冷邪在內也用清涼飲倍大黃三劑稍緩次以四物湯加苓連山梔木通四劑而潰更以十宣散去參耆桂加金銀

花天花粉彼欲速効自服溫補藥肚腹遂腫小便不利但用清涼飲膿潰數椀再以托裏藥治之而愈

一人腹癰熈痛煩躁作嘔脉實河間曰瘡瘍火屬須分內外以治其本又云嘔噦心煩腫硬脅悶或皮肉不變脉沉而實毒在內也當踈其內以絕其源用內踈黃連湯利二三行諸證悉退更以連翹消毒散而愈

一人腹癰膿熟開遲脉微細膿出後瘡口微膿如蟹吐沫此內潰透膜也瘡瘍透膜十無一生雖用大補亦不能救此可爲待膿自出之戒也

一人素嗜酒色小腹患毒肌弱微痛欲求內消予謂當助胃

壯氣兼行經活血佐之可消彼欲速効自用敗毒等藥勢果盛瘡不潰膿臥少思兩月餘復請診脉愈弱盜汗不止聚腫不潰肌寒肉冷自汗色脫此氣血俱虛故不能發腫成膿以十全大補湯三上餘劑膿成針之反加煩躁脉大此亡陽也以聖愈湯二劑仍以前湯百劑而愈司馬李悟山患此腹痛而勢已成用活命飲一劑痛頓止用托裏消毒散腫頓起此膿將成也用托裏散補之自潰而愈錦衣掌堂劉廷器正德辛未仲夏腹患癰潰而膿清熱渴腹脹作嘔不食或以爲熱毒內攻皆用芩連大黃之劑病愈