

近世內科國藥處方集

西湖伊蘭書

集下



連珠。多在石楠藤上食其花葉。有攻毒祛風作用。用於中風。痿痺。筋脈拘急。麻風疥癩等。

當歸 烏蛇 均見前

(十七) 肺結核 (肺癆) (中醫稱傳尸癆)

〔病原〕 為結核桿菌 *Bacillus Tuberculosis* 所致之傳染病。該菌略彎曲。染色後有時顯含珠形。此則究係芽胞。抑或係空泡所致。尚為一問題。至其傳染之路徑。大抵皆由呼吸道而侵入於肺。則為肺結核。若由消化而受染者。則為腸結核。由腭扁桃直接受染。則成淋巴腺及全身性結核。

〔病理〕 「肺結核」係結核菌由呼吸道染入。乘肺臟因感冒咳

嗽。或其他疾病等之弱點。而侵入肺之淋巴管。遂蔓延於四圍之組



織致生乾酪樣變。結核之中央因菌或其毒素而細胞質凝死。或變透明質。因纖維質增加而成堅硬之組織。無論何種結核。必有此二種變。乾酪樣變者破壞可危。堅硬變者自限不佈。病最後之結果。全仗抵抗力如何而轉移。有一種組織。結核桿菌一入即死。另有一種組織。該菌能屯居。多少致害。然自限不佈。終則因抵抗力增加而菌死。最壞之組織。却宜於該菌之孳生。有乾酪樣變而無硬變之限制。於是病日益增。菌日益多。不可收拾矣。

〔症狀〕 肺結核大概可分急性與慢性兩種。

急性肺結核。俗名跑馬癆。病起驟突。寒戰。體溫速升。背旁作痛。咳嗽。痰中有鐵鏽色血。與急性肺炎相似。病起後八至十日之間。所期望之肺炎病極期。乃不顯。病勢更劇。溫度不規則。痰粘液膿性而色綠。

此為要徵。至第二三星期時症狀頑梗。醫者或猶認係未退之肺炎。豈知症狀逐漸增重。而有肺軟化之理學徵狀。痰內有彈力性纖維及結核桿菌。本病之著明期最早者六日或十三日。大多數延至三月之久。更有病起驟突而且劇烈。後則症狀漸減而成慢性類者。慢性肺結核之症狀大概可分作三期論。(一)為結核發生期。(二)為結核軟化期。(三)為成窩期。惟此等解剖而分之病期。於臨床時所顯之症狀每不相符。茲為易以明瞭計。且論局部症狀。胸痛或早顯。或僅在咳嗽時覺之。咳嗽乃一最早之症狀。且本病多始終患之。初起時咳聲乾而短。繼則鬆而頻。兼吐粘涎膿性痰。或咯血。及痰內間或帶血。呼吸困難。(氣促)發潮熱。下午或至九十九度半。甚至百度不定。更有起病時即發顯明之間歇熱者。熱降之時常兼出汗。

（盜汗）身體消瘦。若病勢進行則體重逐漸減輕。故稱身體之重量。即可知病勢之進行。當病之早期消瘦最速。每一星期內可減五六磅。迨至病勢停止進行及溫度低降則病者之體重逐漸增加。每星期增重兩磅。即係佳兆。喉常受累。或為聲音嘶嘶。或疼痛嚙時尤然。咳嗽作哮聲。或失音。或難嚙。精神易興奮。性神經更然。精力逐漸耗失。死時大概平靜無劇烈狀。精神至死不昏昧。

〔治法〕 結核病之治療法。首在食物營養身體。以促進其抵抗力之增加。暨需要良好之空氣及環境。以怡悅其身心。其次則與以藥物作對症之施治。以減其痛苦而已。

處方一 千金補肺湯 五味子二。○桂枝三。○麥門冬

一○。○大麥一二。○粳米一四。○桑白皮一二。○款冬花

一〇〇〇 乾姜二。

右八味剉細。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應證 肺勞咳嗽氣促。痰涎稀薄畏寒而體溫低落。古稱肺

痿者。

〔方解〕 五味子為祛痰鎮欬藥。應用於肺癆喘息。及腸癆下利。有

收斂性之強壯作用。對於盜汗及衰弱患者有效。

桂枝有健胃及強壯作用。能預防心臟衰弱。融和溫壯神經。活潑血

行。治畏寒汗出。氣逆咳嗽等症。

麥門冬為滋養性強壯藥。有祛痰鎮欬作用。用於虛勞咳嗽短氣煩

渴及肺痿吐膿血等症。

大麥為營養品食療藥。有健胃助消化之作用。因其內含蛋白質澱

粉麥芽糖等。故用於一切衰弱患者及結核病之兼現消化不良者有效。

粳米功效與大麥相似。

桑白皮為祛痰解熱清涼利尿藥。治虛勞客熱。喘息咳嗽。水腫。腳氣等。

款冬花為鎮咳祛痰藥。對於咳嗽喘息。肺痿吐膿。肺癆久咳等症有特效。

乾姜為芳香性刺激藥。有健胃逐水祛痰鎮咳止嘔作用。治喘咳脹滿。痰涎稀薄。肺痿肺寒。痰飲上氣。畏寒等症。

處方二 補肺阿膠湯 阿膠一二。○馬兜鈴一○。○鼠

粘子一○。○杏仁一二。○甘草四。○糯米一五。○



右判細作三百西西煎劑。去渣。後加入阿膠溶化。一日分三次溫服。
適應症 肺癆咳嗽咯血。咽痛聲嘶等。

〔方解〕 阿膠為滋養性強壯藥。含有生膠組織之軟骨膠質。常用
於出血性諸疾患。如咯血吐血。下血。婦人子宮出血等。有增加血液
之凝固及粘補血管之破裂等作用。對於肺癆咳血。不僅有止血之
功。抑且有潤肺之力。為陰虛肺癆治本之良藥。

馬兜鈴為祛痰鎮咳藥。治肺熱咳嗽喘促。及欬逆連連不止等症。其
性清涼。又能解毒除瘡。對於肺癆久咳。咽痛生瘡等有特效。

鼠粘子為清涼性解毒祛痰藥。專治氣管及咽喉諸病。如喉痺咽痛
生瘡。痰嗽肺熱喉痛。及一切腫毒斑疹等。

杏仁為鎮靜鎮咳藥。專治欬逆上氣。喘息煩滿。又能潤氣管利咽喉。

及消積化痰等作用。

甘草為粘滑性滋潤藥。能滋潤喉頭粘膜。緩和鎮靜咳嗽。

糯米為粘和性滋養強壯藥。有滋潤呼吸氣管以奏緩和鎮靜及粘補血管之功。能止肺癆久咳出血。及咽喉乾燥等症。

處方三 百合固金湯 百合一二。○芍藥七。○甘草五。

○麥冬一二。○當歸一○。○地黃一四。○桔梗八。○貝

母一○。○玄參一二。○

右九味判細。作三百西西煎劑。去渣濾清。一日分三次溫服。

適應症 結核性咽痛。肺癆久咳痰血。聲音嘶啞。喉頭乾燥粘

痰不易咯出者等。

〔方解〕 百合為滋養性強壯藥。有鎮靜祛痰作用。

地黃為滋養強壯藥。善理血分。有清血補血。行血通經。利尿等作用。治婦人崩漏胎產。及男子五癆七傷。女子傷中胞漏。能逐血痺。增骨髓。長肌肉。利大小腸。解熱消瘀。血惡血止。吐衄。

芍藥為鎮痙鎮痛藥。因其內含安息香鞣酸及葡萄糖等。能緩和急。斂攝神經。平降血壓。又有收斂消炎作用。

當歸為清涼性通經藥。富含揮發性當歸油。有行血補血。鎮痛鎮靜諸作用。治欬逆上氣。諸瘡。婦人崩中。月閉。男子虛癆。血痺等。

桔梗為排膿祛痰藥。利咽喉。療口瘡。止欬逆。治下痢。癰疽。肺癰。胸脅滯痛等症。

貝母為祛痰鎮欬藥。治煩熱咳嗽。喉痺咽痛。肺癰。肺痿。吐血。化痰消癭。瘤瘰癧。

玄參為清涼性消炎藥。能利咽喉。清肺熱。消瘡腫。治骨蒸。傳屍癆。傷寒溫瘧。心驚煩熱等。

甘草 麥冬 見前

處方四 人參養榮湯 人參四。○白朮六。○茯苓一。

○甘草三。○乾姜二。○大棗四枚。當歸六。○芍藥五。

地黃一二。○桂枝三。○黃耆四。○遠志三。○橘皮四。○

五味子一。五

右十四味。剉作三百西。煎劑。去渣。一日分三次服。

適應症 肺癆。身體消瘦。倏寒倏熱。睡中盜汗。咳喘咯痰不鬆。

或吐血。貧血。萎黃。行動氣喘。食後痞脹。或大便泄瀉。四肢疲軟衰弱。

無力等。

〔方解〕 人參為興奮強壯藥。有強心健胃作用。用於肺癆衰弱盜汗等。

白朮為健胃利尿藥。用於消化不良。泄瀉水腫。小便不利等。

茯苓為有營養性之利尿藥。且有鎮靜神經作用。治欬逆心悸水腫腳氣。消痰涎安睡眠。

乾姜為芳香性健胃藥。能止嘔祛痰。治喘欬。腹痛。腹冷泄瀉。

大棗為緩和性滋養藥。有鎮欬作用。

黃耆為緩和性強壯藥。有生長肌肉細胞。強壯皮膚之作用。故能止

汗。斂瘡。排膿逐水。對於衰弱性喘息。汗多浮腫洩利等有良效。

遠志為祛痰藥。用於氣管支加答兒。及喘息咳嗽。咯痰不鬆等。

橘皮為芳香性健胃祛痰藥。有鎮嘔止欬。消痰涎。寬中利氣之功。

五味子為祛痰鎮咳藥。可專應用於肺癆喘息。又有強壯作用。可用於衰弱性自汗盜汗。並腸勞病之早晨下痢。因其有收斂性退熱止嘔止瀉止咳定喘等功效故也。

甘草 當歸 芍藥 地黄 桂枝 均見前

處方五 秦艽扶羸湯（入門）秦艽二。○鱉甲一。○

參五。○當歸八。○半夏四。○甘草三。○地骨皮一。○

紫苑八。○烏梅三。○生姜四。○柴胡六。○大棗三枚

右十二味剉細。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應證 肺癆。骨蒸潮熱。喘嗽聲啞。自汗盜汗。或寒熱往來。肺

痿。欬唾痰沫。肌肉消瘦。顫紅。精神困倦等症。

〔方解〕 秦艽為解熱藥。有鎮靜神經鎮痛作用。治肢節痠痛。骨蒸

潮熱等。

鱉甲為滋養性強壯藥。因其富含膠質與有機鈣及磷等。有退熱補骨補血等作用。治虛勞寒熱骨蒸潮熱。遺精盜汗。及女子崩漏下血等症。

半夏為鎮嘔鎮欬祛痰藥。有健胃及鎮靜作用。治欬逆嘔吐痰涎。咽喉頭眩及失眠。胸中痞悶等症。

地骨皮為清涼性解熱藥。對於氣管支炎。口腔炎。及咽喉頭神經炎等。皆可服之。並治吐血虛癆潮熱等。

紫苑為祛痰鎮欬藥。治欬血及喘息久嗽。五勞虛熱等。

烏梅為收斂性解熱藥。有健胃生津殺蟲作用。止下痢。治久咳嘔吐。骨蒸癆熱等。

柴胡為解熱藥。善治寒熱往來。胸脅苦悶。虛癆潮熱。骨節煩疼。羸瘦。婦人胎產諸熱。

生姜為芳香性健胃藥。兼有鎮嘔作用。能消痰。主喘欬。脹滿。腹痛。冷利等證。

人參 當歸 甘草 大棗 均見前

處方六 炙甘草湯（仲景）炙甘草六。○生薑三。○桂枝

四。○人參六。○地黃八。○阿膠八。○麥冬一〇。○麻仁

六。○大棗三枚

右九味剉細。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次溫服。

適應症 肺癆吐血。貧血痿黃。心悸亢進。顏面蒼白。身體瘠瘦。

脈搏細弱。或歇止。肺痿喘嗽。畏寒。易於感冒等。

〔方解〕 麻仁為緩和性潤滑藥。有潤腸鎮痛作用。內含植物性脂肪。略有營養之功。

甘草 生姜 桂枝 人參 地黃 麥冬 阿膠 大棗 均見

前

處方七 甯肺湯（楊氏）人參四。○白朮八。○當歸八。

○地黃一○。○川芎四。○芍藥六。○甘草四。○麥門冬八。

○五味子二。○生桑皮八。○阿膠六。○茯苓八。○

右十一味。剉作三百西西煎劑。去渣濾清。入阿膠烱化。一日分三次

溫服。

適應症 肺癆發熱。自汗盜汗。心悸亢進。短氣喘促。咳嗽。或腹

痛失血。肺痿羸瘦等。

〔方解〕 川芎為清血順血藥。兼有鎮痙鎮痛作用。治吐血衄血。五

勞虛羸。頭痛腳弱。女子經閉。乾血癆等。

人參 白朮 當歸 地黃 芍藥 甘草 麥冬 五味子 桑

皮 茯苓 阿膠 均見前

處方八 咳奇方（東郭）麥冬八。○阿膠六。○地黃一。

○百合八。○桔梗六。○乾姜三。○白朮八。○五味子二。

○甘草三。○

右九味剉細。作三百西西煎劑。去渣。一日分三次服。

適應證 肺癆肺痿。久咳不止。痰沫稀薄。或歎血。行動氣喘等

症。

〔方解〕 麥冬 阿膠 地黃 百合 桔梗 乾姜 甘草 白