

亥

匡壘元戎

卷廿

廿一

醫壘元成

金匱黃耆建中湯

大建中湯

易簡杏子湯

嗽

大補十全散

易簡胃風湯

瀉血

千里漿

荔芩湯

蜜酒

易老門冬飲子

治勞復麥門冬湯

海藏五飲湯

海藏大已寒丸

生地黃黃連湯

血風

胃損理中丸

結胃

易簡參蘇飲

發熱

萬病紫苑丸

理中湯加減例

平胃散加減例

八物定志丸

補

潔古天麻丸

中風

大效牡丹皮散

血虛

海藏大五補丸

清心丸

治熱

火府丹

瀉下

調胃白朮澤瀉散

水鼓

四物六合諸方

海藏當歸丸

三陰痛

苦練丸

疝

喉閉不救方

拯濟換骨丹

三焦熱

三焦寒

發痧諸藥附

蒸病五蒸湯

活人敗毒散溫疫

三陽頭痛

發黃茵陳蒿加減例

掌中金乾血氣

龍腦雞蘇丸上焦熱

黃耆烏膏子同上

地骨皮枳殼散

骨蒸

易簡芎歸湯血多

三奇六神翹法

千金種子法

搗鼻香

子宮冷帶下

新安 吳中珩 校

傷寒不可汗不可下不可吐證證

大發春宜吐夏宜汗秋宜下凡用藥汗及吐下湯劑皆中病卽止
若少陽病脈微不可發汗亡陽故也宜附子湯 若陽已虛尺
中弱濇者復不可下之宜小柴胡湯 若動氣在左在右在上
在下並不可發汗宜柴胡桂枝湯 若少陰病脈細沉數病在
裏不可發汗宜當歸四逆湯 若少陽病不可發汗宜柴胡
湯 若咽中閉塞咽喉乾燥亡血衄家淋家瘡家不可發汗已
上六證並宜小柴胡湯 若下利清穀不可發汗宜理中湯四
逆湯之類 若四逆厥及虛家皆不可吐厥者宜當歸四逆湯

虛宜附子湯 有熱人宜黃耆人參建中湯 若少陰膈上

寒乾嘔不可吐宜小半夏加橘皮湯溫中丸 若咽中有動氣

不可下咽中閉塞不可下宜烏扇湯 若外實者不可下諸四

逆厥者不可下虛家亦然厥宜當歸四逆湯 虛者宜附子湯

有熱宜黃耆人參建中湯 本虛攻其熱必噦宜小柴胡湯

若脈浮而緊法當身疼痛宜以汗假解令尺中遲者不可發汗

榮氣不足血少故也宜小柴胡湯 若脈濡而緊濡則衛氣弱

緊則榮中寒陽微衛中風發熱而惡寒榮緊衛氣冷微嘔心內

煩此不可汗宜小柴胡湯 若濡而弱不可發汗宜小柴胡湯

若浮而大浮爲氣實大爲血虛小便當赤而難胞中當虛今

反小便利而大汗出法應衛家微可與小建中湯 若反更實

津液四射榮竭血盡乾煩而不得眠此不可下宜與小柴胡湯 若脈浮大應發汗宜柴胡桂枝湯 若脈浮而緊者不可

下而反下之爲大逆宜桂枝麻黃各半湯 若脈數不可下宜

柴胡桂枝湯 若下之必煩利不止宜葛根黃芩黃連湯 若

脈濇弱浮數不可下宜小柴胡湯 若濡弱微濇則陽氣不

足中風汗出而反躁煩濇則無血厥而且寒不可下宜桂枝甘

草牡蠣龍骨湯 若結胃脈浮大不可下下之卽死宜小陷胃

湯 若陽病多者熱下之則硬宜小柴胡湯 若太陽發汗不

徹轉屬陽明微汗出不惡寒若太陽證不罷不可下下之爲

逆宜桂枝麻黃湯 若太陽病有外證未解不可下下之爲逆

宜桂枝麻黃湯 若病發於陽而反下之熱入因作結胃病發

於陰而反下之因作痞 結胃則有陷胃湯丸三 痞則有瀉

心湯五 若太陽與陽明合病喘而胃滿不可下宜麻黃杏子

甘草石膏湯 若太陽與少陽合病心下硬頸項強而弦者不

可下宜小柴胡湯 若病欲吐者不可下宜小半夏加橘皮湯

太陰腹痛吐食自利腹痛下之必胃下結硬 厥陰病渴氣

上衝心心中熱饑不欲食食則吐衄下之則利不止 若少陰

病飲食入口則吐心中溫溫欲吐腹痛能吐始得之手足寒脈

弦遲者此胃中塞實不可下也宜溫中湯生薑汁半夏湯 若

無陽陰強大便硬者下之必清穀腹滿宜用蜜煎導法 若傷

寒五六日不結胃腹濡脈虛微厥者不可下此亡血也宜當歸

四逆湯下之則死宜四逆加入參湯 若藏結無陽證不往來

寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也謂下也宜用小柴胡湯
若傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之宜小柴胡湯 若陽明
病身面色赤攻之必發熱宜調胃承氣湯 若色黃者小便不
利也宜五苓散 若陽明病心下硬滿者不可攻之宜生薑瀉
心湯 半夏瀉心湯 攻之利不止者死宜四逆湯
不可汗下吐三法利害非輕前人多列經後大抵醫之失只在先
藥藥之錯則變生若汗下不差則永無亡陽生黃畜血結胃痞
氣及下痢洞泄脇熱痢瘕急勞等證生矣其如此故錄大禁忌
於前使醫者當疾之初不犯也

大陽證

桂枝一十四方麻黃
五方在後保命集內

傷寒六經所感形證合用汗下吐和解等湯九仲景活人雲岐子

保命集載之詳者此不復重錄數書中所無者并諸方對證加減今載于後

金匱黃耆建中湯治虛勞裏急諸不足宜此方主之

黃耆

桂枝

生薑

切各三兩

芍藥

六兩

炙甘草

二兩

膠飴

一升

大棗

十二箇擘

右七味咬咀以水七升先煮六味取三升去滓內膠飴令消溫服一升日三若嘔者加生薑 若腹滿者去棗加茯苓四兩 若肺虛損不足痞氣加半夏五兩

易簡建中加減法

若婦人血疼男子心腹疴痛并四肢拘急疼痛甚者加遠志半兩 若或吐或瀉狀如霍亂及胃涉濕寒賊風入腹拘急切痛加

附子七錢半

若疝氣發作當於附子建中湯煎時加蜜一匙

頭許

若男子婦人諸虛不足小腹急痛脇肋臍脹下虛滿

胃中煩悸面色痿黃唇口乾燥少力身重短氣腰背強痛骨肉

酸疼行動喘乏不能飲食或因勞傷過度或因病後不復加黃

耆一兩半

若婦人一切血氣虛損及產後勞傷虛羸不足腹

中疝痛吸吸少氣小腹拘急痛引腰背時自汗出不思飲食加

當歸一兩名當歸建中湯產後半月每日三服令人精壯

大建中湯治內虛裏急少氣手足厥逆少腹攣急或腹滿弦急不

能食起卽微汗出陰縮或腹中寒痛不堪勞苦唇口舌乾精自

出或手足作寒作熱而煩苦酸痛不能常立此補中益氣

桂心

錢三

芍藥

黃耆

錢各二

甘草

炙

當歸

人參

錢各一

生薑

兩半

附子

分五

半夏

半二錢

棗

二枚

右咬咀水五盞煎至三盞去滓分三服

易簡杏子湯治欬嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞咯血痰飲

停積悉皆治療

人參

半夏

茯苓

細辛

半減

甘草

炙

官桂

半減

芍藥

五味子

乾薑

半減

右咬咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖剉五枚薑五片煎至

六分去滓服

若感冒得之加麻黃等分

若脾胃素實者用鶯粟殼去筋膜

碎剉以醋淹炒等分加之每服加烏梅一枚煎服其效尤驗嘔

逆惡心者不可用此 若久年欬嗽氣虛喘急去杏仁人參倍

加麻黃添芍藥如麻黃之數乾薑五味子各增一半名小青龍湯

大補十全散

參耆木茯草

芍地桂歸川

三五錢秤用

生薑棗水煎

婦人虛弱用

名美號十全

治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力喘欬中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之

肉桂

芍藥

甘草

黃耆

當歸

川芎

人參

白朮

茯苓

熟地黃

各等分

右爲籠末每服二大錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七分不

拘時候溫服桂芍藥甘草小建中湯也黃耆與此三物卽黃耆建中湯也人參茯苓白朮甘草四君子湯也川芎芍藥當歸四物湯也以其氣血俱衰陰陽並弱天得地之成數故名曰十全散易簡胃風湯治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下及腸胃濕毒下如荳汁或下瘀血日夜無度

人參

茯苓

川芎

官桂

當歸

芍藥

白朮

各等分

右咬咀每服二錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分去滓稍熱服空心小兒量力減之

若加熟地黃黃耆甘草等分足爲十味名七補湯 若虛勞嗽加五味子 若有痰加半夏 若發熱加柴胡 若有汗加牡

蠣 若虛寒加附子 若寒甚加乾薑皆依本方等分 若骨

蒸發熱飲食自若者用十補湯加柴胡二兩服之 若氣短加人

參 若小便不利加茯苓 若脈弦濇加川芎 若惡寒加官

桂 若脈濇加當歸 若腹痛加白芍藥 若胃熱濕盛加白

朮 若血瘀色紫者陳血也加熟地黃 若血鮮色紅者新血

也加生地黃 若寒熱者加柴胡 若肌熱者加地骨皮 若

脈洪實痛甚者加酒浸大黃

潔古云防風爲上使 黃連爲中使 地榆爲下使

千里漿一名水葫蘆

木瓜

紫蘊葉

官桂

各半兩

烏梅肉

赤茯苓

各一兩

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大噉化一丸嚥津

又方

百藥煎

烏梅肉

紫蘓葉

人參

甘草

麥門冬

右各等分爲細末煉蜜丸嚙化

荔芰湯

烏梅肉

甘草

各二兩

百藥煎

一兩

白芷

半兩

白檀

三錢

右爲細末湯點

蜜酒

好蜜

二斤

水一碗

細麴

一斤半

好乾醇

三兩

右先熬蜜水去花沫令絕冷下麴醇每日三攪三日熟

陽明證

葛根湯三方升麻湯大小青龍等湯在後保命集內承氣湯三方亦佳

易老門冬飲子治老弱虛人大渴

人參

枸杞

白茯苓

甘草

各三錢

五味子

麥門冬

去心各半兩

右爲麤末生薑水煎

麥門冬湯治勞復欲死人氣欲絕者用之有效

麥門冬

一兩

甘草

二兩炙

粳米

半合

右門冬去心爲細末水二盞煎粳米令熟去米約湯一小盞半

入藥五錢七棗二枚去核新竹葉十五片同煎至一大盞去滓

大溫服不能服者綿滴口中後人治小兒不能灌注者宜用

此綿滴法此方不用石膏以其三焦無大熱也兼自欲死之人

陽氣將絕者故不用石膏若加人參大妙

海藏五飲湯一留飲心下二澀飲脇下三痰飲胃中四溢飲膈上

五流飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷過多故有此疾

旋覆花

人參

陳皮

枳實

白朮

茯苓

厚朴

半夏

澤瀉

猪苓

前胡

桂心

芍藥

甘草

右等分剉每兩分四服水二盞生薑十片同煎至七分取清溫
飲無時忌食肉生冷滋味等物因酒有飲加葛根花縮砂仁
海藏已寒丸此丸不僭上陽生於下

治陰證服四逆輩胃中發燥而渴者或數日大便秘小便澀赤

服此丸上不躁大小便自利

肉桂

茯苓

各半兩

良薑

烏頭

炮各七錢

附子

炮