


傷寒論淺註下

無恒不作

紫劑堂



辨陽明病脈證

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者蓋以陽明之上燥氣主之太陽之津液為其於太陰脾土之中脾之脾約是也正陽陽明者蓋以燥氣者陽明之本也天有陰濕土之化所謂胃

家實是也少陽陽明者蓋以少陽之上相火發其汗誤利其小便則水穀之津液耗竭而少胃中燥則煩而實實則大便難是也此一節言陽明有太少正之分也

何謂陽明之為病燥氣為陽明之本氣燥氣盛於上胃家實也此復申明正陽陽明之為病也按此

正陽陽明之為病則胃家實於內一言以蔽之曰胃家實也此復申明正陽陽明之為病也按此

封云此是陽明證之提綱後稱陽明證三字俱有胃家實在內胃家實言以手按胃中實硬也如大陷

胸證按之石硬即名實熱梔子豉證按之心下濡即名虛煩夫心下俱以濡硬分虛實何獨胃中不以

濡硬分虛實乎此說與柯韻伯之論相表裏雖非正解亦可存參

問曰何緣得太陽陽明病答曰太陽之津液從胃太陽病若發汗若下若利小便此皆亡胃中津液胃中津

液乾燥其太陽未因轉屬於陽明其不更衣腸內之實腸內既大便必難通者此名太陽轉陽明也

此一節承上章太陽陽明病而言也然重申胃家實之旨是陽明病總綱

問曰有諸中者陽明病外證云何答曰胃熱之外見者肌肉之中身熱與太陽之表熱不同也熱氣汗自

出與太陽之自汗不惡寒裏熱已反惡熱也只因有胃家實之病根即見熱盛汗出之病證不此

同也表寒已解故不惡寒裏熱已反惡熱也惡寒反惡熱之病情內外俱備方是陽明之病證此一

節補出陽明外證合上節為一內一外之總綱

問曰身熱不惡寒既得病有始得之一日不發熱而惡寒者何也答曰陽明主金氣金氣微寒也邪初入

問曰身熱不惡寒既得病有始得之一日不發熱而惡寒者何也答曰陽明主金氣金氣微寒也邪初入

從熱雖得之一日不待解惡寒將自罷燥氣即自汗出而惡熱也此陽明之候也此承上文不惡寒反惡熱

而言也但上文言陽明自內達外之表證此言風寒外入之表證

問曰陽明病未惡寒何故自罷答曰陽明與他經不同居於中土也中土為萬物所歸故凡表寒裏熱之邪無不歸於中土而為實無所復傳於太陽其始雖頗惡寒而二日為陽明主氣之期正傳而邪亦傳正自此胃家實

為陽明病根也此復設問答以明惡寒自罷之故並指出胃家實之根也

過汗亡津液而轉屬陽明者固多而汗出不微與不因發汗者亦有轉屬之證本太陽病初得病時發其汗汗先出不微其太陽極熱之氣不能隨汗而泄而即愈燥氣

混為因轉屬陽明也此外傷寒發熱無汗其時即伏胃機嘔不能食發汗而反汗出濇濇然者則陽明內乾是轉屬之外轉屬陽明證也

上文歷言陽明本經之自為病此復申明太陽轉屬陽明之義除過榮

亡津液外又有此汗出不微而轉屬不因發汗而轉屬合常變而並言之也

三日為少陽主氣之期病固傷寒三日現陽明證脈大為邪歸中土無所復傳是宜乘其氣而樞轉外出矣今傷寒三日現陽明證脈大不能從少陽之樞而解也〔述〕自此以上六節

論陽明之氣主表而外合太陽主裏而內關津液之義也按此即高士宗所謂讀論者因證而識正氣

之出入因治而知經脈之循行則取之有本用之無窮矣

陽明與太陽正氣相為表裏傷寒陽明脈大浮而緩陽明身手足自溫是為病不在表裏邪氣亦交相為繫傷寒陽明脈大浮而緩陽明身手足自溫是為病不在表裏邪氣亦交相為繫傷寒陽明脈大浮而緩陽明身手足自溫是為病不在表裏邪氣亦交相為繫

身當發黃若小便自利者濕熱得以下泄故不能發黃至七日已八日值陽明主氣之期遂移其所繫而繫陽明胃燥則腸乾其大便不硬

者此為陽明也此節合下節明陽明與太陽相表裏之義也

傷寒由太陽轉繫陽明者其人不特大便澀然微汗出也此承上節而補言陽明之汗出即上章所云外

證俱在其中矣

陽明不特與太陽表裏而且與太陽少陽相合陽明中風不涉於本氣之燥化而涉於少陽之熱化故口苦咽乾復涉於太陽之濕化故腹滿微喘又涉於太陽之寒化故

而且與太陽少陽相合陽明中風不涉於本氣之燥化而涉於少陽之熱化故口苦咽乾復涉於太陽之濕化故腹滿微喘又涉於太陽之寒化故

而且與太陽少陽相合陽明中風不涉於本氣之燥化而涉於少陽之熱化故口苦咽乾復涉於太陽之濕化故腹滿微喘又涉於太陽之寒化故

故食難用飽飽則胃氣歸心不淫於微煩不但此也且不頭眩不能循必見小便難滯於中為腹滿此欲
作穀疸黃痺也雖已下之而腹滿如故所以然者淫精於經不能脈遲故也此一節言食氣入胃胃氣不能
淫精於經脈也

胃氣虛則不能陽明病法當多汗今反無汗其身瘡如蟲行皮中狀者此以胃久虛不能輸精故也
精皮毛毛脈合精行氣於府可知內而經脈外而此一節言胃氣虛不能輸精於皮毛也

陽明居中土主灌既於上下內外陽明病法當多反覺無汗而小便利寒氣中於裏而二日生氣之三日
四旁也茲先言中寒氣逆於上陽明病法當多反覺無汗而小便利寒氣中於裏而二日生氣之三日
不拘日嘔而欬即內經所謂邪中於手足厥者陽明病法當多反覺無汗而小便利寒氣中於裏而二日生氣之三日
數但覺嘔而欬即內經所謂邪中於手足厥者陽明病法當多反覺無汗而小便利寒氣中於裏而二日生氣之三日
頭痛若不欬不嘔手足不厥者既為寒氣已除而陽明正氣頭不痛此節言陽明之氣合寒氣而上逆於

頭不能既灌於四旁也凡言邪即以言正言正即以言邪為讀仲師書第一要法余於數節必重申之

不厭於複也述此章凡四節論陽明居中土主灌於上下內外四旁也

再言中風陽明病其證不一然但頭眩此證不在陽明提綱之內且有陽不惡寒知病屬陽明而不屬
氣逆於上陽明病其證不一然但頭眩此證不在陽明提綱之內且有陽不惡寒知病屬陽明而不屬
若能食吾即知其證無論但頭眩此證不在陽明提綱之內且有陽不惡寒知病屬陽明而不屬
名中風故於其能食矣由是熱氣上衝肺受天燥而發效極其人必咽痛若熱不上下不效者咽亦不

痛此一節言陽明之氣合風熱而上逆於咽不得流通於下也程扶生云陰邪下利故無汗而小便

利風邪上行故不惡寒而頭眩寒則嘔不能食風則能食寒則頭痛風則咽痛是風寒入胃之辨也按

雖本草之意不重在此而亦不可不知欬出於肺當云喉嚨痛今胃熱甚則咽痛二者相連氣必相

侵

更有鬱於陽明病其氣不能外無汗膀胱則小便不利心中懊惱者中土鬱而成熱熱氣為

中土之證陽明病其氣不能外無汗膀胱則小便不利心中懊惱者中土鬱而成熱熱氣為

此節合下節皆言陽明之氣鬱於中土不得外達而下輪也

此節合下節皆言陽明之氣鬱於中土不得外達而下輪也

此節合下節皆言陽明之氣鬱於中土不得外達而下輪也

此節合下節皆言陽明之氣鬱於中土不得外達而下輪也

此節合下節皆言陽明之氣鬱於中土不得外達而下輪也

此節合下節皆言陽明之氣鬱於中土不得外達而下輪也

此節合下節皆言陽明之氣鬱於中土不得外達而下輪也

鬱於中土若誤火更益其熱陽明病醫者不知所以無汗之被火周身之氣燥極而熱額上而微汗出又不得下小便不利者濕熱相必發黃此節即上節所言發黃之證借被火以言其更甚也凡誤服羌獨荊防及薑桂

烏附之類皆以被火概之陽明之脈起於鼻行髮際至額顙

陽明原主病今診脈浮而緊者仍見太陽表實無汗之脈陽明被太陽之必乘其所旺潮熱水之發作有

定時脈但浮而不者是見太陽表虛自汗之脈陽明被太陽之風邪外誤必為浮盜汗出此三節

言陽明主裏復外合於表氣內通於經脈復還於胃中也

陽明之脈起於鼻交陽明之病其口無不燥若熱止在但欲口漱水其經熱漱不欲嚥下者熱不在

熱其則通血妄行因此必發衄此言陽明之津液通於經脈而為衄也

陽明病本自汗出醫更重發汗外熱病已差而尚微煩不了了者此大便必硬故也津液為以發亡其津

液胃中乾燥故令大便硬今姑不問當問其小便日幾行若汗本日小便日三四行今煩之日止再行故

知大便不久自出蓋以大小便皆胃今為小便數少以津液當復還入胃中故知不久必大便也此胃府

硬亦有不必下者此言陽明之津液復還於胃中也

陽明證既知有不必下者傷寒嘔多為陽明胃氣之雖有陽明燥熱證不可攻之此一節言胃氣虛者

不可下也述陽明有胃氣有悍氣有燥氣胃氣者柔和之氣也悍氣者慄悍滑利別走陽明者也

燥氣者燥金之氣也病在悍氣者可攻病在燥氣者可攻病在胃氣者不可攻病在燥氣而胃氣虛者

亦不可攻故此三節俱言不可攻也按師言其不可非坐視而不救也必有論以可者在正面旁面

對面皆可以悟其治法若常器之補亡論必處處補出方治無論其搔不著癢也即有偶合之處反令

為飛魚躍水流花放活潑文章俱成糟粕長洲汪苓友多宗其說何其陋歟



陽明病外有身熱自汗出不惡寒反惡熱之證便知其內為胃家實之證但胃家實只指不下利而言務宜活看亦知其實處即是虛處若心下硬滿者止在心下尚未及兼痛此陽明水穀虛不可攻之若攻之則穀氣盡利遂不止者死其利自止者腐去而邪亦不留故愈胃無所仰虛硬虛滿誤此一節言虛而假實者不可下也受業薛步雲按心下為陽明之膈膈實者腹必虛氣從虛開是陽

明假實證攻之是為重虛

內經云中於面則下陽明以陽明病通面令見赤色為陽氣怫鬱於表不可攻之若攻之胃氣從虛津液大必復陽明之脈上循於面故也陽明病通面令見赤色為陽氣怫鬱於表發熱面色之赤黃皮毛今鬱熱在表三焦失其決清之官膀胱失其氣化之職小便不利為發黃也此一節言外實內虛者不可下也

不可攻者既明而可陽明病不吐不下可知其胃心煩者以胃絡上通於心陽明之燥大與少陰之可與攻者更不可以不講氣不虛也此一節言陽明胃府不和宜與調胃承氣也述此三節皆言可攻之證而又以明三

承氣之各有所主也

陽明病脈遲為陽邪入於裏陰然止言脈猶不足憑也必以雖汗出為陽熱之內蒸而表未罷不惡寒者定其表證之已罷然表證已罷尤當再驗其裏證陽明其身必重邪結於中必短氣腹滿難以下通而為喘此已屬大承氣證矣然猶必身熱變為潮熱有潮熱者此外欲解可攻裏也又必通身熱蒸之汗變為知其熱邪盡入於胃乃可以指其實在曰手足濇然而汗出者此大便已硬也以大承氣湯主之若其人汗雖多微發證真面目乃可指其實在曰手足濇然而汗出者此大便已硬也以大承氣湯主之若其人汗雖多微發熱惡寒者外未解也不惡寒而其熱不潮為胃未全實未可與大承氣湯若人腹大滿不通者凡不見潮可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下

大承氣湯方

大黃四兩酒洗

厚朴半斤炙

枳實五枚

芒硝三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去



滓納大黃者取二升去滓納芒硝更上火微煮一兩沸分溫再服得下餘勿服 武陵陳氏方云名承氣始即亢則害承乃制之義乎亢極反兼勝己之化承者以下承上也夫天地一理萬物一氣故寒極生熱熱極生寒物窮則變未有亢極而不變者傷寒邪熱入胃津液耗真陰虛陽勝陰病即謂陽勝陰虛汗之則死下之則愈急以苦寒勝熱之劑救將絕之陰瀉亢盛之陽承氣所以有輓回造化之功也然不言承亢而言承氣何哉夫寒熱流轉不過一氣之變遷而已用藥制方彼氣機之不可變者力難矯之亦第就氣機之必變者而一承之耳設其氣有陽無陰一亢而不可復則為脈澀直視喘滿者死何則以其氣機已絕更無可承之氣也由是言之聖人雖盡人工之妙止合乎天運之常耳不云承氣而云何 按陳氏此註必須熟讀

小承氣湯方

大黃四兩

厚朴二兩去皮

枳實三枚大者

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初

服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

胃合海冰無病之人亦日有潮熱但不覺耳病則氣隨潮而發現於外故凡陽明病必有潮熱又大便微硬者方可與大承氣湯若大便不硬者

即不可與之然而大便又不可盡信也若其不大便已六七日有燥屎與否恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中下轉而失氣者此有燥屎乃可以大攻之若不轉失氣者為胃氣虛此但初頭硬後必溏

不可攻之攻之謂胃氣愈虛必脹滿不能食也試觀胃虛之人渴欲飲水者與水則噦而不可與之

其後復發潮熱者必大便復硬但溏者既去則而甚少也止須以小承氣湯和之然亦必須轉失氣不轉

失氣者且難再投慎不可氣以妄攻也此言大承氣行便硬小承氣行燥屎各有所主而胃氣虛者

慎不可攻也

慎不可攻也

陽明譭語其中有虛實之不知夫陽明實則語皆狂
同生死之各異者不可不知病陽明實則語皆狂
蓋譭語原非死證而邪氣入直視而譭語更危矣
藏以致精氣不榮於目至喘滿者脾肺不交血死及下利者脾腎不固而亦死

此章統論譭語各證之治法也譭語之時聆其聲有正之聲輕微重複之語即是鄭聲註家分而為
兩皆相沿之誤也故止首節提出鄭聲而後無鄭聲之證

有亡陽而譭語者汗為心液心液為陽中之大陽發汗多則心液虛矣若重發汗者心液為陰陰虛於內則心主
血脈短者心液亡心死若脈而且自和者病雖不死此言亡陽譭語也

有亡陰而傷若吐若下後不解其陰液亡矣不大便五六日上至於十餘日陽明旺於申酉日哺所
時而發潮熱且全顯出本來不惡寒問答熱甚神昏無獨語無所如見鬼狀若劇者神識不發則不識人

於外而循衣摸牀陰孤於內而惕而不安陽脫於微喘精不榮直視此陽熱甚而陰液亡其生死只在
脈弦者為陰氣未絕可生血若脈濇者為陰血已竭必死而苟病微者無以上見發熱譭語者以大承氣湯主之若一

服利即止後服蓋以大承氣用之得當可以養陰此言亡陰譭語也按柯氏云吐下後不解病有微
劇之分微者是邪氣實當以下解劇者邪正交爭當以脈斷其死生弦者是氣實不失為下證故生澀

者是正氣虛不可更下故死生死二字從治病者看出又是一解却是正解
有亡津液者陽明燥熱之病其人多汗以津液外出以胃中乾燥大便必硬硬則和而譭語以小承氣湯

主之若一服譭語止更莫復服此言亡津液而譭語也
然其中虛實之辨當專辨其脈陽明病其譭語有虛有發潮熱脈滑而疾者此陽明裏小承氣湯主之然服之因其證為

與承氣湯一升後腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣勿更與之設明日不大便脈反變滑微澀者則
氣衰澀則裏虛也邪法正為難治熱邪雖不可更與承氣湯也此以脈而辨譭語之虛實前欲與大承

氣以小承氣為法今欲與小承氣即以小承氣先與為試法可見古人之謹慎如此 按柯氏云勢若

不得不通者可用蜜導虛甚者與四逆湯陰得陽則解矣愚以救逆當臨時審其所急不可預有成見

且有在胃在腸亦須分別內經 陽明病若 譫語有潮熱反不能食者胃滿也胃中必有燥屎五六枚也若

云胃病則腸虛腸滿則胃虛 陽明病若 譫語有潮熱反不能食者胃滿也胃中必有燥屎五六枚也若

語語潮能食者胃無燥屎故 但便硬爾俱宜大承氣湯下之〔述〕此以能食不能食以驗譫語有燥

屎便硬之不同而又以明腸胃更虛更滿之義也 胃主納穀胃滿則不能容穀故不能食腸主變化

腸滿則難於變化故但硬然腸雖滿而胃則虛故又能食

間有熱入血室而譫語者以衝任二陽明病熱過於下血血者神也譫語者血脫神 此為熱入血室何以

脈為血室皆起於胸中與陽明合故陽明病熱過於下血血者神也譫語者血脫神 此為熱入血室何以

室男女皆有之在男絡唇口而但頭汗出不到別處者汗蒸也肝統諸經之血 刺之期門隨其實而瀉之

為髮鬚在女月事以時下事也 但頭汗出不到別處者汗蒸也肝統諸經之血 刺之期門隨其實而瀉之

伸熱從皮膚而泚然汗出則愈 此言下血譫語也

外有因風致燥而譫語者奈何夫汗出不見其譫語者以有燥屎在胃中此為風也謂風木之邪干於中

於實此為表虛裏實故也蓋風燥症候過經宜下下早以 下之則愈統其方曰宜大承氣湯 此胃風木之邪

燥其津液而為譫語也

攻裏太早致裏實而譫語者言之詳矣而攻傷寒四日為太陰五日為少陰主氣之期病脈沈太陰少陰

生而為喘滿沈為在裏而反發其表汗府則胃津液越出大便結燥為難誤發汗表虛大便秘難裏實其虛靈

天君因邪實而失久則譫語 此承上節表虛裏實而補出尋常裏實之因以備互證也

其靈實口增實 久則譫語 此承上節表虛裏實而補出尋常裏實之因以備互證也

者太陽陽明少陽三陽合而病腹滿陽明經熱身重太陽經熱難以轉側而一身之前後左右俱熱氣

滿漫口不仁而面垢熱合少陽譫語熱合陽明遺尿熱合太陽大抵三陽主外三陰主內陽實於外陰虛於

矣

內故不可發汗以發汗則譫語陽浮於中則陰孤於內故不可下之則額上生汗手足逆冷醫者審其未
耗欲竭之陰若兼治太陽陽明若自汗出證者陽少陽之總歸白虎湯主之亦非自汗出惡寒邪抑塞此言三陽合病
不如專顧陽明而為譫語也

而為譫語也

譫語亦有二陽併病者太陽陽明二陽併病太陽病氣俱已歸併於陽明無復言頭痛惡寒之表證則為太陽證罷但有發潮熱手足絳聚汗出大便

難而譫語者皆陽明結邪下之則愈宜大承氣湯此言二陽併病而為譫語也

陽明表證少而裏證多下法之外發汗尚宜詳真陽明病在表脈則浮而涉於裏緊咽連胃脘胸膈鬱於

而溫針更無論矣然病兼表裏又另有其法陽明病其表脈則浮而涉於裏緊咽連胃脘胸膈鬱於

裏邪氣咽燥口苦地手太陽肺主天氣不降故腹滿而喘此病陽明發熱出汗不惡寒反惡熱之解此病

相侵故咽燥口苦地手太陽肺主天氣不降故腹滿而喘此病陽明發熱出汗不惡寒反惡熱之解此病

陽明之表也土身重可轉其機為兩解之法若誤發其汗則傷胃而躁傷心而情憤陰液既傷則陽反增譫

氣不和則為身重必見怵惕交火不煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣而乘虛動膈又從膈而上

語若誤加燒鍼則經脈必見怵惕交火不煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣而乘虛動膈又從膈而上

心中懊憹心苗舌上有胎者熱甚而為邪氣宜梔子豉湯導火熱以下降引主之此言陽明病兼表裏

非汗下溫鍼所能治也

然梔子豉湯止為熱邪乘心之劑若前證外渴欲飲水口乾舌燥者為陽明經氣之燥熱也又宜白虎加人參湯主之

也恐不能兼清陽明經氣之燥熱若前證外渴欲飲水口乾舌燥者為陽明經氣之燥熱也又宜白虎加人參湯主之

此承梔子豉湯而進一步言也

白虎加人參湯止清若脈浮發熱渴欲飲水如前證小便不利者為陽明累及太陰脾氣不能散精歸

脾調肺以導水又必以清熱滋陰豬苓湯主之此承白虎加人參湯又進一步言也

豬苓湯方

豬苓去皮

茯苓

阿膠

滑石碎

澤瀉各一

右五味以水四升先煮

四味取二升去滓納下阿膠烊消溫服七合日三服

猪苓湯助脾氣之轉輸肺氣之陽明病汗出過多而渴者為津液外越以致中乾作渴非不可與猪苓湯通調利小便甚為得法矣若陽明病汗出過多而渴者為津液外越以致中乾作渴非不可與猪苓湯以汗多胃中燥恐猪苓湯復利其小利津液故也自陽明病脈浮而緊至此看似四節實是一節細

玩其段段相承上下聯絡以見傷寒不可執定一法用藥當如轉環也

且陽明中有寒冷燥熱之分不可脈浮而寒則遲陰陽明或土不能下冷少表熱明或土而兩主乎內則不辨試先言下焦之虛寒夫虛則脈浮而寒則遲陰陽明或土而兩主乎內則裏寒或陽之氣不升故下利清穀而止者以四逆湯主之〔述〕此節言陽明下焦虛寒也本書凡三節

以上中下三焦論陽明有寒冷燥熱之病也

再言中焦若胃中虛冷於大虛虛極則寒寒則失其消穀之用每由食少而至於不能食者若腹飲水則

再言上焦經脈之脈浮發熱熱循經脈而口乾鼻燥其能食者熱在經脈不傷中焦則發衄此言陽明

再言上焦經脈之脈浮發熱熱循經脈而口乾鼻燥其能食者熱在經脈不傷中焦則發衄此言陽明

上焦經脈燥熱也

陽明主潤若終闔而無開機則死矣所以言之不厭陽明病解而遽下之其外有熱而手足溫熱在於不

結胸胃絡不能上心中懊憹虛後胃飢不能食陽明之津液主灌漑於上下今陽明氣虛但頭汗出而餘

汗者宜上下通其桅子豉湯主之受業薛步雲按桅子豉湯此言陽明之氣不得交通上下而為桅子豉湯

證也〔述〕合下五節論陽明主闔貴得樞轉以出若闔於心胸腹胃之間無開轉之機則死矣

其或闔於胸陽明病發潮熱則大便應硬小大便溲而小便自可止逆於胸膈之間也至二便胸膈滿而不

能去者宜從樞而小柴胡湯主之此言陽明之氣闔於胸膈之間宜樞轉而出也

然而小柴胡之用不止此也夫陽明之氣由下而上由陽明病膈下硬滿不得由樞以出也不得由樞以

液下焦不通津不大便胃氣不和而嘔上焦不通大舌上必現白胎者可與小柴胡湯調和三焦上焦得



通胎而白津液得下而大胃氣因和而暢氣相旋轉身澌然而汗出解也 此言小柴胡湯不特達陽明之

氣於外更能調和上下之氣流通內外之津液也

今從主闔之理藉樞開之陽明中風陽脈弦太陽浮陽明大陽明兼見三脈宜可以相藉而樞開而氣短大不
之所以然者而深論之陽明中風陽脈弦太陽浮陽明大陽明兼見三脈宜可以相藉而樞開而氣短大不
開而出闔腹都滿闔於脇下及心痛手以久按其心腹之病處氣不通脈起於久按之則闔而復闔也陽明之
於腹則不得鼻乾不得汗陽明隨衛氣嗜卧土內鬱而一身及面目悉黃脾不能為胃小便難陽明之氣在
外達故有潮熱陽明氣逆時時噦前後邪氣經故耳前後後腫醫者取足陽明之經刺之少差然樞外
病而不解病過十日又當三陰脈續浮者知其不涉於陰仍欲從與小柴胡湯以轉其脈但浮則無餘證
者是病機欲從太陽與麻黃湯以助若不尿腹滿加噦者是尿則甚於十日之前之小便難矣腹滿加噦則甚
於十日之前之腹滿時時噦不治之證

開轉則一息不運鍼機窮矣故經曰太陽為開陽明為闔少陽為樞三經者不得相失也

以上各法無非使氣機之旋轉也陽明病自汗出不可再發其汗若再發其汗見小便便利者此為津液內竭津
至於下法之窮又有專法以濟之陽明病自汗出不可再發其汗若再發其汗見小便便利者此為津液內竭津
既竭則大便硬雖硬不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若上瓜根及與大猪膽汁皆可為導
得言矣然大便雖硬不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若上瓜根及與大猪膽汁皆可為導

〔述〕此言陽明氣機總要其旋轉津液內竭者不宜內攻而宜外取也蓋以外無潮熱內無譫語與可


攻之證不同須待也

蜜煎導方

蜜七合一味納銅器中微火煎之稍凝似飴狀攪之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指

長二寸許當熱時急作冷則硬以納穀道中以手急抱欲大便時乃去之

猪膽汁方



大猪膽一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中如一食頃當大便出

陽明可汗之症亦有在肌在表之分茲先言其陽明病表氣脈遲實而膚表虛故汗出多微惡寒者表在肌蓋太陽以皮毛為表陽明以肌腠為表

未解也可發汗宜桂枝湯 此節合下節言陽明病在肌表而可以汗解也蓋陽明以肌腠為表在太陽

則謂之解肌在陽明則謂之發汗也

陽明病邪在表則表氣拒無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯 〔述〕此陽明之表證表脈也

證俱是太陽而屬之陽明者不頭痛項強故也要知二方全為表邪而設不為太陽而設見麻黃證即

用麻黃湯見桂枝證即用桂枝湯不必問其為太陽陽明也若惡寒已罷則二方所必禁矣

熱有鬱於氣分者陽明居中心土而色黃陽明病若發熱汗出此為熱汗從越不能發黃也若熱氣上但頭汗出而身無汗其

頸而還津液不能下行而小便不利行而渴飲水漿者此為瘧熱在裏色土鬱身必發黃以茵陳蒿湯主之

〔述〕此言熱鬱氣分而為茵陳蒿湯證也合下節言陽明為燥熱之經總統氣血故可病於氣而亦可

病於血也

茵陳蒿湯方

茵陳蒿六兩

梔子十四枚

大黃二兩去皮

右三味以水一斗先煮茵陳減六升納二味煮取三升

去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

熱有鬱於血分者內經云上氣不足下氣有餘久之不以時上則善忘今陽明證其人善忘者乃血虛氣行俱併於下故必有蓄血所以然者本有久瘀之

血停積於下心主血瘀血久停於下而不得上則心氣虛故令善忘陽明主燥其屎雖硬血又主大便反易血久則黑火極反見水化故其色必黑宜

抵當湯下之 〔述〕此言熱鬱血分而為抵當湯證也 師辨太陽蓄血證必驗其小便利辨陽明蓄血

證必驗其大便易亦各從其府而言之

大承氣湯為陽明之攻藥然陽明病既下之而熱邪乘心中懊憹而煩絕以虛煩之梔子胃中有燥屎者為胃實可攻胃虛不可攻不陷於心而陷於胃如徒用梔子致湯無濟於事不可攻若腹只微滿內虛初頭硬後必溏胃無燥屎不可攻之是則可攻不可攻也若有燥屎者宜大承氣湯〔述〕此章凡六節五節俱論大承氣湯可以攻胃實不可以攻胃虛矣

又提虛寒一條以結之弟實有按少腹按之軟而不拒按者無燥屎也小腹硬而拒按者有燥屎也此辨證之捷訣

何以知胃中有燥屎也然病人不大便五六日邪入下腸中環繞於臍作痛煩極而躁隨所發作有時者此有燥屎故使不大便也此承上文胃中有燥屎者可攻而言也

然胃實之證必以脈實為憑否則又須分別病人陽氣盛而煩熱得陰汗出則解若不又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也然又須分須憑脈脈實者為病宜下之若脈浮虛者為病宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯蓋以脈實為發熱而虛為裏實也〔述〕此言憑脈之虛實以辨表裏以施汗下不可概與承氣也

服實固宜下矣然有不大後六七日不大便煩仍不解腹仍滿痛者此有之未盡燥屎也所以然者能容水穀三年五斗本有宿食故也宜大承氣湯以推陳致新是知大承氣湯不〔述〕此承上文下之而言也此證者

限在六七日以六七日不大便則六七日所食之物又為宿食所以用得大承氣

下後有燥屎既詳其驗法矣而未下者又有驗之之法病人小便不利若津液還入胃中則大便下而大便結聚不下而難結者自結於中其乍易嘔又於日時有微熱氣滿不喘胃得和而不能卧者皆有燥屎也宜大承氣湯此又識燥屎之變法醫人不可以不知也

雖然陽明實熱之證固多而虛食穀欲嘔者屬陽明胃氣也以吳茱萸湯主之若得此湯而反劇者人必寒者亦復不少胃主容穀今陰虛相表裏其食穀欲嘔者是陽明虛甚中見太陰為中焦之胃氣虛寒也服此藥黃湯之後反劇者是太陰虛回中見陽明為上焦之胃口轉熱也此為從陰出陽寒去熱生之吉兆可

以析其疑曰太陰濕土喜屬上焦而向也書曰若藥不瞑眩厥得陽明之燥氣其病機愈也疾不瘳其斯之謂歟
提虛寒一條以結上文五節之意
〔述〕上五節論陽明實熱之證此節又

吳茱萸湯方

吳茱萸黃一升

酒洗

人參三兩

生薑六兩

大棗十二枚

右四味以水七升煮取三升去滓溫服

七合日三服

前言太陽陽明今試重申其轉屬之義

太陽病寸緩為陽關浮為中尺弱為陰其人發熱汗出復惡寒皆為桂枝證不嘔知裏氣之和裏氣既和但心下痞非本有者此以醫下之太早也如其不因下者邪熱入裏則罷太陽之病緣何心下又發痞

人不惡寒而咀渴者此太陽轉屬陽明也其小便數者津液下流大便必硬誤下者邪熱入裏則罷太陽之病無所為痞滿之苦也若津液渴欲飲水宜少少與之燥然此但因其以通權法救之審其實係水渴者又宜

五苓散助脾氣之轉輸而使水津之散布夫曰十日無所苦尿氣易既不可用飲水不至數升白虎加人陽而此散又非所宜惟助脾益以轉輸多餘煖水以出汗風內外俱鬆須知病從太陽而入者仍從太陽

明者或異或同可分可合亦視治者之法耳
〔述〕此章凡七節皆論太陽陽明也首節統論轉屬之意次節甚言津液之不可亡三節四節申言亡津液遂成胃熱脾弱之證五節言發汗後轉屬陽明

六節言吐後轉屬陽明七節總言發汗吐下皆能轉屬陽明皆所以亡津液也

津液根於身脈寸緩陽微而汗出少者陰陽為自和也汗出多者陰液亡而陽為太過此皆自出陽脈不中之真陰脈寸緩陽微而汗出少者同為自和也汗出多者反獨盛故為太過此皆自出陽脈不

而實醫因發其汗而出多者亦為太過太過為陽亢與絕而不和於裏何也發汗亡其津液而大便因硬也上節亡津液是本旨而五苓散特為轉屬證之變治非亡津液之主方此節復足上文亡津液之意而治

法自在言外汪苓友云即用下麻仁丸愚以為麻仁丸未盡其量

陽絕於裏其脈奈何蓋胃土為脈浮而乳浮為亢陽乳為孤陰浮乳相搏則胃之氣盛而生熱熱則津液愈

陽土貴得陰氣以和之若病人脈浮而乳浮為亢陽乳為孤陰浮乳相搏則胃之氣盛而生熱熱則津液愈

陽土貴得陰氣以和之若病人脈浮而乳浮為亢陽乳為孤陰浮乳相搏則胃之氣盛而生熱熱則津液愈

陽土貴得陰氣以和之若病人脈浮而乳浮為亢陽乳為孤陰浮乳相搏則胃之氣盛而生熱熱則津液愈

