

金匱懸解卷十一

昌邑黃元御坤載著

長沙徐樹銘校正

內傷雜病

消渴小便不利淋

消渴癃淋皆厥陰之病也厥陰風木之氣性主疏泄泄而不藏津液失亡則爲消渴泄而不通川瀆瘀塞則爲癃淋其標是燥其本則溼消渴者肺胃之燥也癃淋者肝脾之溼也燥勝其溼則有消渴而無淋溼勝其燥則有淋而無消渴燥溼相敵上下不交則消渴見於上淋見於下上下之機緘總在乎厥陰有合病者有分病者其分合之概則有消渴也有消渴而小便不利也有消渴而小便反多也有小便不利也有淋也有淋而消渴也病根非一而厥陰爲病則一緣厥陰乙



金匱懸解卷十一

昌邑黃元御坤載著

長沙徐樹銘校注

內傷雜病

消渴小便不利淋

消渴癃淋皆厥陰之病也厥陰風木之氣性主疏泄泄而不藏津液失亡則爲消渴泄而不通川瀆瘀塞則爲癃淋其標是燥其本則溼消渴者肺胃之燥也癃淋者肝脾之溼也燥勝其溼則有消渴而無淋溼勝其燥則有淋而無消渴燥溼相敵上下不交則消渴見於上淋見於下上下之機緘總在乎厥陰有合病者有分病者其分合之概則有消渴也有消渴而小便不利也有消渴而小便反多也有小便不利也有淋也有淋而消渴也病根非一而厥陰爲病則一緣厥陰乙



木位居水火之中火勝於上則風木疏泄而病消渴水盛於下則風木鬱遏而病癃淋無異故也

消渴一

厥陰之爲病消渴氣上衝心心中疼熱飢而不欲食食即吐
或下之利不止

此段見傷寒厥陰厥陰之經以風木而胎君火肝藏血而心藏液病而風動火炎血液耗傷津亡肺燥則生消渴風木不舒奔騰擊撞故氣上衝心心中疼熱木鬱鬪土飲食不消故胃口雖飢而腹不欲言食木鬱蠹化是生蛻蟲食下不消必復嘔出蛻隨嘔上故食則吐蛻下之脾敗肝鬱風木疏泄故下利不止厥陰不病則已病則必見諸證外感內傷無有不然後世庸工不解以爲傷寒之病金匱此

條係後人誤從傷寒採入是於傷寒雜病一絲不曉何故
妄言無忌一至於此

消渴二

寸口脈浮而遲浮則爲虛遲則爲勞虛則衛氣不足勞則營氣竭趺陽脈浮而數浮則爲氣數卽消穀而大便堅氣盛則溲數溲數則便堅堅數相搏卽爲消渴

寸口脈浮而遲浮卽爲表氣之虛弱遲卽爲裏氣之勞傷表陽虛弱卽胃氣不足裏陰勞傷則營氣枯竭趺陽脈浮而數浮則爲陽氣之盛數卽爲消穀而大便堅陽氣盛則溲溺數溲溺數則大便堅大便堅與小便數相合津液滲泄卽爲消渴蓋消渴之病在胃不在脾素問陰陽別論二陽結謂之消二陽者陽明也手陽明以燥金主令金燥則



消水而便堅足陽明從燥金化氣土燥則消穀而洩數渴手足陽明之合氣而燥結於腸胃者也太陰行氣於陰脈候於寸口陽明行氣於三陽脈候於趺陽太陰主升陰中之陽升於脈絡則經氣旺陽明主降陽中之陽降於腸胃則府氣旺太陰虛而經中之氣衰是以寸口浮遲衛氣不足而營氣消竭此以虛勞傷其營衛營衛耗弱乃發熱作渴之原傷寒所謂諸弱發熱弱者必渴是也陽明盛而府中之氣旺是以趺陽浮數戊土洩數而庚金便堅此以燥熱鑠其津液津液枯涸乃消穀引飲之根故消渴之病太陰衰而陽明盛經氣虛而府氣實所謂壯火之食氣者也

消渴三

趺陽脈數胃中有熱卽消穀引飲大便必堅小便卽數
趺陽脈數則胃中有熱胃熱卽善飢善渴消穀而引飲穀
消水化中氣有餘則穀傳於後而大便必堅水滲於前而
小便卽數便堅溲數土金俱燥是消渴也

淋四

淋之爲病小便如粟狀少腹弦急痛引臍中

淋之爲病溺孔艱澑如粟粒阻梗而不利也乙木鬱陷故
少腹弦急肝氣賊脾故痛引臍中土升則木達水寒土溼
脾氣下陷乙木抑遏不能上達鬱怒而賊己土是以少腹
弦急而痛引臍中也膀胱者州都之官津液藏焉氣化則
能出蓋化水者肺金也泄水者肝木也土溼則金逆於上不
能化水木陷於下不能泄水小便所以不利也木以疏泄

爲本性土溼木鬱疏泄不行而強欲泄之愈泄則愈梗愈梗則愈泄是以頻數而痛澁溼氣遏陷鬱而爲熱是以赤而閉癃此與痢家之墜痛一理痢病於後而淋病於前也其燥熱在肝而溼寒在脾後世庸工專以寒泄而治淋病殺人多矣

淋五

淋家不可發汗發汗則必便血

淋家土溼木鬱怒生風燥汗之再亡血中溫氣風木愈鬱疏泄失藏必便血也此段見傷寒不可汗中

消渴六

渴欲飲水口乾舌燥者白虎加入參湯主之 方在腸病此段見傷寒陽明渴欲飲水口渴舌燥者金液火刑熱傷

肺氣不能化生津液澤藏府而潤口舌也白虎加人參湯知母石膏泄熱而清金參甘粳米益氣而培土土旺金水充津化解渴除煩之聖法也

消渴七

渴欲飲水不止者文蛤散主之

渴欲飲水不止者水盛土敗火升而刑金也文蛤散利水而泄溼止渴而清煩也傷寒意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散文蛤散卽五苓散證之輕者上燥下溼故意欲飲水而反不渴其渴欲飲水不止實非真渴也

文蛤散

五十七

方見傷寒太陽

文蛤

兩

文右一味研爲散以沸湯五合和服方寸七

消渴八

渴欲飲水水入卽吐者名曰水逆五苓散主之方在痰飲
此段見傷寒太陽欲飲水水入則吐者以有停水在兩
水莫容是以吐出五苓散二苓澤瀉利水而泄溼白朮桂
枝燥土而疏木也

消渴小便不利九

脈浮小便不利微熱消渴者宜利小便發汗五苓散主之方見

飲疾

此段見傷寒太陽脈浮小便不利微熱消渴者溼盛於下
火升而不降也宜利小便以泄下焦之溼發汗以泄上焦
之溼五苓散上下滲泄使溼淫盡化汗濁而去溼盛發渴

之神方也

人參白虎證是
蛤五苓猪苓證是
燥盛作渴文
溼盛作渴

消渴小便不利十

脈浮發熱渴欲飲水小便不利猪苓湯主之

此段見傷寒陽明溼盛於下陽氣鬱格故脈浮發熱溼吐木鬱風燥亡津一苓滑澤利水而泄溼阿膠滋木而清風也

猪苓湯五十八

方見傷寒陽明

猪苓

一兩
去皮

茯苓

一兩
兩

澤瀉

一兩
兩

滑石

一兩
兩

阿膠

一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內阿膠烊消盡溫服七合日三服

消渴十一

男子消渴小便反多以飲一斗小便一斗腎氣丸主之

凡消渴之病率小便不利緣土溼木遏鬱生風燥上而津液損耗則爲消渴下而疏泄不行則小便不利男子消渴而小便反多者乙木善泄而癸水失職也小便之通塞司於膀胱而膀胱之開闔職在三焦靈樞本論三焦者太絳膀胱納下焦實則癃閼虛則遺溺以水性下潤而火性上炎水欲降而火升之則溲溺不致遺失故三焦之火能約小便夫水性善藏火性善泄素問靈蘭秘典膀胱者州都之官津液藏焉化則能出矣三焦者決瀆之官水道出焉

火盛土燥則肺氣降灑而水化火旺水暖則肺氣膀胱主升達而木泄水溫土燥金生木泄皆三焦之力也

膀胱主藏三焦主出乃火實而水虛反閉癃而不出火虛而水實反遺溺而不藏此何以故蓋蟄藏者腎之能也轉輸者膀胱之事也水藏於腎則水道清利而不寒榮暢善於泄水

火泄於膀胱則水府熱濇而不通所謂實則閉癃者一也
之火不藏於腎而泄於膀胱也夫三焦本藏於腎今何
而泄於膀胱則厥陰之咎也以腎主藏肝主疏泄水善
藏而火旺於少陰是謂腎氣腎氣溫暖木榮風靜則癸水善
能藏風木疏泄必由水寒而寒有微甚之差則泄有通塞
之殊其腎水微寒而相火未至極衰則木陷於水而生下
熱泄而不通乃病淋漓所謂實則閉癃者木愈泄而水愈
藏也其腎水極寒而相火不存微淡則木鬱於水而無下
泄也消渴者厥陰風木之病厥陰母水而子火病則風木
疏泄火不歸根下寒而上熱上熱則善渴故飲水一斗下

寒則善洩故小便一斗診要經絡論厥陰終者中熱而善
溺是也而木鬱風動之由全因土溼土溼之故全以水安
水寒者腎氣之敗也腎氣丸附子桂枝溫腎氣而達木鬱
薯蕷茱萸斂肝氣而攝水澌茯苓澤瀉滲己土而泄溼地
黃丹皮滋乙木而清風也

腎氣丸

五十九

附子兩桂枝兩薯蕷兩山茱萸四兩茯苓三兩澤瀉三兩丹皮三兩乾地黃八兩

右八昧末之煉蜜爲丸梧子大酒下十五丸日再服

消渴小便不利十二

小便不利者有水氣其人若渴苦瞿麥丸主之
小便不利者內有水氣在下鬱其乙木其人若渴是寒溼

格其君相之火上鑠肺津也苦蕷瞿麥丸瞿麥附子泄水而溫腎寒茱萸苦蕷斂金而清肺燥也此與腎氣丸證皆上有燥熱下有寒溼彼則小便反多此則小便不利緣彼無水氣則上燥偏多此有水氣則下溼偏盛燥多則風木上達而善泄溼多則風木下鬱而不能泄也

苦蕷瞿麥丸

六十

茯苓

王
兩
芍藥

三
兩
瞿麥

一
苦蕷根

三
兩
附子

一枝
炮

右五味末之煉蜜爲丸梧子大飲服三丸日三服不知增至七八九以小便利腹中溫爲知

小便不利十三

小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓戎鹽湯亦主之

小便不利以土溼木遏鬱而生熱熱傳己土而入膀胱是

以小便黃赤黃者溼土之下傳赤者君火之下鬱也

君火始於乙木故木鬱而生下熱

木氣遏陷泄而不通故水道淋濇蒲灰散

蒲灰寒而通淋濇滑石淡滲而泄溼熱也滑石白魚散

石滲溼而泄熱白魚髮灰利水而開癃也茯苓戎鹽湯

戎鹽利水而清熱也

蒲灰散

六十一

蒲灰

七分

滑石

三分

右二味杵爲散飲服半錢七日三服

滑石白魚散

六十二

滑石一斤白魚一斤亂髮

一斤

右三味爲散飲服方寸匕日三服

茯苓戎鹽湯

六十三

茯苓半斤白朮二兩
甘草一錢大鹽一
錢彈丸一枚

右三味先將茯苓白朮煎成人戎鹽再煎分溫三服
也



南京中医药大学图书馆版权所有

卷之二



南京中医药大学图书馆版权所有