

辨傷寒項背強例第十二

項背強者。太陽表邪也。無汗脉浮緊。宜發汗麻黃湯。
有汗脉浮緩。宜解肌桂枝湯。用羌活冲和湯。太陽風
症。角弓背反張。獨搖頭卒口噤。用小續命湯。治在瘧
症條下。有加減法。項背強几几。無汗。用發汗。有汗用
實表。几几如短羽之鳥。不能飛騰。動則伸縮其頸。而
兩翅聳動欲飛之貌。其病者。頭項一伸一縮。故几几
也。

辨傷寒頭搖例第十三

頭搖者。裡病也。內有痛則頭搖。宜察痛而治之。二者風瘧。獨頭搖卒口噤。二者心絕則頭搖。形狀如烟煤直視者。死。凡頭搖多屬于風。風主動搖。風脉必弦。用神朮湯。加天麻。羌防。全蝎。姜蚕之類是也。

辨傷寒無汗例第十

四

無汗者寒邪中經。腠裏固密。津液內滲而無汗也。風暑溼皆有汗。惟寒邪獨不汗出。太陽症無汗者。冬用麻黃湯。三時用芎蘇散。冲和湯。六神湯。選用。太陽症無汗。脉弱無陽。難作汗者。血少也。黃耆建中湯。加木附剛。痊無汗。治在痊條下。少陰脉沉。發熱無汗。麻黃附子細辛湯。陽明當自汗。若無汗。身如虫行皮中。此久虛無汗故也。熱病熱盛燥急。不得汗出。此陽脉極也。死症矣。又瘟病不得汗出。必發狂也。有汗者生。無

汗者死。其二陰症與陰陽毒者皆無汗也。按陰毒額上手背冷汗出者。此雖陰症亦有汗也。用人參四逆湯。原太陽表邪當汗之症。用麻黃湯二三劑發汗不出者。必死。然發汗頭面半身以上雖出。其下半身無汗。及不至足者。必死。蓋寒自傷足經而起。汗出不至足者。是太陽膀胱氣絕也。凡溫熱病傷寒不得汗。用搗姜汁綿裹周身擦之。其汗自出。此良法也。

辨傷寒自汗例第十五

自汗者。衛爲邪干。不能固密。腠理疎而汗出。不由發而自出也。有表裏虛實之分。若風傷衛氣。太陽表未解。脉浮緩。自汗者。冬用桂枝湯。三時神朮湯。若汗後惡風寒。皆爲表虛。汗不止。用黃耆建中湯。太陽發熱汗過多。汗出遂漏不止。爲亡陽。用木附湯。若陽明腑病。自汗出。不惡風寒。而反怕熱。燥渴譫語。飲水不止。大便不通。脉沉數者。調胃承氣湯下之。陽明自汗。小便不利者。津液少也。急下調胃承氣湯。大抵傷風則

惡風自汗。傷溼則身重。自汗中暑則脉虛。自汗中暈則煩渴。目汗溼溫則妄言。多汗風溫則鼾睡。自汗霍亂則吐利。自汗柔痙則搖擗。自汗陽明則惡熱潮熱。自汗陰虛勞力則身倦。自汗亡陽則遂漏不止。自汗治開各條下。惟衛氣不與榮氣相諧。臟無他病。發熱惡風而汗自出。宜桂枝和合榮衛。使邪氣無所容之地。則邪自出而汗自止矣。言桂枝發汗者。非發也。實閉汗孔也。發字當作出字。論

凡陰症四肢厥冷。額上微

有汗出者。脉必沉細。用四

逆湯溫之。自汗出。小便難。身無熱。脉沉足冷者。四逆加桂枝白朮茯苓。若吐利厥冷。脉沉或伏。或身痛大汗出者。人參四逆加桂枝白朮黃芪。

凡發熱下利。大汗不止者死。若大汗出。髮潤如油。喘不止者死。若大汗出。熱反盛。狂言不食者死。若汗冷如水。四肢厥冷。脫脉者死。柔汗發黃。環口黎黑者死。○凡傷寒溫熱病。汗不止。將髮披水盆中。足露於外。宜少蓋。可用炒麩皮糯米粉。龍骨牡蠣煨爲細末。和勻。周身撲之。其汗自止。免致亡陽而死。此良法也。方

開各條不錄

辨傷寒盜汗例第十六

傷寒盜汗者。睡中出而醒則止也。緣邪在半表半裏間。故知胆家有熱也。用小柴胡湯。若雞肋寸脉虛浮。尺脉數大無力。乃陰虛火動。宜當歸六黃湯。辰砂白芷散。兼用小柴胡湯。開少陽發熱餘下。

當歸六黃湯

主治雜病盜汗也。

當歸

上

黃連

上

黃芩

黃柏

中

黃芪

上

生地黃

中

熟地黃

知母

中

加白朮中加肉桂少許

水姜棗煎入浮小麥一撮

辰砂白芷散

白芷

兩

辰砂

五錢

爲末服二錢

茯苓麥門冬湯調下

辨傷寒頭汗例第十七

諸陽經絡循于頭。三陰俱到項而還。頭汗者。邪搏諸陽之首。則汗見于頭也。若遍身自汗出。爲熱越。今熱不得越。而陽氣上冲。津液上涸。故但頭汗耳。夫裏虛則不可下。內涸則不可汗。頭既有汗。不可再汗也。蓋陽明病。脈洪數。熱甚。但頭汗出。到頸而還。渴飲水漿。小便不利。必發黃也。此因熱不得越。用茵陳五苓散。若瘀血在內。小便利而大便黑。小腹滿硬。頭汗出者。爲畜血。桃仁承氣湯下。盡黑物則愈也。往來寒熱。

脇痛頭汗出者屬少陽小柴胡湯和之太陽中溼發黃小便難渴欲飲水漿頭汗出者茵陳五苓散重茵陳湯陽明病煩渴飲水多胸滿怔忡頭汗出者爲水結胸五苓散利之中濕欲面向火亦汗出者治在中溼條下

凡頭汗出者利者死

凡關格不利尿屎頭汗出者死若元氣下脫額上汗出如貫珠不流者死與夫誤下溼家汗出額上而喘小便難大便利者亦陽脫也俱死症矣

茵陳湯

太陽經藥

治黃傳經熱症

茵陳

上

山梔

中

滑石

中

甘草

下

加枳實

中

黃連

上

渴加天花粉石膏

人便燥實加大黃。○大

抵溼熱發黃。利水實

爲先。通開穀道爲次。利

水如皂角汁。黃從小

便出。待清白爲愈。黃自

退矣。却黃用瓜蒂散

一字。搖鼻黃水出。乃愈。

須口中噙水。週身黃

粗擦。此方甚良。水燈心

煎服

茵陳蒿湯

治身熱不大便而發黃者

茵陳

上

大黃

山梔

十四枚

量多少斟

酌用

五苓散

開太陽發熱傳經條本下

治頭汗出小水不利

焦溼熱結滯及水結胸

赤。煩渴飲水過多下
沉數以利小水為

先。惟汗多亡陽津液枯竭者以利小水為戒。若

小便不利。見頭汗出者。乃陽脫也。

凡頭汗到頸而還。必發黃症也。

辨傷寒手足腋下汗出例第十八

傷寒潮熱。手足心腋下濺濺汗者。此爲寔也。手足乃諸陽之本。熱聚于胃。則津液旁達於四肢。蘊熱則燥。呆譫語。手足汗出者。大承氣湯下之。挾寒。則水穀不化。手足冷汗出者。理中湯溫之。是有承氣理中之不同也。陰毒寒症。手足額上冷汗出者。四逆湯溫之。

辨傷寒身體痛例第十九

身體痛者。雖曰太陽表邪未解。又有溫經發汗之不同。如發熱惡寒。頭疼。身體痛。脈浮緊無汗。屬太陽表症。冬用麻黃湯發汗。餘月中和湯汗之。有汗脈浮緩。身體痛者。亦表症也。冬用桂枝湯。餘月加減中和湯。少陰身體痛。或吐利手足冷者。四逆湯。有陰症下利。或嘔吐。身體痛。發熱。脈沉遲。先救裡。用四逆湯。後救表。用桂枝湯。或陰症脈冷。下利。脈沉。身體痛。如被杖。嘔逆者。茱萸四逆湯溫之。陽症發汗後。身體痛。脈沉。