

聖濟總錄

吳錫璜署

大德重校聖濟總錄卷第一百七十四

小兒門

小兒傷寒

論曰小兒傷寒之病有冬時冒犯嚴寒而得之者有傷四時非節之氣而得之者所感雖不同然皆名傷寒大率與大人傷寒證狀無異惟用藥分劑差少爾
治法兼見傷寒門中

治小兒傷寒身熱頭痛欬喘鳴鼻乾不得卧十味湯方

前胡

去蘆頭

柴胡

去苗

人參

甘草

炙

獨活

去蘆頭

桔梗

炒

赤茯苓

去黑皮

枳殼

去瓤炒

芎藭

羌活

去蘆頭各半兩

右十味粗搗篩每二錢匕水一盞入生姜三片大棗二枚擘破同煎至七分

去滓分溫三服

治小兒傷寒頭痛肌熱喘粗白朮湯方

白朮

人參

麻黃

去根節

甘草

炙

葛根

剉

藿香

去梗

桔梗

炒各半兩

右七味粗搗篩每服一錢匕水半盞煎至三分去滓不計時候溫服

治小兒傷寒外證身熱脈浮人參湯方

人參

麻黃

去根節

赤茯苓

去黑皮

白朮

乾葛

剉

甘草

炙各半兩

右六味粗搗節每二錢匕水一小盞入葱白少許同煎至六分去滓分溫二服

治小兒傷寒嗽唾喘粗肌熱煩燥作渴茯苓湯方

白茯苓

西一兩

烏梅肉

半兩微炒

乾木瓜

一兩

右三味搗節為粗末每服一錢匕以水一小盞入生姜錢子一片煎至五分去滓溫服不計時候量兒大小加減

治小兒傷寒壯熱頭痛煩渴枯薑根散方

枯薑根

半兩

苦參

剉一分

人參

一分去蘆頭

寒水石

半兩

甘草

一分炙微赤剉

石膏

半兩

右六味搗節為粗散每服一錢匕以水一小盞煎至五分去滓不計時候溫服量兒大小以意加減

治小兒傷寒四肢煩熱心躁口乾多渴葛根散方

葛根

半兩剉

麻黃

半兩去根節

人參

半兩去蘆頭

甘草

一分炙微赤剉

桂心

一分

右五味搗羅為粗散每服大一錢匕以水一小盞入生姜錢子一片棗一枚
擘去核煎至三分去滓溫服不拘時

治小兒傷寒頭痛肌熱喘粗嗽唾石膏湯方

石膏

碎一錢

白朮

半兩

麻黃

去根節

桔梗

炒

甘草

炙

水萍

暴乾

杏仁

湯浸去皮尖各一分

右七味粗搗篩每服一錢匕水半盞葱白少許煎至三分去滓溫服不拘時

候時

治小兒傷寒體熱面赤口乾或欬嗽黃芩湯方

黃芩

去黑心二兩

麻黃

去根節一兩

桂

去粗皮

甘草

炙

石膏

碎

芍藥

各半兩

杏仁

十枚湯去皮尖雙仁炒

右七味粗搗篩每服一錢匕水半盞生姜三片煎至三分去滓量兒大小

減加

治小兒傷寒四物湯方

芍藥

黃芩

去黑心

升麻

葛根

各半兩

右四味粗搗篩每服一錢匕水半盞煎取三分去滓溫服量兒大小以意

減加

治小兒四五歲傷寒取汗射干湯方

射干

甘草

炙

升麻

芍藥

石膏

搗研各半兩

杏仁

二十枚湯退去皮共双仁麩炒

麻黃

去根節桂去粗皮三分一分

右八味粗搗篩每服一錢匕水一小盞煎至五分去滓溫服後以衣蓋覆出汗更量兒大小加減

治小兒傷寒葛根飲方

葛根汁

淡竹瀝

各三分

右二味相和煎三五沸二三歲兒分三服百日兒斟酌服之

治小兒傷寒胃氣不和解肌蒼朮散方

蒼朮

厚朴

去粗皮生薑汁炙剉

陳橘皮

湯浸去白焙各一兩

乾姜

炮三分

甘草

炙半兩

右五味搗羅為散每服一錢匕水一小盞入生姜大棗各少許同煎至六分

熱服

小兒中風

論曰風者百病之長善行而數變小兒氣血未定肌肉脆弱腠理虛疎為邪風所中以春甲乙得之則中于肝以夏丙丁得之則中于心以季夏戊己得之則中于脾以秋庚辛得之則中于肺以冬壬癸得之則中于腎各隨其府藏之俞

所中則為藏府之風或客于皮膚肌肉榮衛或留于筋膜骨髓隨其變化為病不一各有間甚之狀大率與大人所得證候皆同特小兒之治分劑多寡差殊宜消息以調之

治小兒卒中風狀如欲絕增損續命長理石湯方

長理石

碎

石膏

碎

赤石脂

碎

白石脂

碎

滑石

碎

桂

去粗皮

大黃

剉炒令香

麻黃

去根節先煎掠去沫焙

防風

去叉

牡蠣

燒碎

龍骨

碎

桔萸根

剉各半兩

寒水石

一分

右十四味粗搗篩一二歲兒每服一錢匕水半盞煎至三分去滓溫服服後汗出以粉傅之若有熱者增大黃不汗者加麻黃無寒水石以朴硝代之日三服量兒大小加減服之

治小兒卒中風惡毒及久風四肢不隨并譫譞不能行步續命湯方

麻黃

去根節先煎掠去沫焙二兩

甘草

炙半兩

黃芩

去黑心一兩

石膏

一分

芍藥

半兩

桂

去粗皮半兩

杏仁

十枚湯退去皮尖雙仁麩炒令熟

人參

一分

葛根

剉半兩

升麻

半兩

當歸

切焙半兩

獨活

去蘆頭半兩

人參

一分

右十二味粗搗篩三四歲兒每服一錢匕水七分煎至四分去滓連夜三四服

量兒大小加減服之汗出以粉傅之避風

治小兒風痺不能語口眼喎斜四肢不隨石膏湯方

石膏

碎一兩

麻黃

去根節先煎掠去沫焙一兩

甘草

炙半兩

射干

半兩

桂

去粗皮半兩

芍藥

半兩

細辛

去苗葉一分

當歸

切焙半兩

右八味粗搗節一二歲兒每服一錢七水半盞煎至三分去滓溫服日三量

兒大小加減服

治小兒中風手足拘急石膏湯方

石膏

研三分

真珠末

水飛過一兩

右二味同研勻細為末三四歲兒每服一錢七水七分煎至四分去滓溫服

日三量兒大小以意加減

治小兒中風筋脈拘急或手足瘳癱等羌活散方

羌活

去蘆頭三分

芎藭

三分

防風

去叉三分

天麻

半兩

白附子

一分

麻黃

去根節先煎掠去沫焙半兩

當歸

炙乾切焙三分

甘草

炙一兩

右八味搗羅為散一二歲兒每服半錢七乳汁調服三四歲兒服一錢七日

三服如無乳熟水調服亦得量兒大小加減服之乳母亦用煖酒調下一錢

治小兒新生肌膚嫩弱喜為風邪所中身體熱或中大風手足驚掣甘草摩膏方

甘草灸 防風去又各一兩 白朮 桔梗各三分 雷丸二兩半

右五味搗羅為粗末用不入水豬脂一斤鍋內火上先鍊過去滓入諸藥末更煎令成膏新綿濾去滓入瓷合內貯之每用特取少許灸手以膏摩之百度効小兒無病每日以膏摩顙上及手足心良辟風寒也

治小兒中風蓖麻散方

蓖麻子二十枚去皮別研 天漿子去壳十枚 生蠟三十枚

石榴一枚取却石榴子及七分盛三味藥在內作泥裹固濟燒令通赤候藥香氣出即熟取出打破裹便搗羅為末入後藥參味

天南星 半夏 白附子各一分半

右七味將後藥三味並生用搗羅為散與前藥相和研令勻酒調下一字重者不過兩服

治小兒汗出中風一日之時兒頭頸腰背熱二日即腹熱手足不屈宜服慎火草散方

慎火草乾者半兩景天草是也 丹參 麻黃去根節先煎掠去沫焙

白朮各一分

右四味搗羅為散一二歲兒每服半錢七漿水調服三四歲兒服一錢七
日三服量兒大小加減

治新生小兒中風麝香散方

麝香

細研一分

驢鬚頭毛

手大指大一把握

右二味以乳汁和驢毛令得所於銅器中微火炒令焦取出與麝香同研令如粉每服一字乳汁調下連夜三服

治小兒中風口眼牽急丹砂丸方

丹砂

研

乾蠟

去足微炒

白殭蚕

微炒

天南星

炮裂各半兩

白附子

一分

右五味搗羅四味為末入丹砂研令勻麪糊和丸如菉豆大一歲兒服一九
薄荷湯下

治小兒中風四肢拘攣心神煩亂不得睡卧獨活湯方

獨活

去蘆頭一分

黃耆

剉一兩

防風

去叉三分

白鮮皮

三分

茯神

去木一兩

羚羊角

屑三分

桂

去粗皮半兩

酸棗仁

一兩

甘草

炙半兩

右九味粗搗節每服一錢七水七分煎至四分去滓量兒大小以意加減
治小兒中風口眼喎斜發歇不定神識昏昧紫金丹方

草烏頭一分炭火內燒存性

天南星一分炭火內燒存一半性

丹砂研三錢

蜈蚣一條赤足全者炙

白花蛇生取肉培乾

蠟梢炒

牛黃研

麝香研

乳香蓋子內銘過研各一錢

右九味先將五味搗羅為細末入研者藥合研勻用酒煮麤糊和丸如麻子黍米大量兒大小每服三九至五九煎桃符湯下急驚風研服

治小兒中風痙身背強直牙關緊急螳螂丸方

螳螂翅一枚大者去翅足炒乾

棘剛子去皮三十枚

烏頭炮裂去皮臍二枚

天南星中者炮一枚

防風去叉一分

細辛去苗葉一錢

乾蠍炒一錢

白附子大者一枚

丹砂研一分

麝香研半錢

右十味搗研為細末用石腦油為丸如菜豆大每服一九至二九薄荷水化下不計時候如小兒目睛上視口噤不開用醋化一九灌入鼻中男左女右灌之

治小兒中風痙頸項強直及風癰潮發牛黃丸方

牛黃研

丹砂研

天竺黃研

蠟梢

白殭蚕

天南星

白附子各一分

右七味並生用搗研令細鍊蜜丸如梧桐子大每服金銀薄荷湯化下一丸

至二丸服之

治小兒中風天癇驚邪風癰白殭蚕丸方

白殭蚕

炒一兩

乾蠍

炒一兩

白附子

炮一兩

天南星

炮裂

烏蛇

酒炙

去骨半兩

香熟

右五味搗羅為末粳米飯為丸如麻子大一二歲兒每服三丸以溫酒下連夜三服隨兒歲數以意加減服之

小兒發黃

論曰小兒瘵熱在胃或濕熱相搏熏散肌肉其證目黃身或疼痛肌肉如橘色或得之傷寒或得之時氣或得之風溫皆脾胃氣虛邪熱與穀氣相搏所為也利其小便則愈又小兒百日以上非因傷寒溫病身體微黃者此由將息過度胃熱所致慎不可灸唯宜薄衣裳兼粉之自愈其證不可不辨

治小兒發黃升麻湯方

升麻

黃芩

去黑心

山茵陳

此胡

去苗

瓜蒂

知母

焙

藍葉

各一兩

山梔子仁

一分

大黃

剉

石膏

搗碎

各一兩半

甘草

炙

芍藥

各半兩

羚羊角

銹三分

右十三味粗搗篩三四歲兒每服一錢匕水七分煎至四分去滓溫服早晨

午後近夜各一服量大小加減

治小兒黃病山茵陳丸方

山茵陳

半兩

山梔子仁

秦艽

去苗土

大黃

劉炒各三分

朴硝

研

郁李仁

湯去皮別研各一兩

右六味除郁李仁外搗羅為末與郁李仁和勻鍊蜜和丸如菜豆大每服溫水下三丸至五丸日再服量兒大小以意加減

治小兒發黃桑白皮湯方

桑根白皮

劉

麻黃

去根節湯煮掠去沫

秦艽

去苗土各一分

大黃

劉炒半兩

右四味粗搗篩每一錢匕水七分牛乳一合同煎至五分去滓分溫食前日三服量兒大小加減

治小兒黃疸身體目睛小便並黃茵陳湯方

山茵陳

分一

大黃

劉炒半兩

山梔子仁

枚五枚

右三味粗搗篩五六歲兒每一錢匕水七分煎至四分入朴硝半錢更煎一兩沸去滓分溫日三服量大小加減

治小兒天行發黃心腹脹急三黃湯方

大黃

劉炒

黃芩

去黑心各一兩半

山梔子仁

三分

右三味粗搗篩三四歲兒每服一錢匕水七分煎至四分去滓溫服取利爲度

治小兒黃病青麥汁方

青麥自然汁

右一味一二歲兒取半雞子殼分二服三四歲兒取一雞子殼分二服早晨

午後各一服

治小兒忽發黃面目皮肉並黃枯萎根飲方

生枯萎根

右一味搗取汁二大合蜜一大匙和勻火煖分三服

治小兒黃病土瓜根汁方

土瓜根汁

右一味一二歲兒取半雞子殼分二服三四歲兒取一雞子殼分二服早晨

晚後各一

治小兒身目俱黃秦朮湯方

秦朮

三分

右一味粗搗篩每一錢匕入牛乳一合同煎至五分去滓分溫日三服量兒大小加減

治小兒諸黃瓜蒂散方

瓜蒂

枝十四

小豆

粒二十

糯米

粒四十

右三味搗羅為散吹少許入鼻中即差

治小兒黃病韭根汁方

韭根汁

右一味滴少許入鼻中出黃水即差

治小兒胃熱身體微黃除熱粉方

寒水石

碎

芒硝

滑石

碎

石膏

碎

赤石脂

碎

木香

大黃

剉

甘草

剉

黃芩

去黑心

防風

去

芎藭

麻黃根

等分

右十二味搗羅為末以蛤粉一升為末三合相和再篩粉兒日三

小兒瘡

論曰夏傷於暑秋成痲瘡小兒血氣壅盛內挾寔熱因犯暑邪客于皮膚分肉

之間至秋為風冷所折陽盛於外陰長於內陰陽相搏發而成瘡先寒後熱者寒瘡也先熱後寒者溫瘡也熱而不寒者瘰癧也若汗出過多亡陽而渴當節其飲多飲而小便澀則變為飲澀矣

治小兒瘡發作不定多渴心煩烏梅湯方

烏梅肉

炒

常山

各半兩

甘草

炙三分

右三味粗搗節每服一錢匕水一盞入竹葉五片小麥三十粒同煎至四分去滓溫服量兒大小加減不拘時候

治小兒溫瘡常山湯方

常山

淡竹葉

各一兩

小麥

一合

右三味粗搗節分為四劑每劑以水二盞煎至一盞去滓分溫三服一日令盡以差為度更量兒大小加減

治小兒諸瘡大青湯方

大青

鱉甲

醋炙去裙襖

赤芍藥

各半兩

當歸

焙切

茵陳蒿

麻黃

去節煎

豬苓

去黑皮各一分

右七味粗搗節每服半錢匕水半盞煎至三分去滓溫服日三更量兒大小

加減

治小兒瘧疾身體壯熱增寒發作有時當歸湯方

當歸

焙切

赤芍藥

蟬甲

醋炙去
諸穢

柴胡

去苗

大黃

劉炒

甘草

炙各
一分

桃仁

去皮共
二人
麩炒半兩

右七味粗搗篩五六歲兒每服半錢匕水半盞煎至三分去滓溫服日三更量兒大小加減

治小兒瘧大黃湯方

大黃

劉炒

常山

各一
分

桂

去粗
皮

甘草

生各
半兩

右四味粗搗篩三四歲兒每服半錢匕以水半盞煎至三分去滓未發前溫服吐利為効更量兒大小加減

治小兒瘧疾升麻湯方

升麻

常山

蜀漆

大黃

劉炒

姜豉

黃芩

去黑
心

桂

去粗
皮
各一分

芒硝

一兩

右八味粗搗篩五六歲兒每服半錢匕水半盞煎至三分去滓發時溫服吐利為効更量兒大小加減

治小兒瘧癘寒壯熱頭痛欲吐甘草湯方

甘草

炙

常山

各一兩

右二味粗搗節三四歲兒每服半錢匕水半盞入竹葉十片同煎至三分去滓溫服更量兒大小加減得吐即止

治小兒瘧發寒熱腹脹下痢嘔逆黃瘦柴胡湯方

柴胡

去苗一分

枳殼

去瓤炒二枚

訶梨勒

大者一顆煨取皮用

黃芩

去黑心

甘草

炙

芍藥

知母

焙各半兩

右七味粗搗節每服一錢匕水七分煎至四分去滓溫服

治小兒諸瘧蛇蛻散方

蛇蛻

燒灰

右一味研細每服半錢或一錢匕冷水調下

又方

鹿角

鎔一兩

右一味粗搗節每服一錢匕未發時水半盞煎至三分去滓溫服更量大小加減