

外科正宗

S2942
6415



明崇川陳實功著

吳江徐大椿靈胎評

流注論第三十二

海軍 許 楣平木訂
將光燭寅昉校

夫流者行也。乃氣血之壯。自無停息之機。注者住也。因氣血之竟是有凝滯之患。而氣注也此解似非流走其形。隨處可生。凡得此者。多生於體虛之人。勤勞之輩。不慎調養。夏秋露臥。縱意取涼。熱體當風。圖身快爽。或中風邪。發散未盡。或感陰寒所侵。又或惱怒傷肝。鬱結腸脾。榮氣不從逆於肉裏。又或跌打損傷。瘀血凝滯。或產後惡露未盡。流注經絡。皆成斯疾。既成之後。當分表裏寒熱虛實。邪正新久而治之。初因風寒所中。表症發散未盡者。人參敗毒散散之。身愈之後。體虛寒氣外侵者。五積散散之。附子溫之。勞傷鬱怒。思慮傷脾。而成者。歸脾湯加香附。青皮散之。跌撲傷損。瘀血凝滯。而成者。復元活血湯逐之。產後惡露未盡。流注經絡。而成者。有流氣飲導之。此皆初起將成治法。一服至三四服。皆可。外俱用琥珀膏敷貼。其中亦有可消者。十中五六。如服前不得內消者。法當大養氣血。當和培助脾胃。溫暖經絡。通行關節。木香流氣飲十全大補湯。俱加熟附子香附。熟附子培助根本。如此則未成者自消。已成者自消。已潰者。自斂。而終無殘敗。破漏不斂之症。如有膿宜急開之。患者。又當慎起居。戒七情。逐寒就溫。庶可保全。若誤用寒涼。剋伐內消。藥終至不救者多矣。徐曰。流注有虛痰實痰兩種。又曰。流注一症。由風寒入膜所發。膜皮中。考通四達。初無定處。所以隨處作患。此真脈絡之病。故古人製大活絡丹以治之。其餘煎丸皆非正治。蘇州一小兒。甫九歲。患流注肩背腰脅十餘處。百端醫治無效。余曰。此惟大活絡丹能愈。服至三十餘丸。未破者消。已破者收口。更服補氣血之藥而愈。此條從洞溪醫案來入

流注看法

初起漫腫。皮色光亮。微熱微疼。筋骨不牽強者。順已成。身體微熱。飲食有味。疼痛有時。腫生紅色者。順。已潰膿稠而黃。腫消痛止。身體輕便。起坐如常者。順。潰後內肉易生。膿水易止。精神易復。膿口易合者。順。初起身體發熱。脈細而數。皮色微腫。痛微。筋骨者。險。已成。飲食少。思口乾。作渴。身體疼痛。四肢沉重者。險。已潰。膿水清稀。腫仍不消。虛熱不退。疼痛不減者。逆。潰後膿穢不止。肌膚瘦削。飲食不消。發熱皮粗者。死。徐曰。看法亦與諸症同。

流注治法

初起風寒表散未盡。而後復生腫痛者。再宜和解之。表邪已盡。而後復生。流注者。宜清熱消腫。行散氣血。暴怒所傷。抑鬱所致。胸膈痞悶。中氣不舒。宜順氣寬中。腫硬已成。而不得內消者。宜和氣血。更兼補助脾胃。跌撲損傷。瘀血凝滯。為患者。宜調和氣血。通行經絡。寒邪所襲。筋骨骨痛。及遍身疼痛者。溫經絡。行氣血。產後敗血。流注關節。致生腫痛者。當散敗瘀。養氣血。潰後膿水不止。而形衰食少者。宜滋氣血。峻補脾胃。徐曰。亦與諸症同。

流注治驗

一男子風寒表散未盡兩腮腫痛微熱不退用小柴胡湯加川芎天花粉蘇軾枳梗連翹二服熱頓退又以二陳湯加桔梗黃芩牛蒡子連翹四服十日而安 徐曰此乃風痰非流注也

一男子勞傷受寒背生三腫皮色不變寒熱交作至夜尤甚先以萬靈丹洗浴發汗寒熱頓退惟腫硬不消以琥珀膏敷之三次腫消痛止漸平 徐曰此亦風痰所聚

一婦人因怒腸下結腫將近半年方痛此肝氣鬱結之症用木香流氣飲四服其腫漸紅蓋病久必欲作膿不可內消又以十全大補湯加木香香附青皮十餘服腫漸高又以本方加皂角刺五服其膿乃潰清而且多此元氣已經虧損所致服人參養榮湯加熟附子蘇軾月餘腫始稠少本方倍參耆歸木兩月而愈

一男子元氣素虛因暴怒脾生腫塊疼痛牽強寒熱往來飲食日減以補中益氣湯此五字條勒加香附貝母十餘服寒熱漸止又服益氣養湯月餘而腫潰間服八珍湯外用香附餅日灸二次徐曰亦脾胃健而安

一嬌婦頂間乳上各腫一塊將近一年漸大而痛診之脈細數而無力此思慮過傷之症用歸脾湯加桔梗香附十餘服腫漸高以琥珀膏敷之新紅欲其作膿以十全大補湯加桔梗貝母服之半月膿乾針之頭腐膿潰虛熱復作食少不睡仍以歸脾湯間逍遙散服之兩劑愈

一男子平素怯弱腰後微腫一塊飲食少思口乾發熱此腎傷也治當朝以附桂八味丸此北字條勒午用人參養榮湯扶根植本為要彼以口乾發熱為內有火徐曰既有此症欲投清涼之劑解之從用涼藥之故余辭不治彼請內科治之以退熱為主正合其意投藥三劑腹

痛作瀉又以豬苓澤瀉厚朴此三味徐勒泄氣等藥投之大熱發作形體更變復請余治余曰死期速矣因虛致病法當滋補况腫在腰間內腎受傷口乾作渴腎水枯竭發熱不退陰虛血少今以有餘之藥而療不足之症豈有不死者哉又半月而死 徐曰以上所載五案皆係痰毒並非流注之病流注者纏綿不已或五或七或九愈者愈發者發變態萬端若初生一兩箇旋即消潰皆非真流注也

流注主治方
調和榮衛湯調和榮衛湯方歸赤芍白芷并烏藥獨活甘草者大箇治流注初起氣血凝聚結腫不散已成未成並服

川芎當歸陳皮獨活牛膝紅花黃耆白芷烏藥大箇香黃耆各入甘草炙紅花各五牛膝下部水二茶鍾煎八分入酒一盞量

病上下服 徐曰通治之方但少疾藥 梔梔大箇香一味 徐勒批曰此味不解

木香流氣飲木香流氣飲方歸蘇桂半兩陳大箇香治流注瘰癧及鬱結為腫或血氣凝滯遍身走注作痛或心胸痞悶咽嗝不利腸腹脹

脹嘔吐不食上氣喘急咳嗽痰盛或四肢面目浮腫者 川芎當歸紫蘇桔梗青皮陳皮烏藥黃耆枳實茯苓防風半夏白芍各一甘草節大腹皮木香檳榔澤瀉枳殼各五牛膝下部加水三茶鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

徐曰此流注主方藥味太雜宜擇用 梔梔青皮烏藥大腹皮木香檳榔徐圍六鬱湯六鬱湯內用川芎半夏陳芍香附通治諸鬱結腫及左右二搭相串溼痰流注等症 川芎半夏茯苓香附陳皮

山蛇絡一蒼木砂仁甘草各五水二茶鍾薑三片煎服

附子八物湯附子八物湯甘草各五水二茶鍾薑三片煎服

川芎白芍熟地人參白朮茯苓當歸附子附子八物湯肉桂五木香甘草各三水二茶鍾薑三片煎服

徐曰此通治虛寒之方非流注之方凡立方總當兼顧本症一二不可全不照應

瘡科流氣飲防風流氣散烏藥甘肅人參白芍官桂黃耆防風枳殼烏藥桔梗厚朴各七檳榔木香川芎白芷各五

塊者當歸甘草紫蘇人參白芍官桂黃耆防風枳殼烏藥桔梗厚朴各七檳榔木香川芎白芷各五

水二茶鍾煎八分食前服徐曰此亦流注通治之方與前義同

通經導滯湯通經導滯湯甘草各五水二茶鍾煎八分食前服徐曰此亦流注通治之方與前義同

香附赤芍川芎當歸熟地陳皮紫蘇牡丹皮紅花牛膝枳殼各一甘草節獨活各五水二茶鍾煎八分食前服

一小杯食前服徐曰亦與前方相同香重出

香附餅香附餅徐曰將藥用酒炒過力大散風寒

未成者自消已成者自潰風寒濕毒宜量汁作餅徐曰外治良法

醒脾湯醒脾湯木香附龍眼皮治懷抱鬱結思慮傷脾致脾氣不行逆於肉裏乃生壅腫疼痛不眠心煩不安神氣不清

白朮黃耆人參茯苓神各一黃連酸棗仁地骨皮遠志各七柴胡甘草桔梗黃連木香香附各五龍眼肉各五水二茶鍾

薑三片薑三片煎八分不拘時服徐曰即歸脾湯意

調中大成湯調中大成湯煎八分不拘時服徐曰即歸脾湯意

白朮茯苓歸身白芍陳皮山藥牡丹皮黃耆各一人參錢藿香砂仁遠志甘草各五附子肉桂各八水二茶

鍾煨薑三片鍾煨薑三片煎八分食遠服徐曰此病後調養方

黃耆六一湯黃耆六一湯煎八分食遠服徐曰此病後調養方

黃耆六錢半黃耆六錢半煎八分食遠服徐曰此病後調養方

散血葛根湯散血葛根湯煎八分食遠服徐曰此病後調養方

乾葛半夏川芎防風羌活升麻桔梗各八白芷甘草細辛蘇葉香附紅花各六水二茶鍾薑白三枚薑三片

煎八分不拘時服徐曰如果敗血當更加血分藥此方尚未到

先天大造丸先天大造丸煎八分不拘時服徐曰如果敗血當更加血分藥此方尚未到



此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

黃精 白朮 何首烏 川牛膝 骨碎補 仙茅 破故紙 遠志 木香

青鹽 五丁香 黑裏肉 右為細末 煉蜜丸如桐子大 每服七十丸 空心溫酒送下 此方非獨流注成漏者可用 又補初氣血

虛羸勞傷 內損及男婦久無嗣 並有奇功 徐曰 此通治補藥 病後調養法 又曰 此虛人清後補藥 初起禁服

琥珀膏 同蘇搗細 敷患處 治一切皮色不變 漫腫無頭 氣血凝滯 結成流毒 毒論身體上下年久 但未成膿者

大黃 兩 鬱金 南星 白芷 路 共為細末 用大蒜頭去殼搗爛 入上藥再搗 獨入酒一二匙 調勻 遍敷腫上 紙蓋或布包裹 不痛

俱待藥乾 便效 次日又有起泡 又有不起泡者 如有起挑 泡中黃水膏貼之 自效 徐曰 此吊毒法 亦有必當用之 法 又曰 此吊毒

之法 毒淺者自消 凡一切無頭腫痛之症 俱效 搗茶 余所製消核膏 流注初起 貼之可消 徐曰 此吊毒法 亦有必當用之 法 又曰 此吊毒

附錄大活絡丹 治一切中風癱瘓 痺痿厥厥 拘攣疼痛 癱疽流注 跌撲損傷 小兒驚癇 婦人停經 白蛇 烏梢蛇 威靈仙 兩頭天

木香 沉香 二細辛 赤芍 沒藥 丁香 乳香 僵蠶 天南星 蠶 青皮 骨碎補 白寇 安息香 黑附子 五

黃芩 香附 元參 白朮 防風 葛根 虎骨 當歸 血竭 地龍 犀角 麝香 松脂 五

牛黃 片腦 人參 右藥各研細末 合和再研 蜜丸如桂圓核大 金箔為衣 陳酒送下 須用白蠟為置 收藏以免泄氣 徐曰 頑

痰惡風熱 毒痰入於經絡 非此不能透達 乃治肢體大症 必備之藥 他書活絡丹 祇用地龍 乳香等四五味 乃治蔡霍人實邪之方可用

流注應用方 十全大補湯 人參養榮湯 補中益氣湯 歸脾湯 益氣養榮湯 八珍湯 萬應丹 小柴胡湯

二陳湯 乳癰乳岩論第三十三

夫乳病者 乳房為陽明胃經所司 乳頭為厥陰肝經所屬 乳子之母 不能調養 以致胃汁濁而壅滯為膿 又有憂鬱傷肝 肝氣滯而結腫 初起

必煩渴 嘔吐寒熱交作 腫痛甚者 宜牛蒡子湯主之 厚味飲食 暴怒肝火妄動 結腫者 宜橘葉散散之 又憂鬱傷肝 思慮傷脾 積想在心 所

愿不得 致經絡痞滯 聚結成核 初如豆大 漸若圓其子 半年一年二載三載 不疼不癢 漸漸而大 始生疼痛 痛則無解 日後腫如堆棗 或如

覆碗 紫色氣穢 漸潰爛 深者如石 凸者若蓮 疼痛連心 出血則臭 其時五臟俱衰 四大不救 名曰乳岩 凡犯此者 百人必百死 知覺

若早 姑用清肝解鬱湯 或益氣養榮湯 患者再加清心靜養 無星無礙 服藥調理 尚可苟延歲月 若中年以後 無夫之婦 得此其死尤速 故

曰 夫乃婦之天也 惟初生核時 急用艾炙核頂 待次日起泡 挑破 用披針入四分 腫方徐動 批口必更 用水螞散條 插入核內 此四字

封蓋至三十日 其核自落 用玉紅膏生肌 斂口 再當保養 庶不再發 又男子乳癰 與婦人微異 女損肝胃 男損肝腎 蓋怒火房慾過度 以致

肝虛血燥 腎虛精怯 血脈不得上行 肝筋無以榮養 遂結腫痛 治當八珍湯 加山梔 牡丹皮 徐鞠 湯 口乾作渴者 加減八味丸 徐鞠 湯 亦

素虛者 腎氣丸 已潰作膿者 十全大補湯 懷孕之婦 乳疾曰內吹 因胎氣旺而上衝 致陽明乳房作腫 宜石膏散清之 此句徐鞠 湯 亦可消

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

散遲則遷延日久將產出膿乳汁亦從膿竅流出其口難完有此者純用補托生肌其口亦易完矣 徐曰乳病有數種種種各別須知之
又曰乳腫不同俱係陽明結氣結痰各有專方一概瞎藥皆有損無益也

乳癰乳岩看法

初起紅赤腫痛身微寒熱無頭眩無口乾微痛者順已成微腫發熱疼痛有時一囊結腫不侵別處者輕已潰膿黃而稠腫消疼痛漸止
作癰生肌者順潰後膿水自止腫痛自消新肉易生膿口易合者順初起一乳通腫水痛不紅寒熱心煩嘔吐不食者逆已成不敷不紅
如石口乾不眠胸痞食少者逆已潰無膿正頭腐爛腫勢愈高痛勢愈盛流血者死潰後肉色紫黑痛苦連心吮氣日深形體日削者死
曰乳癰與乳岩各有看法此乃乳癰看法也

乳癰乳岩治法

初起發熱惡寒頭眩體倦六脈浮數邪正在表宜散之發熱無寒惡心嘔吐口乾作渴胸膈不利者宜清之憂鬱傷肝思慮傷脾結腫堅硬微
痛者宜疎肝行氣已成微腫發熱疼痛有時已欲作腫者宜托裏消毒膿已成而脹痛者宜急開之脾胃虛弱宜更兼補托清而不破膿水清
稀腫不消疼不止宜大補氣血結核不知疼痛久而漸大破後惟流污水宜養血清肝 徐曰此亦是乳癰治法乳岩無治法不過使之遷延
歲月不知痛苦惡具而已

乳癰乳岩治驗

一婦人因怒左乳腫痛寒熱交作服人參敗毒散一劑人參敗毒散表症已退又用牛蒡子湯二服腫消漸安
一婦人憂思過度鬱成癰左乳結核如桃核此半年以痛非痛咳嗽生痰身發潮熱診之脈微數而無力此真氣雖弱而邪火尚未有餘
如用藥合理尚堪調治先用逍遙散加香附貝母十餘服而咳嗽漸止寒熱間作又用八珍湯加香附牡丹皮柴皮桑志十餘服身熱去其

八九又服益氣養榮湯加青皮木香兩月餘胸膈得利噯氣得舒飲食漸進肌膚漸澤外腫以阿魏化痞膏貼之半年餘而消
一婦人右乳疼痛腫如覆碗診之脈數有力此有餘症欲作膿也用托裏消毒散數服而脹痛針之出膿碗許又用十全大補湯加香附十餘
服而安 徐曰此是乳癰實症如乳子之時有此乃是外吹也

一婦人暴怒左乳結腫疼痛自服仙方活命飲二劑疼痛稍止結腫不消仍服清涼敗毒之劑清涼敗毒腫痛更作形體日弱診之脈浮數而無
力此真氣虛而邪氣實也非補不可用益氣養榮湯四五服其腫始高寒熱亦退又十餘服而膿潰兼服十全大補湯兩月而痊此症非純
補豈能得愈

一男子年過五十因憂喪子不成立憂鬱傷肝左乳結腫半年痛甚作腐肝脈弦數先用小柴胡湯加青皮山桅遠志貝母數服而肝脈稍平
又用八珍湯仍加前藥十餘服其腫漸腐為膿更服益氣養榮湯庶保收斂後為內醫所惑謂鬱傷肝肝經有火不必用補更服降火流
氣寬中等劑致食少便秘發熱作渴復請余治肝脈復弦口乾作渴邪火內淫飲食減少脾土受傷便秘發熱陰血竭而為燥為熱已上俱

補豈能得愈
純補二字徐幼批
日外症無純補批

上海大成書局印行

內損症也。辭不治後月餘果死。徐曰：此即男子乳岩，本屬難治。

一婦人左乳結核，三年方覺腫痛。診之脈緊數而有方，此陽有餘而陰不足也。況結腫如石，皮肉紫色不澤，乃真乳岩，症辭不治。又一婦左乳結腫，或大或軟，或硬，俱不作痛，至半年餘腫如覆碗，堅硬不痛。近乳頭處偏生疣瘡，時痛時癢，診之脈弦而數，腫色慘黑不澤，此氣血已死，亦辭不治。又一婦已潰腫如流，血不禁，亦辭之。後果俱死。徐曰：此段所本皆真乳岩，無愈理。梔梔余所製清毒膏，凡乳核初起，無內症貼之，無不消者。但除根甚難耳。因循不治，變為乳岩，則難治。乳岩潰後，宜貼陽和解膏。近見刻本經驗良方，載之為片，作

糝藥，亦有得愈者。附記于此。又葉全生集乳岩治法，初起用犀黃丸，每服三錢，酒送十服全愈。或以陽和湯加土貝五錢煎服，數日可消。倘誤以膏貼藥敷，說見癰疽門後。定主日漸腫大，內作一抽之痛，已覺運治，倘皮色變黑，難以挽回，勉以陽和膏貼於患口，內服千金托裏散，服或二藥，每日早晚輪服，服至自潰而痛者，外用大蟾六隻分作三日，每日早晚取蟾破腹連雜蟾身刺孔貼於患口，內服千金托裏散，服三日後接服犀黃丸，可救十中三四。潰後不痛而癢極者，無一毫挽回，大忌開刀，開則翻花最慘，萬無一活。男女皆有此症。

乳癰生治方：牛蒡子湯黃連起湯，瓜蔓仁、黃連、天花粉、連翹、角針、治乳癰結腫疼痛，母論新久，但未成膿者，陳皮、牛蒡子、山柰、金銀花、甘草、瓜蔓仁、黃連、天花粉、連翹、角針、治乳癰結腫疼痛，母論新久，但未成膿者，陳皮、牛蒡子、山柰、金銀花、甘草。

梔梔散：梔梔散內用藥陳，治婦人有孕胎熱為內吹，有兒吃乳名外吹，致乳結成腫痛，寒熱交作，甚者惡心嘔吐。

柴胡、陳皮、川芎、山柰、青皮、石膏、黃芩、連翹、甘草、橘葉片、水二茶鍾煎八分，食遠服。徐曰：亦通治方。

梔梔散：梔梔散內用藥陳，治婦人有孕胎熱為內吹，有兒吃乳名外吹，致乳結成腫痛，寒熱交作，甚者惡心嘔吐。

清肝解鬱湯：清肝解鬱湯白芍、桔梗、芍藥、附子、生地、茯苓、神、治一切憂鬱氣滯，乳結腫硬，不疼不癢，久漸作疼，或胸膈不利，肢體倦怠，面色萎黃，飲食減少，陳皮、白芍、川芎、當歸、生地、半夏、香附、青皮、遠志、茯神、貝母、蘇葉、桔梗、甘草、山柰、木通、水二茶鍾煎八分，食遠服。徐曰：與前法重。

鹿角散：鹿角散用角三寸，炭火煨八分，食遠服。治乳癰新起，結腫疼痛，憎寒發熱，但未成者俱效。鹿角尖三寸，用炭火煨稍紅，存性研末，每服三錢，食後熱酒一茶鍾調服，甚者再用一服必消。徐曰：此單方。

回乳四物湯：回乳四物湯加四物湯，自然能散，治產婦無兒吃乳，致乳汁腫脹，堅硬疼痛難忍。

川芎、當歸、白芍、熟地、麥芽、水二茶鍾煎八分，食遠服。用脚布束緊兩乳，以手按揉其腫自然消散。甚者再用一服。

徐曰：此治乳脹消乳之法，且再加猪苓澤瀉茯苓等，以利其水。

治氣喘勞傷，或寒熱不調，乳內忽生腫痛，用碗一隻，內用粗燈草四根，十字排勻碗內。

灸乳腫妙方：將碗置於患上灸。

諸無腫痛，寂然消。

治氣喘勞傷，或寒熱不調，乳內忽生腫痛，用碗一隻，內用粗燈草四根，十字排勻碗內。

灸乳腫妙方：將碗置於患上灸。

諸無腫痛，寂然消。

治氣喘勞傷，或寒熱不調，乳內忽生腫痛，用碗一隻，內用粗燈草四根，十字排勻碗內。

燈草頭各露寸許再用平山粗紙裁成一寸五分闊紙條用水溼紙貼益碗內燈草上紙與碗口相齊將碗覆於腫乳上留燈草頭在外將艾大圓於碗足底內點火灸之艾盡再添灸至碗口流出水氣內痛覺止方住其者次日再灸一次必消

保安萬靈丹治乳癰初起發熱惡寒頭眩肢體作痛者
益氣養榮湯治鬱怒傷肝之情內結以致乳中生核不疼不癢日久方痛甚者胸膈不利吞酸嘔吐頭目昏眩四肢倦怠或已破潰膿水清稀不能收斂飲食減少口淡無味自汗盜汗肢體羸瘦者

治乳使用方治乳癰初起腫痛未成膿者用蒲公英春秋間開黃花似菊者取連根葉二兩搗爛用好酒半斤同煎數沸存渣敷腫上其酒熱服被蓋睡一時許再用連鬚葱白湯一茶鍾催之得微汗而散此方鄉村偏僻無藥者所用之極妙亦且簡便徐曰此單方

下乳天漿散下乳天漿散四物同 治乳母元氣虛弱乳汁微少或生乳日久乳少 川芎 當歸 白芍 熟地 茯苓 天花粉 甘草 王不留行 炒麥門冬 漏蘆 穿山甲 炒 通草 路一用健豬前蹄一隻煮爛取汁二碗同藥煎至碗底二三次頻服

遠服之以熱木梳梳其乳房其汁如泉湧而來徐曰此催乳法 梔梔王不留行漏蘆穿山甲通草及健豬前蹄徐俱用 木香餅木香餅生用生地黃一兩 生地黃 楊膏 右木香餘未同

地黃和勻量重處大小作餅貼上以熱熨斗熨之堅硬木痛者間日熨之 徐曰外治良法

乳癰應用方 十全大補湯 八珍湯 逍遙散 冰獅散 小柴胡湯 托裏消毒散 阿魏化痞膏 附骨疽論第三十四 附風

夫附骨疽者乃陰寒入骨之病也人之氣血壯實雖遇寒冷而邪不入骨凡入者皆由體虛之人夏秋露卧寒溼內襲或房慾之後益覆單薄寒氣乘虛入裏遂成斯疾初起則寒熱交作稍似風邪隨後脣腿筋骨作痛不熱不紅疼至徹骨甚者曲伸不能轉側日久陰變為陽寒化為熱熱甚而腐肉為膿此疽已成也凡治此症初起寒熱作痛時使用五積散加牛膝紅花發汗散寒通行經絡或萬靈丹發汗亦可次以

大防風湯行經活血滲溼補虛又有生於尻臀部位漫腫作疼者徐曰此非宜內托羌活湯腿內近膝股漫腫不痛者內托著柴湯腿後側者內托酒煎湯初起通用人參敗毒散徐曰加木瓜牛膝蘇木紅花虛者十全大補湯加羌活湯防己牛膝已成就欲作膿者附子八珍湯膿成脹痛者即針之膿稠而黃體實者十全大補湯膿清色白體虛者保元大成湯食少體倦者香砂六君子湯脾虛寒熱者補中益氣湯以此

調理可也又有風溼相乘之症初起寒熱交作次傳腿腫作痛其形光亮微紅發熱按之如泥不即起者宜當歸拈痛湯或茯苓佐經湯間服萬靈丹和之以上之症皆由元氣不足中來不可誤用損脾泄氣敗毒等藥外禁寒涼等法如誤用之必致氣血凝滯內肉夾腐日久化為汚水敗膿流而不禁終死又有房慾勞傷寒熱五變氣血乖違經脈橫解病日深以成斯疾者徐曰此症其患大腸漸新腫如冬瓜上

過勝腹下至足底牽連漫腫皮色不紅久清膿色白腥穢腫仍不消痛仍不減而氣日衰身體縮小唇舌乾焦二便枯秘諸藥不效飲食不

過勝腹下至足底牽連漫腫皮色不紅久清膿色白腥穢腫仍不消痛仍不減而氣日衰身體縮小唇舌乾焦二便枯秘諸藥不效飲食不

上海大成書局印行

進終為不治又有鶴膝風乃足三陰虧損之症雖曰初起寒熱交作時亦宜五積散如牛膝紅花或萬靈丹發汗俱可如汗後腫痛仍不消減此陰寒深伏以大防風湯溫暖經絡重者兼灸膝眼二穴數以琥珀膏亦可漸漸取效如以上之法俱不效者終成痼疾不必強藥消之只宜先天大造丸史國公藥酒終年常服亦可轉重就輕徐國步履也

附骨疽看法

初起身微寒熱飲食如常結腫微紅疼不附骨者順已成舉動自便結腫成囊疼痛有時膿已成者吉已潰膿稠腫消痛減身輕便腫不熱者吉潰後元氣易復飲食易進內肉易實膿水易乾者吉初起身發寒熱漫腫色白肢體羸弱疼痛附骨險已成舉動不便通腿腫赤熱不紅不作膿者險已潰膿水清稀氣穢腥臭腫痛不消形體日削者死潰後脾胃虛弱飲食無味口渴不止唇白皮枯者死徐曰看法亦與諸症同

附骨疽治法

初起發熱惡寒身體拘急腿脚腫痛脈浮數者散之已成腿脚腫痛皮色不變上下通腫者散寒溫經絡寒熱作腫色白光亮使之如泥不起者宜健脾滲溼身體無熱惡寒脈遲而澀腿腫不熱者養血溫經絡暑中三陰脈洪而數腿脚掀腫口乾便燥者宜下之已潰膿水清稀飲食減少形體消瘦者補中健脾胃潰後腫痛不減膿水不止虛熱不退者溫中養氣血愈後筋骨牽強屈伸不便者宜滋養血氣通利關節徐曰亦與諸症同法

附骨疽治驗

一男子中寒發散未盡大腿腫痛脈浮數而無力此風寒未盡內虛故也用五積散去麻黃加牛膝二服疼痛稍減又用內托黃耆酒煎湯四服全腫俱消惟腿外側結腫一塊不退此瘀血凝滯欲作膿也用托裏藥倍膿針之更服十全大補湯而愈徐曰此腿難也非骨疽一男子勞碌遇寒每發腿痛發則寒熱嘔吐胸痞不食此因氣鬱飲食不節脾胃受傷故不能運化痰滯中腕淫熱動而下注為腳氣投以開結導引丸二服行去停痰又用半夏佐經湯數服嘔止膈利更服附子六物湯數劑消而不發徐曰此寒淫也

一老人年六旬過慾腎虛致筋攣痺脚膝無力不能步履外貼追風逐淫膏內服三因勝駿丸而愈

一男子右腿腫痛兩月餘余曰膿成已久何不開之彼曰二老醫同治俱稱內消無膿再請二老決之俱曰無膿但病者昏沈不醒命在危篤余強開之出膿盈許以獨參湯連進二服而甦後以十全大補湯調理百日外而安徐曰此亦腿難

一男子房事後受陰寒大腿無形作痛至夜尤甚不能步履醫以散寒除溼消痰止痛藥治之其疼益增余診其脉細滑而無力此氣血不足寒氣所乘之故投以大防風湯二劑疼痛頓減又四劑而痊徐曰此亦寒淫

一男子暑月慾後當風睡臥寒氣襲於左腿遂致腫痛寒熱交作胸痞不食以保安萬靈丹葱湯化服洗浴發汗以散骨寒毒後以大防風湯去羌活加紅花破故紙溫煖腎經通行經絡腫痛漸消血脉漸和又以三因勝駿丸間報調理兩月而愈徐曰此外感風寒也



一監生慾後受寒。致成腿痛。余以暖腎氣溫經絡。散寒邪藥治之。彼以為緩。請內醫投表散之劑。外邪散而內虛。又以小柴胡湯等藥調理。未幾。潮熱致虛。熱發作。口燥咽乾。煩渴不已。又以知母石膏湯清其上。防風木瓜威靈仙等劑攻其下。此三藥。致病愈劇。仍請余治。其時患腿腫。其形縮小。云縮小必愈。腰又全斷。以必死。此症原屬腎經受寒。非附子破故紙不能通達關節。非羌活防風牛膝不能通行閉滯。非白米炙甘草不能使脾氣行達四肢。非川芎當歸白芍熟地紅花不能養血活血。凡病從虛而入者。先補其虛。後攻其病。以先補而後攻。今此症不加溫補而發散。解肌以正風寒。有餘之法。治之不死。何待後果死。徐曰。以上說症。皆非附骨疽名實相背。

附骨疽主治方

五積散五積散歸桂心 蒼朮蒼朮陳芍茯苓 蒼朮蒼朮陳芍茯苓 治風寒溼毒客於經絡。致筋攣骨痛。或腰脚酸疼。或偏身拘急。或發熱惡寒頭痛者。

水二茶鍾薑三片煎 分不拘時服。頭痛惡寒者。加通竅葱頭三根。蓋汗為效。下部加木瓜牛膝。徐曰。此方雜亂不切。

內托羌活湯內托羌活湯黃柏蒼朮歸尾 羌活羌活黃柏防風歸尾 蒼朮蒼朮陳芍茯苓 治風寒溼毒客於經絡。致筋攣骨痛。或腰脚酸疼。或偏身拘急。或發熱惡寒頭痛者。

前服徐曰。此下體通治之方。 當歸當歸芍藥 羌活羌活黃柏防風歸尾 蒼朮蒼朮陳芍茯苓 治風寒溼毒客於經絡。致筋攣骨痛。或腰脚酸疼。或偏身拘急。或發熱惡寒頭痛者。

成血風羌活當歸防風茵陳蒼朮 羌活羌活黃柏防風歸尾 蒼朮蒼朮陳芍茯苓 治風寒溼毒客於經絡。致筋攣骨痛。或腰脚酸疼。或偏身拘急。或發熱惡寒頭痛者。

熱腿內近膝股患癰或附骨癰初起腫痛 此太陽厥陰之分也。脈細而弦。按之洪緩有力。黃耆黃耆生地黃柏 當歸當歸芍藥 柴胡柴胡木瓜 連翹連翹錢 治風寒溼毒客於經絡。致筋攣骨痛。或腰脚酸疼。或偏身拘急。或發熱惡寒頭痛者。

羌活羌活黃柏防風歸尾 蒼朮蒼朮陳芍茯苓 治風寒溼毒客於經絡。致筋攣骨痛。或腰脚酸疼。或偏身拘急。或發熱惡寒頭痛者。

內托酒煎湯內托酒煎湯黃柏蒼朮 羌活羌活黃柏防風歸尾 蒼朮蒼朮陳芍茯苓 治風寒溼毒客於經絡。致筋攣骨痛。或腰脚酸疼。或偏身拘急。或發熱惡寒頭痛者。

黃耆黃耆生地黃柏 當歸當歸芍藥 柴胡柴胡木瓜 連翹連翹錢 治風寒溼毒客於經絡。致筋攣骨痛。或腰脚酸疼。或偏身拘急。或發熱惡寒頭痛者。

茯苓茯苓生地黃柏 當歸當歸芍藥 柴胡柴胡木瓜 連翹連翹錢 治風寒溼毒客於經絡。致筋攣骨痛。或腰脚酸疼。或偏身拘急。或發熱惡寒頭痛者。

悶等症茯苓陳皮半夏 白朮白朮蒼朮 藿香藿香澤瀉 甘草甘草葛根 柴胡柴胡厚朴 木瓜木瓜路五 水二茶鍾薑三片煎八分。

附子六物湯附子六物湯甘草 附子附子甘草 治四氣流注於足。太陰經骨節煩痛。四肢拘急。自汗短氣。小便不利。手足或時浮腫。

附子附子甘草 治四氣流注於足。太陰經骨節煩痛。四肢拘急。自汗短氣。小便不利。手足或時浮腫。

麻黃佐經湯麻黃佐經湯甘草 麻黃麻黃甘草 治風寒暑濕流注。足太陽經腰足攣痺。關節重痛。憎寒發熱。無汗惡寒。或自汗惡風。頭

附子附子甘草 治四氣流注於足。太陰經骨節煩痛。四肢拘急。自汗短氣。小便不利。手足或時浮腫。

附子附子甘草 治四氣流注於足。太陰經骨節煩痛。四肢拘急。自汗短氣。小便不利。手足或時浮腫。

附子附子甘草 治四氣流注於足。太陰經骨節煩痛。四肢拘急。自汗短氣。小便不利。手足或時浮腫。

附子附子甘草 治四氣流注於足。太陰經骨節煩痛。四肢拘急。自汗短氣。小便不利。手足或時浮腫。

附子附子甘草 治四氣流注於足。太陰經骨節煩痛。四肢拘急。自汗短氣。小便不利。手足或時浮腫。

精力或生冷並進以致血氣乖違。運動疾生腸胃痞實。運化不通。氣血凝滯而成者。三也。總之初起外症發熱惡寒。脈扎而數。皮毛錯縱。腹急漸腫。轉側急痛。大便墜重。小便澀滯。若淋甚者。臍空腹脹。轉側水聲。此等並見。則內癰已成也。初起未成時。小腹殷殷作痛。儼似解豚。小便淋瀝而痛。小便急脹。時時下膿。去盡自安。體虛脈細。不敢下者。活血散瘀湯。和利之。已成腹中疼痛。脹滿不食。便淋刺痛者。薏苡仁湯。去之。丹皮肉桂黃芪五味子。斂而補之。五淋子如日久因循不識。此症候作脹病治之。桂田補端以致毒攻內臟。腸胃受傷。或致廢器。及爛腐。黑斑色敗。無膿。每流污水。腹連陰痛。煩躁不止。身熱口乾。衾幃多臭。卧房難進者。俱為難治。宜斟酌之。

腸癰看法

初起小腹疼痛。小便不利。六脈微緩。不作寒熱者。輕。已成小腹腫而堅硬。小便數而不利。六脈洪數者。險。已潰時時下膿。裏急後重。日夜無度。疼痛不減者。重。潰後膿腥臭穢。或流血。濁痰虛熱更增。不食者。死。

腸癰治法

初起小腹疼痛。小便或硬。脈扎數者。瘀血也。宜下之。小腹作痛有塊。大便祕澀。小便如淋者。宜和而利之。已潰時時下膿。腹痛不止。飲食無味者。宜托而補之。產婦惡露不盡。流注下腸。作痛脈數者。宜和而導之。腹脹日久。臍高突出。轉側响如水聲。膿內蓄急針之。徐曰實見知此可用針

腸癰治驗

一男子小腹脹痛。裏急後重。時時下膿。醫作痢疾治之。愈重。醫字余診其脈扎而數。此小腸癰也。投以薏苡仁湯。一服下膿并許。即不後重。更用牡丹散六服而安。

一幼婦產後月餘。腹中漸痛。腫脹如鼓。內科紛紛認為蟲病。又月餘沉重昏憤。已棄不治。適其家童稚患瘡。請余往視。偶寒及此。余自請診之。

人雖昏潰不甦。而脈細數有力。余曰。此內癰也。尚可治。其家不信。余曰。請視其腹。一決生死。何如。視之。則腫皮緊急。光亮。臍下大熱。字以上計

錢徐徐灌服。斷斷待腹中作痛。扶起。急者坐桶上。熱氣薰蒸。此四字其臍下如湧泉。連湯與膿。約共滿桶。病者即甦。更服八珍湯。加牡丹皮五味子。調理月餘而安。

一婦人小腹腫痛。小便如淋。診之脈緩而扎。此得之行經時。誤食生冷。又兼惱怒。肝火急迫。瘀血而成內癰。膿尚未成也。以大大黃湯下之。瘀血出盡而安。

一婦人小產。瘀血未盡。勞動大早。小腹內外腫痛。月餘大便祕燥。小便澀滯。口燥咽乾。煩悶不睡。內醫調理。其病日重。余偶往診之。脈數實而有力。謂曰。此腸癰已成也。用薏苡仁湯加大黃。一服下膿數碗。脹痛頓息。外腫堅硬不散。仍作掀痛。此餘膿尚欲外泄也。投以十全大補湯。

三服。十全大補湯後。脹痛而針之。更服八珍湯。加牡丹皮五味子。徐曰實見知此可用針月餘而愈。

一婦人小產。瘀血未盡。勞動大早。小腹內外腫痛。月餘大便祕燥。小便澀滯。口燥咽乾。煩悶不睡。內醫調理。其病日重。余偶往診之。脈數實而有力。謂曰。此腸癰已成也。用薏苡仁湯加大黃。一服下膿數碗。脹痛頓息。外腫堅硬不散。仍作掀痛。此餘膿尚欲外泄也。投以十全大補湯。

三服。十全大補湯後。脹痛而針之。更服八珍湯。加牡丹皮五味子。徐曰實見知此可用針月餘而愈。

一婦人小產。瘀血未盡。勞動大早。小腹內外腫痛。月餘大便祕燥。小便澀滯。口燥咽乾。煩悶不睡。內醫調理。其病日重。余偶往診之。脈數實而有力。謂曰。此腸癰已成也。用薏苡仁湯加大黃。一服下膿數碗。脹痛頓息。外腫堅硬不散。仍作掀痛。此餘膿尚欲外泄也。投以十全大補湯。

三服。十全大補湯後。脹痛而針之。更服八珍湯。加牡丹皮五味子。徐曰實見知此可用針月餘而愈。



一婦人腹脹如鼓臍突寸許小水澀滯轉側腹有水聲此內臆已成用針刺臍上突頂出膿盈許用牡丹皮散五六劑其臆漸小朝以八味丸暮以八珍湯加澤瀉牡丹皮黃芪破故紙一味服之月餘而愈

腸癰主治方

大黃湯大黃湯中用朴硝 治腸癰小腹堅硬如掌而熱按之則痛肉色如故或微赤微腫小便頻數汗出憎寒服藥

而有方日淺未成膿者大黃湯 治腸癰小腹堅硬如掌而熱按之則痛肉色如故或微赤微腫小便頻數汗出憎寒服藥

水二茶鍾煎八分食前或空心溫服徐曰此實症主方

活血散瘀活血散瘀湯赤芍 治產後惡露不盡或經後瘀血作痛或暴急奔走或男子杖後瘀血流注腸胃作痛漸

成內癰及腹痛大便燥者川芎 治產後惡露不盡或經後瘀血作痛或暴急奔走或男子杖後瘀血流注腸胃作痛漸

鍾煎八分空心服渣再煎服徐曰即前方義

牡丹皮散牡丹皮散 治腸癰腹滿而痛以手重按之則止或時時下膿人參牡丹皮白芍茯苓

黃耆黃耆 治腸癰腹滿而痛以手重按之則止或時時下膿人參牡丹皮白芍茯苓

王不留行冬瓜子全瓜蒌枳殼穿山甲廣膠槐米番木鱉草煅蝎子俱可參用

七賢散七賢散 治腸癰後疼痛淋瀝不已或精神減少飲食無味面色萎黃四肢無力自汗盜汗卧睡不

宜宜 治腸癰後疼痛淋瀝不已或精神減少飲食無味面色萎黃四肢無力自汗盜汗卧睡不

失笑散失笑散 治產後心腹絞痛欲死或血迷心竅不省人事及尋常腹內瘀血或積血作痛又婦人血氣

為病作痛之聖藥也及治男子諸症疼痛不已者五靈脂 治產後心腹絞痛欲死或血迷心竅不省人事及尋常腹內瘀血或積血作痛又婦人血氣

右為細末每服三錢醋一合調稠熬數滾入水一茶鍾煎七分食前連藥服如用錯為丸每服二錢淡醋湯下治前症亦妙徐曰此非治

腸癰之方乃治婦人瘀血作痛之方也又曰此消瘀血之要藥梔子 治腸癰小腹脹痛脈滑數重時時下膿黃耆當歸金銀花白芷穿山甲

排膿散排膿散 治腸癰小腹脹痛脈滑數重時時下膿黃耆當歸金銀花白芷穿山甲

防風防風 治腸癰小腹脹痛脈滑數重時時下膿黃耆當歸金銀花白芷穿山甲

瓜蒌子湯瓜蒌子湯 治產後惡露不盡或經後瘀血停滯腸胃作痛縱非是癰服之亦效

薏苡仁湯薏苡仁湯 治腸癰腹中疼痛或脹滿不食小便澀滯婦人產後多有此病縱非癰服之多效

薏苡仁薏苡仁 治腸癰腹中疼痛或脹滿不食小便澀滯婦人產後多有此病縱非癰服之多效

腸癰應用方 八珍湯 十全大補湯 八味丸 湯門



臟毒論第三十六

夫臟毒者。醇酒厚味。勤勞辛苦。蘊毒流注。肛門。結成腫塊。其病有內外之別。虛實之殊。發於外者。多實多熱。脈數有力。肛門突腫。大便秘結。肛腹不寬。小水不利。甚者肛門肉泛如繩。孔頭緊閉。此為外發。屬陽易治。宜四順清涼飲。內消沃雪湯。通利大小二便。痛甚者。珍珠散。外敷。白散。搽之。膿腫痛者。針之。發於內者。屬陰。虛寒濕滲入肛門。內臟結腫。刺痛如錐。小便淋瀝。大便虛秘。咳嗽生痰。脈數虛細。寒氣往來。過夜不寐。此為內發。屬陰難治。宜四物湯。加黃柏。知母。天花粉。甘草。兼以六味地黃丸。調治。候內臟膿出。則安。又有生平情性暴急。縱食膏粱。或補術。蘊毒結于臟腑。火熱流注于肛門。結而為腫。其患痛連小腹。肛門墜腫。二便乖違。或瀉或秘。肛門內銼串爛。經絡汗水流通。大孔飲食不食。作渴之甚。犯此未有見其生者。又有虛勞久嗽。痰火結腫。肛門如粟者。破必成漏。滯盡氣血必亡。症調養氣血無訛此二症乃內傷之故。非藥可瘳。不必強治也。

臟毒看法

初起腫痛。紅色光亮。疼痛有時。肛門不墜。便和者。順。已成。掀赤腫痛。發熱不渴。小便不數。展轉自便者。順。已潰。膿稠。色鮮。不見。掀腫漸消。疼痛漸減。能食者。順。潰後膿水漸止。新肉易生。不疼多瘡。瘡口易乾者。順。初起堅硬。漫腫。內臟閉痛。小便頻數。大便秘結者。險。已成。疼痛曰。基。腫連小腹。肛門閉緊。下氣不通者。重。已潰。臭水淋漓。疼痛不減。腫仍不消。身熱唇焦者。逆。徐曰。看法同別症。

臟毒治法

初起寒熱交作。大便墜痛。脈浮數者。宜用輕劑解散。已成。內熱口乾。大便秘結。脈沉實而有力量者。當下之。肛門腫痛。常欲便而下墜。作痛者。導溼熱。兼瀉邪火。肛門掀腫。疼痛小便澀滯。小腹急脹者。清肝理小水。出膿。腥臭疼痛不減。身熱者。養血健脾胃。更兼滲瀉。膿水清稀。脾胃虛弱。不能收斂者。滋腎氣。急補脾胃。徐曰。亦同別症。

臟毒治驗

一男子肛門腫突。紅紫痛甚。投以內消沃雪湯。二服。大便數次。疼痛稍減。腫突處以珍珠散清蜜調搽。早晚二次。其腫漸消。更以涼血地黃湯服之。全愈。徐曰。此大腸偏成熱火之輕症。

一婦人產後。用力太過。肛門墜痛。疼苦之甚。先以枳殼。蘇合。煎湯。重洗。後以珍珠散。加冰片。豬膏。調搽。內以四物湯。加升麻。蒼朮。丹皮。枳殼。服之而消。徐曰。產後脫肛。與肛癰不同治。

一男子夏月。好飲火酒。熱毒流入。肛門結腫。堅硬。形色紫黑。墜痛便秘。用黃連解毒湯。加大黃。枳殼。二劑。便通。疼痛稍止。又用四物湯。合前湯。數劑。其腫漸消。惟存粟大。堅腫不消。以臟連丸。服至月餘而愈。

一婦人肛門腫突。堅硬痛極。用攻利解毒藥。俱不應。以神燈照法。照之。早晚兩次。其痛方減。以蟾酥。錠。磨濃塗之。堅硬漸腐。為膿。仍服內消沃雪湯。二劑。便通。痛苦減其大半。內服四物湯。加黃柏。知母。厚朴。蒼朮。外以珍珠散。加冰片。豬髓。調搽。月餘而平。

一婦人肛門腫突。堅硬痛極。用攻利解毒藥。俱不應。以神燈照法。照之。早晚兩次。其痛方減。以蟾酥。錠。磨濃塗之。堅硬漸腐。為膿。仍服內消沃雪湯。二劑。便通。痛苦減其大半。內服四物湯。加黃柏。知母。厚朴。蒼朮。外以珍珠散。加冰片。豬髓。調搽。月餘而平。



一男子素有內痔便血常欲脫肛。朝肛門墜重不收。腫痛突起。光亮紫色。此溼熱流注結腫。故難收入。內服黃連除溼湯。一劑外用珍珠散。加冰片清蜜調塗。腫痛漸減。後以補中益氣湯。加生地黃連蒼朮。花粉丹皮。服至數劑漸平。徐曰。果係內痔。愈則復發。不除根也。一監生素性急暴。每縱膏粱積毒。流于大腸。內如針刺。外肛不腫。常欲後重。便則秘結。診之脉空數而無力。此真氣不足。邪火有餘。內服珍珠散。症也。解以不治。請他醫用藥月餘。肛門內腐。敗水無禁。復請余視。余曰。決不可療。脈來虛數。邪勝正也。手掌不澤。脾氣敗也。至夜發熱。陰虛火旺。敗水無禁。幽門已壞。面若塗脂。此四字最難。元氣走散。鼻如烟煤。肺氣將絕。口乾舌燥。腎水已竭。豈有不死之理。他醫仍用毒藥。滋陰藥不效而死。徐曰。此症從元氣虛竭而生。乃外科之內症。治法變化無窮。果能得法。尚可得生。尋常醫者非所能也。

臟毒主治方

黃連除溼湯 黃連 甘草 芍藥 黃芩 當歸 防風 蒼朮 厚朴 枳殼 連翹 甘草 大黃 朴硝 水二茶鍾煎八分

服。徐曰。此臟毒之主方。惟大黃連硝不宜輕用。涼血地黃湯 生地黃 芍藥 牡丹皮 黃芩 當歸 防風 蒼朮 厚朴 枳殼 連翹 甘草 大黃 朴硝 水二茶鍾煎八分

膝無力者。川芎 當歸 白芍 生地 白朮 茯苓 黃連 地榆 人參 山梔 天花粉 甘草 水二茶鍾煎八分

食前服。徐曰。此方頗穩。又曰。此治虛症為宜。然不甚切。相案徐於此方後另疏枳殼槐米大黃槐角土貝母秦光桃仁白芷瓜子九

味益如前牡丹皮散例。以備參用者。內托黃耆散 內托黃耆 白朮 穿山甲 皂角 針路 檳榔 水二茶鍾煎八分

白朮 黃耆 白芍 穿山甲 皂角 針路 檳榔 水二茶鍾煎八分

黃連解毒湯 黃連 黃芩 白芍 穿山甲 皂角 針路 檳榔 水二茶鍾煎八分

金液戊土膏 治口腹習于奢侈。情性慣于急暴。火猖狂思不如願。水已枯竭。火不發泄。旺而又鬱。鬱而又旺。以致肛門結腫。毒攻內

臟痛。如芒刺。熾如火坑。更水淋漓。生命難望。宜服此藥。珍珠散 治肛門腫。如紅紫。急脹。硬痛。極本方加冰片。研極細。豬膏調塗。早晚日用二次。

臟毒應用方 六味地黃丸 四順清涼飲 內消沃雪湯 神燈照法 四物湯 蟾酥錠 補中益氣散

夫痔者。乃素積溼熱。過食多燥。或因久坐而血脈下行。又因七情而過傷生。冷以及擔輕負重。竭力達行。氣血縱橫。經絡不循。又或酒色過度。腸胃受傷。以致濁氣瘀血。流注肛門。俱能發痔。不論老幼男女。皆然。有生於肛門之內。有突于肛門之旁。大者若蓮花。蜂蟻。花雞冠。菱角。

珊瑚等狀。小者如櫻珠。鼠尾牛奶雞心核桃規肉之形。毒深者其形異而頑惡。毒淺者其形正而平常。久則爛潰成漏。新則墜重刺痛甚。其
莫從孔出血。從竅流血。血日有所傷。形容漸有所削。若不早治。終至傷人。尋常多用針刀砭礪線墨等治法。此句係物批曰誤治患處之
苦楚。聞此因循。都不醫治。于瘡此症。藥味數品。從火煎煉。性即純和。百試百驗。凡瘡內痔者。先用通利藥湯。滌臟腑。然後用吹痔散。此散
門。善治此非藥也。但亦須片時內痔自然之出。即用葱湯洗淨。搽枯痔散。早午晚每日三次。每次溫湯洗淨。搽藥。輕者七日重者十六日。其
痔自然枯黑。乾硬。痔邊裂縫。膿膿停止。枯燥。擦用起痔湯。日洗一次。待痔落之後。擦搽生肌散。或鳳雛膏等藥。生肌斂口。瘡口半月可完。外痔用消毒散煎洗。隨用枯痔散。照內痔搽法用之。完口百日入房。乃吉。至於穿腸大漏者。此則另有二方。亦具於後。患瘡者服
之。不用針刀挂線。效如拾芥。

痔瘡看法

初起形如牛奶。不腫不紅。無微無痛。行走不覺者。輕。已成腫痛。有時遇夢而發。或軟或硬。頭出黃水者。輕。久如雞冠。蜂巢。蓮花。桃花。等狀。流血
出血不止者。重。久漏。竅痛。脣腿腫。水淋漓。疼痛不已。莫從孔出者。逆。

痔瘡治法

初起及已成。漸漸大。而便澀。作痛者。宜潤燥及滋陰。肛門下墜。大便出血。時或疼痛。堅硬者。宜清火。滲淫。紫色疼痛。大便虛秘。兼作瘡者。涼血
祛風。疏利。淫熱。腫痛。堅硬。後重。墜刺。使出難者。外宜重洗。內當宣利。內痔出血。登廁脫肛。而難上收者。當健脾。升舉。中氣。便前便後下。面色
萎黃。心忪耳鳴者。宜養血。健脾。諸痔欲斷其柄。必須枯藥。此藥欲完其竅。必杜房勞。乃愈。

痔瘡治驗

一男子患痔六年。每遇酒色房勞。痔則發腫。堅硬疼痛。十餘日方得稍可。彼欲斷其根。以枯痔散敷上。至七日外。其痔漸黑。裂縫。至十六日痔
枯脫落。孔若雞心。以生肌散逐日用之。內服養血健脾藥而愈。

一男子患痔。掀腫作痛。大便急燥。脈數有力。投以內疏黃連湯二服。便行痛止。又服四物湯加芩連枳殼花粉數劑。而腫消。更服臟連丸一料
而不復發。徐曰。此輕病也。

一男子患痔。遇勞則發。腫而痛。以枳殼湯重洗。內服防風秦艽湯數劑。腫痛俱減。令彼煎湯常洗。每日五六次。又以六味地黃丸加黃柏知母
服之不發。

一男子好飲多欲。內痔虛墜下血。服四物湯加芩連升麻葛根數服。虛墜乃止。又服當歸郁李仁湯二劑。痔腫亦消。更服臟連丸。月餘。便血亦
止。兼節酒色。遂不發。大抵醉飽入房。經脈橫解。精氣一泄。脈絡必虛。酒食之毒。乘虛流結。或岳極強固精氣。以致敗精濁血。遂傳大腸。又或
飲食厚味。燥淫流注。俱成斯疾。所受病者。燥氣也。為病者。淫氣也。初宜瀉火和血。潤燥疏風。久宜養血滋陰。健脾滲淫。自愈。若不節酒色。不
慎起居。不戒口味。破必成漏。久則穿腸。串脣。穢從孔出。臭水淋漓。雖不傷生。每苦於注。可為數息。

