

傳
信
尤
易
方
七

傳信尤易方卷之七

婦人諸症門

易州醫官鄭建臣校閱
涇陽醫士王封

治經水不調身黃用白礬半兩陳皮三錢為末以黃蠟半兩鎔開和丸桐子大每服三服五十九溫艾湯吞下

治經水過期用川芎當歸等分為末每服二錢空心

溫酒調服○又方用蒲黃五靈脂等分為末每服

二錢空心溫酒調下 救民易方

治室女經候不調血氣相搏腹中刺痛用橘紅二兩

延胡索去皮醋煮當歸酒洗各一兩為末酒糊丸



桐子大每服一百丸空心艾醋湯下

治經候不調血氣刺痛腹脇脹滿頭暈惡心崩漏帶
下便血癥瘕用香附子一斤米醋浸一日以瓦瓶
中慢火煮醋盡薄切焙乾艾葉四兩當歸二兩爲
末醋糊丸桐子大每服五十丸淡醋湯下

治經候不調用香附一斤分作四分以好酒米醋童
便鹽水各浸一分至七日共焙乾爲末醋糊丸如
桐子大每服七十丸空心食前溫酒送下瘦人宜
加澤蘭葉赤茯苓

治經候不調血臑冷痛用當歸附子炮剉等分每三

錢水一盞煎八分空心溫服

治經脉不及期用黃芩酒浸炒紫色爲末每服二錢
空心當歸煎酒調服一方加香附童便煎下○又
方用香附以童便浸令透取出炒焦爲末每服二
錢空心淡醋湯調下救民易方

治經脉不調採苦苣菜陰乾爲末每服一二錢溫酒
或艾醋湯調服

治經脉逆行血風攻腦頭目旋悶不省人事採蒼耳
草嫩葉陰乾爲末不拘時酒調一盞服其功甚大
服之多者連通腦門

治月經太過用甜瓜仁爲末去油以水調服

治婦人月經不通每日飲人乳汁三合通則止之千金方

治月經欲來前後腹中痛用當歸以醋微炒延胡索

紅花等分爲末每二錢溫酒調服

治婦人月經不絕來無時者取案紙三十張燒灰以

酒半升調服亦治產中血暈酒服立驗已斃者強

齒瀝之經一日者亦活勝金方

治婦人室女月經瘀閉月候不來繞臍痛用乾漆碎

炒一時煙盡牛膝一兩酒浸一宿焙乾爲末取生

地黃汁入二味銀器內慢火熬可丸桐子大每服

三五九空心酒下

經驗方

治室女月水不通取鼠糞一兩燒灰研末空心溫酒

調服半錢

奇效單方

治月信不期用阿膠炒成珠爲末每一錢酒調服

類證

本草

治月水不利用醍醐葉搗絞汁和酒煎服一錢

治婦人無時月水來腹痛用華撥鹽炒去鹽爲末蒲

黃一兩炒石研細末煉蜜丸桐子大每服三四十

丸食後用鹽米飲吞下

良方補遺

治婦人月水不通用厚朴以姜汁炙香細切不拘多

少濃煎去滓空心溫服 本草集要

治婦人經脉住已經三箇月驗胎法川芎一兩生爲末空心濃煎艾湯下一匙覺腹中微動者是胎也

靈苑方

治月候積年不來或數月不通龍胎瓦松景天各少

許水二碗煎一碗去滓分三服大效 龍胎似乾魚有鱗或在山

澗水中出蜀中甚多衛生易簡方

治月候傷過及崩中用小煎鮮者搗取汁半升服之

血氣門

治血氣諸虛不足用當歸四兩乾地黄二兩爲末煉蜜丸桐子大每服二三十丸食前米飲下

治一切血病損傷採益母草陰乾以竹刀切洗淨銀器內煎煉成膏磁罐盛之每服一匙酒化下

治血氣逆煩悶心痛用水牛角燒灰存性爲末每服方寸匕酒調下

治血氣攻心痛不能忍取蓼根細剉酒浸服之

治血氣逆心悶痛用生蒜搗汁服一二盞卽瘥

治血氣痛遊走腰痛用蓬朮切作片乾漆切碎各二

兩同炒令漆焦香去漆不用右蓬朮爲末每服二錢酒調下如腰痛胡桃酒下走遊痛水調下

治女人患血氣腹痛用山豆根搗末空心熱酒調二

錢服之經驗方

治婦人血氣刺痛荔枝核燒存性半兩香附子去皮

毛炒一兩爲末鹽湯或米飲調二錢服

易簡方

治婦人血氣濃煎通草湯服三五盞便即通順

食療方

治乾血氣用大黃錦紋者浸酒晒乾四兩爲末以好

醋一升熬成膏丸如圓眼核大臨卧用一丸溫酒

化開大便利一二行經脉自下此藥調經水之

藥一方加醋煮香附米末二兩屢效

治乾血疾用蘇木四錢黑豆一升好酒一斤半同入

鍋煮至一盞加童便一盞攪勻服汗出效

萬氏家抄

治乾血勞用大麥芽炒小麥芽炒千里馬灰

即左腳破草鞋

各一兩為末每服三四錢酒調服

治經血不止用五靈脂為末炒令煙盡每服二錢當

歸二片酒一盞煎六分去滓熱服三五服大效

衛生

易簡方

治女子血脈不通取酸石榴東行根一握炙乾水二

盞濃煎汁服千金方

傳言此方方卷之三血氣門

五

治婦人膜外氣及氣塊延胡索不限多少爲末猪胰

一具切作塊子炙熟蘸藥末食之

勝金方

治小腹堅大如盤者腦中脹滿能食而不消以麴末

水服方寸七日三服

千金方

治婦人腹中有血塊用牛臍草根酒煎服效

備急方

治女人腹内有癖塊用小便服之每日溫服一盞至

二十日血片下卽瘥○又方醋煎生大黃服之效

治婦人赤白帶下用蒼朮二兩乾姜二兩炮右爲末

每服三錢空心溫酒調下

濟生便宜方

○又方用紅雞

冠花治赤帶白雞冠花治白帶晒乾爲末每服二

酒調下魚鱗肉之物○又方用芍藥

兩炒乾姜五錢炒爲末每服一錢空心酒調下○

又方用旱蓮草陰乾爲末每用一匙納入雞卵中

攪勻蒸熟食之食後用棗一枚去腥氣萬氏家抄○又

方以真秋石爲末以棗膏和丸桐子大每服五十

丸空心醋湯下醫林集要方○又方用草果每一箇去

皮入乳香一小塊以麪餅裹火煨焦黃留性取出

和麪爲末每服二錢以陳米飲調下重者三錢○

又方用白芍藥七兩炒令黑爲末每服三錢七以

酒調下廣濟方○又方用黃荊子炒焦搗爲末以酒

傳方易方卷之七 血氣門

調服方丹溪 ○又方取兔皮燒令煙絕擣末酒服方

寸七以瘥為度千金 ○又方取酸漿草葉陰乾為

末空心酒下三錢七千金 ○又方用益母草開花

時採取陰乾為末每服二錢食前溫酒調服

治婦人赤白帶下骨立者地榆一斤水三升煮取一

升半去滓再煎如稠飴絞漉空心服三合日再圖經本草

治婦人赤白帶下久不止用狗頭骨燒灰研末每空

心溫酒調服一匕即效奇效單方

治婦人赤白帶下白下用禹餘糧一兩乾姜等分赤

下禹餘糧一兩乾姜半兩右件禹餘糧以醋淬搗

研細末空心溫酒調下二錢七勝金方

治婦人赤白帶下臍腹冷痛面色痿黃日漸虛困白
葵花末一兩空心溫酒下二錢七如赤帶用赤葵
花

治乳婦人赤白帶下用猪肝葉薄劈之搥著煨熟訶
子末中微火炙又搥又炙盡半兩末空腹細嚼陳
米飲送下圖經本草

治血崩用益智仁炒爲細末每服三錢鹽米飲調下
治婦人血崩不止及赤白帶下用香附子赤芍藥各
等分爲末每服二錢鹽一撮水一盞煎至七分無

時溫服日二服十服見效

治血崩不止用丁香二兩爲細末以酒三升煮取一

升空心頓服○又方用荊芥燈上燒灰存性爲末

每服二錢空心米飲調下○又方取老母猪糞燒

存性爲末酒調一錢服如未止再一服惟症奇方○又

方用烏梅燒灰存性每服二錢空心滾白湯調下

救民易方

○又方用白扁豆花焙乾爲末炒米飲入炒

鹽調空心服一錢效

醫林集要方

○又方用棕櫚老系

瓜燒存性等分爲末每服二錢鹽酒或鹽湯食前

調服

治血崩不止諸藥不效飛白礬爲末以麪糊丸指頂大每服一丸黃酒送下

治血崩大便血及冷痢用牛角鰓燒灰存性爲末每服二錢童便或醋調服

治血崩用蒲黃黃芩各一兩荷葉灰半兩共爲末每服三錢空心酒調下

治婦人崩中去血不止取大小薊一斤用酒一斗漬五宿任意飲之則止

補遺方

治婦人崩中下血不止以衣中白魚姜蚕等分爲末以井花水服之日三服

千金方

○又方以熟艾雞

子大阿膠炒爲末半兩乾姜一錢剉以水五盞先

煮艾姜至二盞半入膠消揚分三服空腹服一日

盡

虞世南方

○又方用五靈脂末十兩水五鍾煎三鍾

去滓再煎成膏入神麴末二兩打糊丸桐子大每

服二十丸空心溫酒下○又方用硃砂新瓦上炒

香爲末每服二錢白湯調下○又方用龍骨燒赤

當歸各一兩香附子炒黑三錢爲末每服三四錢

空心米飲調下忌油膩腥肉等物○又方用綿子

棕櫚頭髮共燒灰存性百草霜同研爲末每服三

錢空心酒調服○又方用川芎一兩剉酒一大盞