

陶節菴傷寒全生集目錄卷二

辨傷寒發熱例第

麻黃湯

芎蘇散

人參羌活散卽人參敗毒散

羌活沖和湯

正氣散

大青龍湯

羌活神术湯

辨傷寒惡寒例附背惡寒第二

桂枝湯

桂枝二越婢半湯

黃芪建中湯

人參三白湯



辨傷寒汗後不徹例第三

調胃承氣湯

辨傷寒本熱例第四

五苓散

白虎湯

辨傷寒惡風例第五

參蘇飲

消風百解散

金沸草散

小青龍湯

葛根湯

卽葛根解肌湯

升麻葛根湯

葱白葛根湯

人參白虎湯

夏季用此方



南京中医药大学图书馆版权所有

川芎石膏湯

辨傷寒潮熱例第六

大柴胡湯

調胃承氣湯

小柴胡湯

辨傷寒寒熱往來例第七

柴胡姜桂湯

辨傷寒煩熱例第八

黃連阿膠湯

小建中湯

補中益氣湯



辨傷寒煩躁例第九

當歸補血湯

乾姜附子湯

茯苓四逆湯

黃連解毒湯

竹葉石膏湯

辨傷寒頭痛例第十

辨傷寒目頭眩例第十一

辨傷寒項背強例第十二

辨傷寒頭搖例第十三

辨傷寒無汗例第十四



辨傷寒自汗例第十五

辨傷寒盜汗例第十六

當歸六黃湯

辰砂白芷散

辨傷寒頭汗例第十七

茵陳湯 太陽經藥

茵陳蒿湯

五苓散

辨傷寒手足腋下汗出例第十八

辨傷寒身體痛第十九

辨傷寒舌胎例第二十



全生集  
辨傷寒動氣例第二十一

李根湯

橘皮湯

辨傷寒口渴例第二十二

辨傷寒口燥舌乾例第二十三

辨傷寒吐血例第二十四

辨傷寒衄血例第二十五

黃芩芍藥湯

三黃補血湯

犀角地黃湯

四生丸

辨傷寒蓄血例第二十六



桃仁承氣湯

抵當湯

辨傷寒嘔吐例第二十七

止嘔吐刼法

加減藿香正氣散

吳茱萸湯

卽吳茱萸  
生姜湯

理中湯

藿香安胃湯

黃連湯

茯苓半夏湯

橘皮竹茹湯

人參養胃湯

茱萸四逆湯

乾葛半夏生姜湯

大橘皮湯

辨傷寒嘔吐例第二十八



清华大学图书馆版权所有

姜附湯

辨傷寒噦例噫氣例第二十九

小橘皮湯

加味竹茹湯

六君子湯

旋覆代赭湯

茅根乾葛湯

傷寒全生集卷二目錄終



南京中医药大学图书馆版权所有

陶節庵傷寒全生集卷二

長洲葉天士評本

曾孫鍾肇康

朱心傳

元孫潮青來

讀本

門人

顧景文  
張亮揆  
吳厚存

小門人鍾南紀校讀

門下後學鍾孝存校讀

○傷寒發熱例第一

夫傷寒翕翕發熱者乃風寒客於皮膚邪氣怫鬱於外表熱而裏不熱也此太陽經表證頭疼項強腰背脊痛身體骨節疼或已發熱未發熱惡寒脈浮緊無汗冬月用麻黃湯三時用芎蘇散羌活沖和湯人參

大都勞力、感寒

寒

羌活散。正氣散。選用脈浮緩自汗。冬月用桂枝湯。二時用加減冲和湯。神术湯。選用。若脈浮發熱煩渴。小便不利者。此熱傳太陽膀胱本病也。用五苓散利之。若陽明經發熱目痛鼻乾不眠。微惡寒。微有頭額痛。脉微洪。宜葛根湯。若表熱未罷。邪熱傳裏。裏既作熱。則表裏俱熱。口渴飲水。脉洪數者。宜白虎湯。此但輕於純在表。純在裏也。若表証皆除。而反見怕熱燥渴。譫語。大便實。而脉沉數。蒸蒸發熱者。此爲裏熱。是陽邪陷入陰中。裏熱甚而達於外也。用調胃承氣湯下。

之若少陽經耳聾、腸痛、寒熱嘔而口苦、頭角痛、脈弦數、此熱在半表半裏用小柴胡湯和之。三陰無表熱惟少陰有表熱之証但其脉沉足冷用麻黃附子細辛湯或下利厥冷裏寒外熱用人參四逆湯其陰陽俱虛熱而不止者汗後復發熱脉躁疾者下利大熱不止者皆死症又有三陽傳裏實熱症口必燥渴飲水不止揭去衣被揚手擲足胸腹滿痛班黃狂亂譫語大便不通脉必沉實有力甚則舌卷囊縮者難治但當三乙承氣湯攻裏下之方開別條與前表熱不



同也

麻黃湯 本方自有加減法備開

治冬時正傷寒。頭疼。發熱。惡寒。體痛。腰背項強。拘急。脉浮緊。無汗。表証當發汗。以頭疼如斧劈。身熱如火熾用。

麻黃 上桂枝 上杏仁 中甘草 下川芎 中

防風 中羌活 中 若渴加天花粉。惡心加

姜汁半夏。泄瀉加炒蒼朮。升麻。元氣虛加人參去杏仁。骨節煩痛倍加羌活防風。

先發汗後蟹

一

蒼朮有痰加半夏。胸脇滿痛加枳殼桔梗

惡寒身熱面赤身痒者不得小汗出故也大

杏仁加柴胡芍藥身熱作瀉者內虛故也惡

寒身熱而喘者緣表邪未解也若汗後復大

熱脉躁亂者死此脉不與汗相應也汗後身

愈

劉云邪未盡者再汗之則

涼脉靜者生以火邪已去也水姜葱白加荳

豉一撮煎之熱服取汗中病即止不得多服

復用厚被蓋覆其身及手足不可揭去待汗

乾方可揭去節庵云傷寒汗下溫藥多服反

加別病極不宜煎查故服半鐘而留半鐘者  
正合曰少與二字之義此乃醫所不知之妙  
若病淺而服藥過者元府何能關鎖若未中  
病則大邪之氣未除故留再服可見其有妙  
用也如此

芎蘇散 本方自有加減法備開

治春夏秋感寒頭疼發熱惡寒脈浮緊無汗表  
証宜當發汗

川芎 中枳殼 中桔梗 下陳皮 中半夏 下



蘇葉上柴胡上乾葛上茯苓上甘草下加蒼

术十一味。滿悶加香附去甘草茯苓。若

天道尙寒而欲汗者加麻黃桂枝去茯苓柴

胡。嘔吐加姜汁。體痛加羌活瀉加蒼白术

去枳殼柴胡。腹痛加木香。夏月夾暑加

香薷水薑葱白煎之熱服取汗。

人參羌活散 本方自有加減法卽人參敗毒散

治四時傷寒頭疼身熱惡寒體痛不分有汗無

汗皆可服之。凡時氣溫疫熱病初起頭疼發熱

惡寒亦皆治之及治咽喉腫痛發班瘡疹脚氣  
寒熱並宜治之且此湯乃解利傷寒傷風太陽  
少陽陽明三陽經之藥也

人參

中

羌活

中

柴胡

中

獨活

中

前胡

中

枳椇

中

桔梗

中

川芎

中

茯苓

中

甘草

下

加蘇

葉蒼术十味去獨活茯苓○若天道尙寒加

麻黃渴加乾葛○若傷風鼻塞聲重加荆芥

防風○咽痛加連翹牛蒡子桔梗倍若減桔

梗加青皮名清風散治傷寒痰熱之藥也宜



去葱白。若時氣熱病肌熱壯熱加黃芩。中暑煩熱加香茹黃連去葱大便瀉去枳殼。加白术去葱。若班瘡已發未發加升麻乾葛。已發不透加紅花去葱。小兒感冒風加天麻薄荷水姜葱白煎服取汗。

羌活冲和湯 本方自有加減法

太陽經藥治三時無汗卽九味羌活湯此湯代麻黃桂枝青龍各半等湯太陽經之神藥也。治感冒風寒非時暴寒春可治溫夏可治熱秋可