

醫宗說約卷之三

古吳白丁吳蔣示吉仲芳氏述

虞山尤虛子載

溫允若氏

參

天池自得子毛漢迎方來氏

弟時行李芳氏

媚葉舒嵩明韓氏

訂

傷寒賦上篇

人生疾苦莫重傷寒。岐伯陳傳變之經。內經具載。仲景詳方法之治。金匱斯明補論。方晉王叔和功大。加註釋。宋陳無已功多。自宋及元。于今為盛。集大成王肯堂之輩。摘精要陶節菴之徒。

考古而徵今。博學以說約。欲名其症。先正其名。霜降後爲傷寒。若溫煖。則有冬溫之異。春分後爲溫病。倘暴寒。則有寒疫之殊。乃問時疫。因四時天令不正。旣名熱病。由夏月暑熱方生。濕溫暑暍。宜分類似傷寒。有辨將行三法。明察六經。太陽則發熱惡寒。頭疼脊強。拘急體痛。陽明則頭額目痛。微寒身熱。鼻乾不眠。少陽脇痛耳聾。寒熱嘔而口苦。太陰腹滿自利。尺寸沉而喘乾。少陰之經舌乾口燥。厥陰之症煩滿囊拳。日傳一經七日得愈。若言兩感。六日再傳。麻黃桂枝與五苓治太陽無汗自汗及煩渴。葛根白虎并承氣療陽明表症裏症。與下攻性少陽有汗吐下之禁。三賴小柴胡以和解。至少陰有下溫補之症。七看脈足。

便以收功

脈沉是有方便結宜下脈沉細無力是冷宜溫補

太陰有或下或溫之方厥

陰有急下急溫之例。兩感之症。日傳二經。沖和靈寶百全一二

浮緊宜汗。須看頭疼發熱惡寒。沉實宜攻。還須便結。甚臍硬痛

是冷而脈沉細。雖面赤煩燥。可溫胸滿而寸滑沉。或懊憹冷厥

必吐煩渴而小便不利。或飲水即吐。或發黃而利。小是求大熱

而錯語呻吟。或乾嘔不眠。或宜下而寒涼是用。隨症而治。乃為

良醫。治之失時。變症蜂起。失汗則面赤身痒。拂鬱而不知痛處

因而大煩。失下則口燥咽乾。熱結而精液內消。兼之痛硬不利

小便如狂不除。不吐懊憹悶鬱。依舊吐衄之後。小便利而大便

黑蓄血居多。頭汗已形。小便難而渴飲漿。發黃可待。血有桃仁

犀角黃宜茵陳五苓陰燥陽狂有異重斑輕疹亦殊卒口噤而
背反張剛柔二瘥作手足冷而便通秘寒熱二厥生呃忒噦嘔
陶氏之書陰陽毒從李氏之論虵厥手足冷雖有熱而禁用寒
涼狐惑唇口瘡辨上下而急求湯劑汗下禁于動氣隨臍之上
下左右而施苓桂泄于奔豚審氣從小腹冲心而治過汗患不
少下早變尤多表症顯惡寒悞下則結胸痞氣懊懣之症作發
汗恐不徹過多則肉潤肉苛筋惕之病興結胸有大小寒熱水
之稱痞氣惟痞滿不疼痛之辨大小湯丸任用姜根熨法尤良
筋肉跳動爲亡陽肉苛者汗溫而不愈循衣摸床爲死症撮空
者用升陽以求痊便結如何下攻亦可雜症互見隨病施方

吐雖屬少陽寒當溫食當消而火當瀉呃逆雖屬胃病寒宜熱
痰宜化而秘宜通瀉利戶行協熱協寒之故膿血自便寒熱傷
血之由喘有表裏水飲之不同喘秘而不惡寒者下之則愈痛
有寒熱燥屎之不一重按而痛漸減者補之則安頭搖屬風有
痛宜祭心悸停水氣虛亦然寒熱爲少陽之邪便秘者可下潮
熱主陽明之燥未結者可和擾亂爲煩心熱之諦憤怒爲躁腎
熱之徵汗下溫涼不同陰虛陽實有別脈遲厥利不能食反能
食者曰除中下利臍痛引陰筋食如故者名臟結二症俱死多眠神
復兆向壁卧有陰寒之虞衄血紅汗名動陰血爲厥竭之禁不
得卧有數種陽明是其大端轉經症不止一方導赤乃其最效

勝就有冷熱之結咽痛有寒熱之攻嗽水者血症與陰寒痰壅者風熱及痰飲小腹脹滿蓄血與溺色宜分大便不通陽結與陰結宜審動搖身振筋骨不榮驚悸怔忡氣虛停飲三物金沸療咳嗽而湯異功同白虎五苓治口渴而同功異法舌胎分屬表裏表則白滑裏生黑黃體痛介乎陰陽陽則煩疼陰如冰襲汗出不止曰漏大汗後亡陽所生頭旋眼花曰眩汗下後陽虛所致煩強爲表症結胸如痞者宜陷胸丸頭痛屬三陽陽旺則涎沫首爲厥陰痛鬱胃直視非佳兆瘡痂不言豈易爲遺尿者有熱有寒寒則死而熱可治諺語者有虛有實實則下而虛難醫舌卷囊縮厥陰亦辨陰陽手足搐攣汗出又逢風露曠日持久

變症有三汗吐下後仍不痊。變病方投驚風。飲行住坐卧皆不
定。自合須求百合湯。煎未除復感寒。寒熱往來號溫瘧。如何
治療。原用柴胡煎症已明。按後宜謹發。脾虛豆何今日之毒有
餘。諸語皆初答當初之汗不徹。勞復食復元。可與調中。然用先
當多勞易病。悔難知。逍遙燒視有驗。浮腫因嫌脾氣弱。水濕不
流。喜唾方知胃有寒。津液不納。飲酒必然將病復。虛弱知前汗
下傷。類傷寒症有五。治食積于平胃。化痰飲于二陳。補中益氣
治正煩加減續命。醫脚氣惟有桃仁承氣兼。治瘀血損傷。再宜
產風。暑濕多眠身重。風溫可用葳蕤。多汗妄言。濕溫原需未附
中。暑中喝之症。香薷飲宜投。傷濕風濕之流。羌活湯有效。普濟

消毒飲專療大頭六神通解方能司晚發內外有別男女須分
發寒熱而天癸適來知晝明而夜譫語服寒涼而經水適斷防
背血而腹滿疼胎產之間毫厘千里胎前之治安胎是其四物
冲和治太陽不如熟蘇飲爲穩當紫蘇大黃下秘結不如外導
法爲萬全少陽陽明柴葛雙解小兒外護青黛并記少見在中
真寒妊娠患之絕少附子姜桂炒製用之不如溫毒發斑升翹
加于四物自汗口渴白虎倍用人參月滿既生治法又異脈
偏喜沉細若浮素反爲不能製方切忌寒涼雖身熱遠須禁川
欲發表之劑加羌蘇葱于黑神收大便之方添酒大黃于產後
剛柔二症五積人廣成功口禁中風聖藥愈風乃效喘急參蘇

飲人多服木眩暈二四湯二陳四寒熱宜補宜消謹語血虛血

實未治雜症丹溪有言勿拘風寒前哲有論大綱細目幸此篇

之備陳心要秘傳容後章之再布

傷寒賦下篇

運氣加臨歲時各異六經傳變且暮不同其色聞聲為先切脉

審症須後觀其形體察決死生青色為寒涼土氣痛之候赤色

為熱須防戴陽之虞脾土色黃有喘渴則熱之變肝金色白主

氣虛血脫之災黑色為陰主寒主痛光明潤澤者黑逢之亦可

卒沉晦大枯紅黃見之亦有死相生者吉相克者凶分部位而

察成敗靈樞甚詳別死生而論外榮內經明悉望色曰神聞聲

曰聖口出無倫爲譫語無稽怒叫號狂言外感有餘出言壯厲
且先輕而後重內傷不足語言懶怯且先重而後輕語不接續
曰鄭聲無人始言曰獨語鼻衄身重自屬傷風聲啞唇瘡定因
狐惑口噤攣搐爲痙症鼻衄語塞是風溫錯語呢喃出言不正
胸中汨汨因有水喉中漉漉定爲痰涎見前篇不必再及脉因
未悉次第推求表則浮而裏則沉中爲少陽之候遲則寒而數
則熱緩爲胃氣之和動數大滑浮爲陽爲熱沉澀弱微弦爲陰
爲寒脉象先分四時順逆方驗陰陽急辨有力無力須知陰症
見陽脉者生見陽脈來微之兆陽症見陰脉者死正氣衰微之機
汗後脈安寧爲痊躁亂者未平溫後脈遲出爲愈數出亦凶大

小疎數不常定爲死。病進病退有別。症察陰陽尺脈無力而
虛汗下宜禁。寸口無力而弱吐之則止。六經之脈見於前審形
之法疎於後。凶者身重如山石吉者身輕如轉丸。辨衣摸床肝
熱寒肺胃心又手過汗陰虛手足牽引口風頭重視身曰倒陽
手擲足揭去衣被陽可知。倦卧神昏引衣曰益陰爲的。鼻爲肺
竅。心爲黑而紅黃者佳。舌乃心苗喜紅滑而黑刺者忌。中暑則
被汗鬱脾熱則唇口焦唇口青黑陰寒之故。唇口腫赤熱極之
徵。初發目眇黃睛黃者發黃之漸。病重目直視稍動者痰飲之
功。易症之目閉惡陰症之目閉。心胸滿悶察痞氣而大小結
胸小腹脹膨分畜血而大小便秘。疑似須別。活法宜精。太陽有

脈有寒自汗無汗之故。陰症有虛有實。傳經直中之分。傷風見
寒則汗多。脈浮而緊。傷寒見風則汗閉。脈緩而浮。前經未盡而
過經。表在者併病之例。三經不傳而齊病。自利者合病之條。有
明終而發熱。脈沉太陽。脈似少陰而反重。無頭疼而脈沉實。熱
少陰。症似太陽而反輕。重為正氣甚微。乾姜生附不可緩。輕為
表邪浮淺。麻黃附子正宜救陰。症似陽固多陽。症似陰間有脈。
沉足冷。知身熱而赤之症。非直重按無根。識數大洪浮之脈。是
戰稀黃。傍流而痛。硬必非陰寒。手足逆冷而乍溫。自知反陽。
狂莫作陰。跡收跡勿認。症珍發直。重手如金。傳經轉下直。可發
黃有直。濕之辨。傷寒有內外之名。表以火煖。里以湯熨。究內傷

外感按東垣始明勞力傷寒似虛煩夾食傷寒兼食積從脉不
從症莫疑從症不從脉當曉識病于未來世人方誤斷死生于
現在神鬼來通鼻孔燥乾欲嗽水者咽之兆頭上汗出小便難
者黃之基腹痛爲自利之先鋒自利而痛者恐白膿之下惡心
爲嘔吐之鄉導不食而飢者防沈厥之憂心悚爲正不勝邪倦
卧而漸成寒逆身振爲邪不勝正汗出而預報安痊

心動爲悚
身大動爲

戰若身微動爲振
振爲正氣虛寒

足冷耳聾咳嘔悶煩汗下不解斑將至妄語

悲嘆煩燥少卧神志不寧狂欲興痞積于腹中動氣之因氣積
于臍下奔豚之原小便利者瀉將痊汗自出者便必硬微浮緩
而不嘔清便自安肌表熱而大煩作汗必解邪氣欲傳脉緊急盛

未來之病循經可推邪氣不傳脈靜和病愈之期屈指可算未
知死症焉將全生陰陽毒過七朝兩感傷寒六日黑斑不治厥
竭須亡陰陽交及摸尋衣唇吻青今面薰黑舌卷囊目縮何耳
耳聾遺尿并失尿更添昏亂欬逆不已汗喘不休結胸症具兼
煩燥臟結亦死陰陽易病女勞復吐舌真凶二陽合病忌弦長
汗後脈疾名臟厥重暍除中口張目陷如此之流天命何咎若
欲奪命于萬一求全之毀常來必領審症于再三百中之發有
望

說約歌

示吉曰傷寒主方陶節菴先生提綱舉領其集四十可謂約

之極矣。胞與堂編成歌括，以便學者。豈非先得吾心者乎？予更採名家之秘，并獨得之法，增補于後。同志者庶無遺珠憾也。

太陽經

足太陽膀胱經起于目內，背從頭下，後項，達風府，行身之背。

症不同，方各異。四時傷寒各有例。惟有冬月正傷寒，不與春夏秋同治。發表實表兩妙方，用在三冬無別制。正傷寒正傷風，

表虛表實不相同。表虛自汗，脈浮緩，疏邪實表有神功。表實無

汗，脈浮緊，升麻發表自然鬆。背惡寒，身發熱，頭疼脊強無休

歇，俱屬太陽膀胱經。有汗無汗須分別，有汗表虛脈浮緩，無汗

表實浮緊列。

正傷寒

霜降後春分前天令嚴寒萬類深藏觸犯其氣而
即病者名正傷寒頭疼發熱惡寒項脊強無汗脉

浮緊

升麻發表

湯名即麻黃湯加味

桂麻黃升芷川芎甘草羌活防杏共咀槌法

妙法加一撮引蔥姜

寒熱頭疼無汗喘去升加葛是奇方發

熱惡寒身體痛除

杏加芍藥

又加蒼身痒面赤小便數減去芷杏

加柴芍頭悶寒熱胸飽悶

枳壳桔梗加投證服之無汗病難痊

汗多又恐生別病

示吉按經曰陽之汗以天地之雨名之病人得汗熱除猶天

氣鬱熱一雨而涼也凡服此劑外用厚被蓋覆其身及手足

取汗汗出不可驟動待汗乾方可揭開凡口苦舌乾或吐衄

亡血或淋瀝瀉痢或臍旁動氣或風溫濕溫中暑或瘡痛或產後或經水適來適斷或陰虛勞倦或尺脉微弱並不可汗俱禁此湯服此湯復熱脉燥亂者死汗出不至足者死

正傷風

冬月嚴寒水水地冷傷風即病自汗者名正傷風即桂枝加味

疎邪實表

湯

桂枝芍

明仁

赤芍

活風

羌防

白朮同

甘草

姜三

和盞二膠飴

二是其煎濃

加之柴杏

明仁

能消喘

止汗

黃芪

腠埋封

飽悶

還須

添枳

光梗

桔玄

機能

有幾人通

服此藥後進熱米湯一碗以助藥力溫覆一時遍身微汗者佳切忌如水淋漓反生別病一服病瘥不必前查盡劑病猶在再作服蓋欲中病即止也凡小便數者善飲酒者及春夏