

痘科全書卷三

編輯痘疹心法要訣

痘中雜證上

◎發熱

表熱無汗升麻湯裏熱有汗消毒良行漿毒蒸清毒劑結後餘熱連翹方

註痘之一證始終不可盡除其熱蓋熱非壯熱乃和緩之熱也以寒即收縮熱則宣發故初不熱則出不齊脹不熱則漿不行收不熱則痂不結自初出以至起脹時皮膚乾燥發熱無汗此熱在表也升麻葛根湯加荊芥穗防風主之蒸熱有汗此熱在裏也加減消毒飲主之至行漿時熱不減者此為毒熱薰蒸宜用消毒活血湯便秘者去人參黃耆加酒炒大黃至結痂後發熱壯盛胸腹手足俱熱二便秘澀者此為餘毒過盛宜用大連翹飲治之

升麻葛根湯

方見發熱證治

加減消毒飲

升麻

牛蒡子炒研

山豆根

紫草

連翹去心

生地黃

赤芍

川黃連

甘草生

引用燈心水煎服

歌加減消毒飲如神升麻牛蒡山豆根紫草連翹生地芍黃連甘草引燈心

消毒活血湯

方見灌漿證治

大連翹飲

方見收靨證治

◎驚搐

未見點搐清解方已見猶搐導赤良醫後虛搐宣神劑食蒸發搐大安康

註驚痘者多緣痘毒之火觸動心神移熱於肝肝風與心火相搏遂成是症治法須別始終如痘未出



編輯痘疹心法要訣目錄

痘中雜證上

發熱

升麻葛根湯

加減消毒飲

清毒活血湯

大連翹飲

驚搐

清解散

導赤散

甯神湯

木香大安丸

頭痛

大連翹飲

清解散

腰痛

加味歸宗湯

嘔吐

梔連二陳湯

腹痛

芍藥防風湯

加味平胃散

桂枝大黃湯

煩躁

加減消毒飲

涼血解毒湯

加味保元湯

加減四物湯

譫妄

黃連解毒湯

渴

葛根解毒湯

涼血解毒湯

人參麥冬散

生脈六均湯

厥逆

加減陳氏木香散

秘結

四順清涼飲

附子理中湯

梔子金花湯

承氣湯

喘

杏蘇飲

涼膈白虎湯

人參白朮散

參歸鹿茸湯

痰

加味二陳湯

保元化物湯

咳嗽

杏蘇飲

人參清膈散

加味二陳湯

乾噦



橘皮竹茹湯	汗	痛
丁香柿蒂湯	加味保元湯	升麻葛根湯
加味四物湯	當歸六黃湯	加味甘桔湯
失音	八正散	衄血便血
加味 子湯	瀉泄	犀角地黄湯
木香大安丸	柴苓湯	人參白朮散
參砂和胃湯	陳氏木香散	髮灰散
噎水	胃苓湯	加味四物湯
加味甘桔湯	豆蔻丸	歸脾湯
加味解毒湯	痢疾	寒戰咬牙
口噴穢氣	加味四君子湯	羌活湯
歸宗湯	加味四物湯	加味四物湯
不食	癢	參歸鹿茸湯
涼血解毒湯	加味升麻葛根湯	倦怠
人參白朮散	十全大補湯	補中益氣湯
加味桔梗湯	避穢湯	加味保元湯
加味平胃散	內托散	痘後浮腫

痘科全書目錄終



南京中醫藥大學圖書館藏

痘科全書卷三

編輯痘疹心法要訣

痘中雜證上

◎發熱

表熱無汗升麻湯裏熱有汗消毒良行漿毒蒸清毒劑結後餘熱連翹方

註痘之一證始終不可盡除其熱蓋熱非壯熱乃和緩之熱也以寒即收縮熱則宣發故初不熱則出不齊脹不熱則漿不行收不熱則痂不結自初出以至起脹時皮膚乾燥發熱無汗此熱在表也升麻葛根湯加荊芥穗防風主之蒸熱有汗此熱在裏也加減消毒飲主之至行漿時熱不減者此為毒熱薰蒸宜用消毒活血湯便秘者去人參黃耆加酒炒大黃至結痂後發熱壯盛胸腹手足俱熱二便秘澀者此為餘毒過盛宜用大連翹飲治之

升麻葛根湯

方見發熱證治

加減消毒飲

升麻

牛蒡子炒研

山豆根

紫草

連翹去心

生地黃

赤芍

川黃連

甘草生

引用燈心水煎服

歌加減消毒飲如神升麻牛蒡山豆根紫草連翹生地芍黃連甘草引燈心

消毒活血湯

方見灌漿證治

大連翹飲

方見收靨證治

◎驚搐

未見點搐清解方已見猶搐導赤良醫後虛搐宣神劑食蒸發搐大安康

註驚痘者多緣痘毒之火觸動心神移熱於肝肝風與心火相搏遂成是症治法須別始終如痘未出



而先發搐者不可純用寒涼壅閉其毒惟以清解散疎散表邪痘出而搐自止矣若痘已見形仍抽搐不止者此毒火內伏心經也宜用導赤散加黃連治之屬後發抽者是真氣虛弱火邪內攻發益神湯主之痘後食蒸發抽者此脾胃虛弱必面黃潮熱大便酸臭宜木香大安丸治之

清解散方見發熱證治

導赤散

木通

生地黃

淡竹葉

甘草稍

引用燈心水煎服

歌方

痘自見形仍作驚導赤散治最有功木通生地竹葉草黃連加入效通靈

甯神湯

人參

生地黃

麥門冬

去心

梔子仁

炒

黃連酒炒

石菖蒲

甘草

炙

辰砂

引用燈心水煎服

歌甯神湯內用人參生地麥冬山梔仁黃連菖蒲歸身草辰砂調服功極神

木香大安丸

山查肉

麥芽

炒

神麴

各一兩

枳實

六錢

白朮

黃連

三錢

木香

煨

三錢

縮砂仁

五錢

陳皮

右為細末水泛為丸炒陳倉米湯下量兒大小用之

頭痛

痘中頭痛最堪驚毒冲風熱雨分明稠密壯熱連翹飲疎稀微熱清解靈

註

頭痛者乃邪氣與真氣相搏壅遏毒氣上于清道而然也故毒熱上騰與風熱鬱閉皆能為害如頭

面痘出稠密身體壯熱悶亂昏痛者此毒火上騰也以大連翹飲主之若頭面痘出稀疎微覺身熱

頭痛者此風熱鬱閉也宜清解散治之



大連翹飲 方見收靨證治

清解散 方見發熱證治

●腰痛

症當未出腰先痛毒火亢極陰難勝瀉毒不使傳腎經加味歸宗宜速用

註凡症當發熱時而腰痛者最為惡候蓋腰為腎之府也毒火亢極真陰不能勝邪故頻頻作痛須用

加味歸宗湯速瀉其毒不使傳於腎經庶可望生治若少緩毒火冲熾症必乾枯紫黑腎陰絕則難救矣

加味歸宗湯

當歸尾

赤芍藥

元參

大黃生

羌活

荊芥穗

青皮炒

穿山甲炙

生地

東山查

牛蒡子炒研木通

水煎服

方加味歸宗治腰疼歸芍元參大黃生羌穗青皮穿山甲生地山查蒡木通

●腹痛

小兒發熱腹痛疼表鬱芍藥防風從裏鬱加味平胃散陰鬱桂枝大黃靈

註凡出痘腹疼有因風寒鬱結痘出不快煩躁而痛者乃表邪所鬱以芍藥防風湯主之有因食滯鬱

塞痘出之時原無腹痛忽然一時作痛者此為裏鬱宜加味平胃散治之又有初起因毒熱鬱於陰

分痛在臍下時作時止此屬陰鬱以桂枝大黃湯主之

芍藥防風湯

升麻

防風

陳皮

桔梗

川芎

白芍藥炒

甘草生

厚朴薑炒

枳實麩炒

引用生薑水煎服

方芍藥防風解表宜升麻防風共陳皮桔梗川芎白芍藥甘草厚朴枳實

加味平胃散

陳皮

厚朴薑炒

神麴炒

南蒼木

米泔水浸炒

麥芽炒

甘草生

南山查

引用生薑水煎服

歌加味平胃治食傷陳皮厚朴神麴蒼麥芽甘草香附米山查同煎引生薑

桂枝大黃湯

生大黃

桂枝

生甘草

生白芍

引用生薑水煎服

歌桂枝大黃療陰鬱生軍泄熱效非常散寒桂枝調中草白芍和中順氣強

●煩躁

未出煩躁消毒平已出煩躁涼血宣漿清發煩保元治屬後虛煩四物靈

註痘證始終以安靜為吉但有煩躁必生他變蓋煩者心憤也躁者身擾也皆由毒火太盛神不能靜

也痘未出而煩躁是為表鬱以消毒飲主之痘已出而煩躁是為血熱以涼血解毒湯主之若養漿

時頂平清稀而煩躁是氣虛也以加味保元湯主之收屬後煩躁是血虛也以加減四物湯主之

加減消毒飲方見雜證中發熱

涼血解毒湯方見結痂落痂證治

加味保元湯

人參

黃耆製

甘草炙

當歸酒洗

白芍藥炒

麥冬去心

棗仁炒研

水煎服

歌加味保元治虛煩人參黃耆甘草攪酒洗當歸白芍藥麥冬棗仁一同煎

加減四物湯

人參

當歸

麥門冬去心生地

梔子炒

白芍藥炒

水煎服

歌方屬後血虛多煩躁加減四物湯最妙人參當歸麥門冬生地梔子白芍藥



○謗妄

毒熱熾盛犯心經錯語妄言神不清妄見妄聞志昏憤黃連解毒服即甯

註謗妄者由毒熱熾盛上干心氣致使錯語妄言神氣不清妄見妄聞志氣昏憤以黃連解毒湯主之

黃連解毒湯方見結痂落痂證治

●渴

初熱大渴解毒湯血熱煎耗涼血良成漿津洩麥冬散屬後傷津生脉強

註渴由毒火番灼內傷津液而作也如初發熱即燔渴者裏熱盛也宜葛根解毒湯治之痘出稠密色

艷作渴者此血熱毒盛也涼血解毒湯主之成漿津液外洩而作渴者人參麥冬散主之屬後脾虛

內傷津液而作渴者生脉六均湯主之

葛根解毒湯

葛根

升麻

天花粉

甘草生

麥門冬去心生地

茅根

引用燈心水煎服

方葛根解毒湯清熱津液作潮火自洩升葛花粉生甘草麥冬生地茅根列

涼血解毒湯方見結痂落痂證治

人參麥冬散

人參

白朮土炒

甘草生

葛根粉煨

麥冬去心

升麻

引用糯米水煎服

方人參麥冬效通仙津液外洩治易痊麥朮甘草煨葛粉麥冬升麻糯米煎

生脉六均湯

人參

五味子

麥門冬去心陳皮

半夏薑炒

茯苓

白朮土炒

甘草炙

引用烏梅水煎服



歌生脉六均醫脾弱泄瀉傷津大渴作人參五味麥門冬陳半茯苓甘草合

●厥逆

爪白便清厥屬寒木香理中湯可痊爪紫便赤為熱厥金花承氣乃良煎

註痘中厥逆之證有因氣血虛寒發厥者有因毒熱鬱閉發厥者爪甲色白小便清利其痘色更見灰陷瀉泄不食等證此外陽衰內陰盛乃寒熱也以加減陳氏木香散主之寒甚者附子理中湯主之若爪甲色紅小便赤澀其痘色更見紫黑煩躁悶亂等證此係陽毒內攻熱極反寒是熱厥也宜施子金花湯治之裏實者承氣湯下之

加減陳氏木香散

人參

肉桂

茯苓

半夏薑製

白朮土炒

丁香

肉豆蔻麩裹煨

甘草炙

訶子肉麩裹煨

木香煨

引用生薑水煎服

訶木香散療中外寒參桂茯苓半夏攪白朮丁香肉豆蔻甘草訶子木香研

附子理中湯

人參

附子製

甘草炙

白朮土炒

乾薑

水煎服

歌附子理中治虛寒中外無陽莫留連人參附子炙甘草白朮乾薑一同煎

梔子金花湯

黃芩

黃連

黃蘗

大黃

梔子

水煎服

歌熱厥梔子金花湯熱極反寒服最良黃芩黃連并黃蘗大黃梔子共煎膏

承氣湯


厚朴薑炒

枳實麩炒

大黃

水煎服

歌承氣湯能除火熱裏實不便毒氣結厚朴枳實川大黃煎服便利毒即洩



喘

風寒客肺杏蘇先痰熱涼膈白虎煎泄瀉聲微參朮劑倒靨作喘歸茸痊

註五臟之氣皆統於肺若為邪干肺氣則窒塞氣道不利故發為喘也實者聲粗有力而長虛者聲微無力而短痘初發熱以至既出之後或噴嚏頻頻或鼻流清水此風寒客肺而喘也杏蘇飲主之有食熱痰積上冲作喘者此火炎肺金也宜涼膈白虎湯治之泄瀉後元氣下降此脾氣不足而喘也人參白朮散主之有痘漿灌至半足或倒靨而喘者此中氣大虧也參歸鹿茸湯主之

杏蘇飲

蘇葉

枳殼麩炒

桔梗

葛根

前胡

陳皮

甘草生

半夏薑炒

杏仁炒

去皮尖 茯苓

引用生薑水煎服

歌杏蘇飲治肺傷風蘇葉枳桔葛根從前胡陳皮生甘草半夏杏仁白茯苓

涼膈白虎湯

薄荷

連翹去心

石膏生

知母生

黃芩

甘草生

梔子

大黃

朴消

引用糯米水煎服

歌方涼膈白虎治火喘薄荷連翹共石膏知母黃芩生甘草梔子大黃配朴消

人參白朮散

藿香

白朮土炒

葛根

木香煨

甘草炙

白茯苓

人參

引用生薑水煎服

歌脾虛白朮散如神藿香白朮共葛根木香甘草茯苓配人參加入扶元真

參歸鹿茸湯方見灌漿證治

痰

痰因經液胎留生痘瘡之火煉而成加味二陳斟酌用灌漿保元化毒甯

註痰乃津液胎留胸中而生蓋痘毒之火耗煉其津液上壅氣道喉中作聲宜清氣化痰不可驟用金石之藥恐傷真氣以加味二陳湯治之若灌漿時見此證則禁用二陳湯但於助漿劑中少佐清氣化痰之品如保元化毒湯加橘紅貝母桔梗麥冬甚妥

加味二陳湯

麥門冬去心 胡前

桔萸仁

陳皮

半夏薑製

茯苓

甘草生

枳殼炒

桔梗

杏仁炒
去皮尖 黃芩

引用生薑水煎服

痧痘證多痰宜二陳麥冬前胡桔萸仁陳皮半夏茯苓草枳實杏仁共黃芩

保元化毒湯方見起脹證治

◎咳嗽

毒熱薰蒸火灼金肺氣上逆咳嗽頻初熱見點杏蘇飲收靨清膈二陳神

該咳嗽者有聲有痰也因痘毒之火上薰於肺故氣逆而發為咳嗽如初發熱見此者宜杏蘇飲主之偶感風寒者亦用此藥自起脹至成漿而咳嗽者由喉間有痘道路窄狹痘收自愈不必服藥結靨後咳嗽者乃衛氣虛弱腠理開張或因風寒者均宜人參清膈散治之因餘熱者宜加味三陳湯治之

杏蘇散方見喘證

人參清膈散

人參

黃耆生

茯苓

白朮土炒

黃芩

當歸

白芍微炒

知母生

桔梗

甘草生

柴胡

滑石飛

紫苑

地骨皮

桑皮炒

引用生薑水煎服

方清膈散療靨後咳參耆苓朮歸芍知桔甘草紫滑石紫苑地骨桑皮合

加味二陳湯方見痰證

●乾噦

痘瘡乾噦病勢沉毒熱二逆正難禁實熱橘皮竹茹劑虛寒丁香柿蒂神

註乾噦者有聲無物其聲重大而長屬陽明胃經也緣毒熱上逆所致又有胃氣不足不能容受便有

寒邪客於胃中使胃氣不能中主上行而噦也熱者橘皮竹茹湯主之

橘皮竹茹湯

橘紅

半夏薑製

麥門冬去心

枇杷葉薑炙

甘草生

竹茹

赤苓

引用蘆根水煎服

歌橘皮竹茹湯如神嵩醫胃氣嘔逆頻橘半麥冬枇杷草竹茹赤苓與人參

丁香柿蒂湯

丁香人

人參

高良薑

柿蒂

水煎服

歌丁香柿蒂湯治寒胃氣上逆不得安丁香良薑人參共更入柿蒂一同煎

●嘔吐

毒盛嘔吐二陳良吞嚥不利鼠黏湯傷食吐酸大安效氣虛作嘔和胃方

註嘔者有物有聲吐者有物無聲二證皆屬於胃痘初出嘔吐者是火邪犯胃毒氣上騰痘必紅紫宜

施連二陳湯自起脹至收靨嘔吐者是瘡集喉門吞嚥不利所致須用鼠黏子湯若傷食嘔吐者吐

必腥酸宜用木香大安丸設吐後精神困倦不思飲食乃胃氣虛也以參砂和胃湯主之

施連二陳湯

陳皮

半夏薑製

茯苓

甘草生

梔子薑炒

川黃連薑炒

引用生薑水煎服

歌毒氣冲胃吐頻頻醫治須宜用二陳陳半茯苓生甘草梔連薑製效如神



加味鼠黏子湯

桔梗

射干

連翹去心

荆芥

防風

山豆根

鼠黏子炒研

乾薑

水煎服

歌加味黏鼠湯極和桔梗射干同連翹荆芥防風山豆根黏鼠子炒配乾薑

木香大安丸方見驚證

參砂和胃湯

人參

白朮土炒

藿香

茯苓

陳皮

半夏薑製

縮砂仁

甘草炙

引用煨薑水煎服

歌虛吐參砂和胃湯人參白朮共藿香茯苓陳皮製半夏縮砂甘草引煨姜

○噎水

毒壅會厭水難納溢入氣喉瘡始發咽喉腫痛道路狹甘桔解毒皆妙法

註噎水者因火盛毒壅會雁門也蓋喉門司納飲食一為毒熱所壅則必腫痛水不易入溢於氣喉故

氣噴出而瘡作矣宜用加味甘桔湯或加味解毒湯亦可此證見於七日前者皆屬惡喉若七日

已後外痘蒸長光潤而作噎者是喉門痘長壅塞道路而使然也至結痂則瘡自止治者當于毒盛

之痘預用清理氣道之藥不使熱毒侵犯自能免此患矣

加味甘吉湯

牛蒡子炒

苦桔梗

生甘草

射干

水煎服

歌加味桔梗湯最良痘證噎水效非常牛蒡子合苦桔梗甘草射干共煎膏

加味解毒湯

元參

苦桔梗

麥門冬去心

當歸尾

赤芍

生地黃

連翹去心



牛蒡子炒研丹皮

紅花

甘草生

木通

引用燈心水煎服

歌加味解毒湯最靈元參桔梗麥門冬歸芍生地翹牛蒡丹皮紅花草本通

●口噴穢氣

發痘脾胃被毒侵口噴穢氣不堪聞毒火燔灼宜速治加味歸宗功效神

註毒火侵炙脾胃故口出臭味令人難近蓋由痘全賴脾胃以為根本今為毒火侵害則根本受傷不

急救之必至脾胃潰爛而成大害須以歸宗湯治之穢減庶可望生

歸宗湯方見發熱證治

●不食

便秘不食解毒湯脾虛不食參朮良不食咽腫甘桔劑傷食惡食平胃膏

註痘瘡賴氣血以成功氣血藉飲食以生化自起脹灌漿以至收靨結痂俱以胃壯為根本故痘中遇

不食之證須要明辨如大便秘結痘瘡掀紫不食此毒盛血熱也宜涼血解毒湯加黃芩黃連大黃

主之若痘色灰白瀉泄不食此脾氣虛弱也人參白朮散主之行漿時欲食而復畏食此咽門腫痛

難以下嚥也宜加味甘桔湯主之設喜食過多惡食不食乃內傷飲食胃有宿滯也宜加味平胃散

主之

涼血解毒湯方見結痂落痂證治

人參白朮散方見喘證

加味甘桔湯方見瘡水

加味平胃散方見腹痛

●汗

熱少汗微營衛暢太過須防陰液亡自汗不止保元劑盜汗夜熱六黃湯



南京中醫藥大學圖書館藏

註衛氣乃護衛皮膚固守津液使不走洩者也痘證見此是痘毒之火由裏達表于於胃氣腠理疎故汗出矣初見有微汗者是營衛通暢毒從汗解是良候也但汗為血液太過則陰液必亡須謹防之如起脹後大汗不止未行漿恐不能灌既行漿恐不能屬既屬尤恐氣血虛脫最為可畏自汗為陽虛急於斂汗以保元湯主之盜汗為陰虛急於降火以當歸六黃湯主之

加味保元湯
人參 黃耆蜜炙 浮小麥 甘草炙 廣桂枝 白芍炒 水煎服

歌方陽虛汗出用保元人參黃耆浮麥甘廣桂枝同白芍藥斂汗實腠此為先

當歸六黃湯

黃芩 黃蘗 黃連 生地 熟地 當歸 黃耆生 水煎服

歌方六黃湯斂陰虛汗黃芩黃蘗共黃連生熟地黃當歸配黃耆倍用效通仙

◎秘結

痘瘡內外宜宣暢秘結氣血鮮流盪大便不通四順宜小便秘瀝入正當

註凡出痘二便最喜通暢以痘屬毒火惟通暢然後經絡疎利氣血流動而無壅遏之患一有不通則

毒火不能外達必至內攻而生患初出大便秘者四順清涼飲主之小便秘者八正散主之若至成

漿時切勿輕用

四順清涼飲

白芍藥 當歸身 甘草生 生大黃 水煎服

歌方四順清涼治秘結大便不通毒火烈白芍當歸大黃草急急煎服效靈捷

八正散

車前子 瞿麥 扁蓄 枳子仁 大 草 生 木通



滑石 引用燈心水煎服

方八正散治小便秘車前瞿麥與扁蓄梔子大黃木通草更入大黃煎成劑

●瀉

初熱作瀉柴苓先脾虛冷瀉木香煎色黃酸臭胃苓治灌漿虛化豆蔻丸

註 症證不喜秘結更忌瀉利初出時瀉尚具開通之功火熱由利而解若瀉甚則是邪氣併於腸胃起

而下降使傳化失常也宜柴苓湯主之起脹時瀉手足逆冷症不起其色淡白此冷瀉也以陳氏木

香散主之如中滿惡食瀉黃酸臭手足心熱面赤瘡紅此化胃熱作瀉以胃苓湯主之惟成漿時尤

為緊要蓋症瘡至此津液已衰脾胃已弱復加瀉泄則百變叢生急以豆蔻丸主之

柴苓湯

黃芩

半夏 薑炙

白朮 土炒

甘草 土炒

赤茯苓

猪苓

澤瀉

柴胡

引用生薑燈心水煎服

方 歌痘形未見先泄瀉柴苓疎利功最捷苓半朮甘赤茯苓猪苓柴胡共澤瀉

陳氏木香散

方見厥逆

胃苓湯

陳皮

厚朴

炒

赤茯苓

蒼朮

米泔水浸炒

猪苓

澤瀉

白朮

土炒

引用燈心水煎服

方 歌實裏作瀉胃苓治陳皮厚朴赤茯苓蒼朮猪苓並澤瀉減桂倍朮效無窮

豆蔻丸

白龍骨

煨 肉豆蔻

麵裹煨去油

木香 煨

砂仁

訶黎勒肉

麵裹煨 各五錢

赤石脂

煨 錢半

白枯礬 三錢

共為細末麪糊為丸如黍米大每服三五十丸米飲下



●痢疾

痘瘡未愈痢隨生濕熱傷中證非輕白屬傷氣四君劑紅屬傷血四物靈

註凡痘瘡未愈而患痢疾者乃濕熱鬱於腸胃致傷氣血而然也痘必滯黯無色治當清熱除濕調理

氣血為主白痢屬氣加味四君子湯主之赤痢屬血加味四物湯主之赤白相兼者合而用之

加味四君子湯

茯苓

白朮土炒

人參

陳皮

木香煨

甘草炙

黃連

炙

黃芩

水煎服

方加味四君妙如神茯苓白朮共人參陳皮木香炙甘草薑炒川連配黃芩

加味四物湯

川芎

當歸

生地

黃芩酒炒

川連酒炒

木香

白芍炒

水煎服

方加味四物治赤痢川芎當歸共生地酒炙黃芩合川連木香白芍調成劑

●癰

見點作癰葛根湯灌漿癰塌大補良觸犯暴癰薰避穢急煎內托免毒藏

註經曰諸癰為虛又曰火微則癰治者須分別治之痘方出而身癢者此邪氣欲出腠理嚴密其火游

溢往來故不時作癢加味升麻葛根湯主之灌漿時痘色淡白平塌便溲懶食漿清作癢者此脾胃

弱血氣虛也十全大補湯主之如穢氣觸犯而暴癢者外用避穢香薰之內服內托散送毒外出庶

無內攻之患致於將斂而作癢者此膿成毒化營衛和暢也與瘡癰將痊作癢者同論不必服藥

加味升麻葛根湯

升麻

葛根

防風

淡豆豉

赤芍

桂枝

甘草生

水煎服

方加味升麻葛根湯痘出作癢最堪當升葛防風淡豆豉赤芍桂枝甘草良