

医学六要



最妙治惡阻大効

分心氣飲 治一切氣病

紫蘇葉 半夏 青皮 陳皮 大腹皮

赤茯苓 桑皮 芍藥 甘草 木通

古方有羌活肉桂萸棗隨時加減或加越鞠

三味

蘇子降氣湯 治陽虛上攻氣不升降痰涎壅

盛

蘇子 厚朴 陳皮 半夏 前胡

錢半
炒研

肉桂

各一錢

甘草

五分

石豔三片煎服

流氣飲子

治男婦五臟三焦氣壅心腎痞悶

咽塞不通腹脇膨脹嘔吐不食及上氣喘

急喘嗽痰盛面目四肢浮腫二便秘塞及

治憂思太過陰陽之氣鬱結不散壅滯成

疾又治腳氣腫痛上喘作脹大便不通及

氣攻肩背腎脇走注疼痛

蘇葉

青皮

當歸

芍藥

烏藥

茯苓

桔梗

半夏

川芎

黃芪

枳實

各七分

防風

甘草

陳皮

木香

連皮大腹子

各五分

右薑三片棗一枚水煎服

橘皮一物湯

治諸氣攻刺及感風寒暑濕初

症通用凡酒食所傷中脘痞塞防悶嘔吐

吞酸

橘皮

洗淨

右用新汲水煎服



解五臟結氣益少陰經血用梔子炒令黑爲末
以薑汁入湯同煎飲其効如神氣有餘便
是火此方得之矣

治實熱在內有如氣滯

知母

黃連

黃栢

黃芩

枳殼

各分

右水煎服

鹽煎散

治一切冷氣攻冲膏腹刺痛不已及

脾胃虛冷嘔吐瀉泄

砂仁

甘草

炙

茯苓

草果

肉豆蔻

川芎 茴香炒 澄茄 麥蘖 檳榔

良薑 枳殼 厚朴炒 陳皮 羌活

蒼朮 各等分

右入鹽少許煎服

正氣天香散

烏藥錢半 香附六錢 陳皮 紫蘇

乾薑 各

右白水煎服

青木香丸 治胃膈噎塞氣滯不行腸中水聲



嘔吐痰逆不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛

二十四兩炒香取頭末十二兩

木香

三兩

補骨脂

炒

華澄茄

各四兩

檳榔

酸粟米飯蒸罍

右末入牽末令勻以清水和爲丸菜豆大每

服三十丸茶湯下氣滯濕痰盛者大効

三因七氣湯 治七氣鬱結五臟之間互相刑

尅陰陽不和揮霍變亂吐利交作

半夏

厚朴

白芍藥

茯苓

各貳錢

桂心

紫蘇

橘紅

人參

各壹錢



右水二鍾薑七片紅棗一枚煎至一鍾不渴時服

丹溪曰凡氣在胃臆而爲痞滿刺痛伏梁等症者二陳加枳桔黃連木香瓜蒌之類在下而爲奔豚七疝等病本方加桃仁山查梔子枳核茴香川棟荔枝之類在兩脇攻築作痛本方加醋製青皮柴胡芍藥膽草之類在中焦而痞滿脹急者本方加木香厚朴檳榔枳殼或用平胃散以平其土氣敦阜惟婦人胎前產後一切氣症

須兼四物一二味養血爲主兼疎利

脉結澁或沉弦急疾收斂四肢腹脇腰膝牽引
疼痛不能轉側皆由七情鬱滯挫閃傷損謹察
其原隨症疎導

分氣紫蘇飲 治脾胃不和氣逆喘促

五味子 去核 桑皮 茯苓 甘草 炙

草果 大腹皮 陳皮 桔梗

右薑三片水煎服

紫蘇子湯 治思慮過度邪傷脾肺心腹膨脹

及喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲二便

利肺脉虛數而澁

橘半 枳木加人參大腹皮蘇子草果厚

朴木香木通并草

四炒枳殼丸 治氣血凝滯腹內鼓脹

枳殼

四兩去穢切指頭大分四處一分蒼

分蘿藤子同炒一分乾漆同炒止用枳殼

爲末將原炒四味煎汁打糊丸大綠

氣病用氣藥不効者氣之所藏者無以收也善



肺主氣腎藏氣古方木香順氣丸用木香枳殼
陳皮香附牽牛大腹皮蘿藦子青木香丸用
牛木香華澄茄檳榔俱有破故紙皆取其壯腎
氣以收濁氣下歸膀胱使施化而出也

四磨湯 治七情鬱結上氣喘急胃膈脹痛神

効

人參 檳榔 沉香 天臺烏藥

右四味各磨濃汁小半盃頓溫服本草云四
味磨作湯治胃膈殊効加木香枳殼爲六

木香流氣飲

治諸氣痞塞不通胸膈膨脹

目虛浮四肢腫滿口苦咽乾大小便秘

半夏

二斤

青皮

去白

厚朴

薑製

紫蘇

去梗

香附

去毛

甘草

各一斤

陳皮

去白

肉桂

不見火

蓬朮

煨

丁香

不見火

檳榔

麥冬

志

木香

不見火

草菓

各六兩

木通

八兩

藿香

白芷

赤茯苓

去皮

白朮

木瓜

人參

生蘆

石菖蒲

大腹皮

製各四兩

薑棗煎每服四錢熱服

養正丹

治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣



短身羸及中風涎潮不省人事傷寒陰盛

自汗唇青婦人血海久冷

水銀

黑錫

去滓淨秤與水銀結砂子

硫黃

研

硃砂

細研

各壹兩

右用黑盞壹隻火上熔黑鉛成汁次下水銀

以柳條攪次下硃砂攪令不見星放下少時

方入硫黃末急攪成汁和勻如有酸以醋洒

之候冷取出研極細煮糯米糊丸菜豆大每

服叁拾丸鹽湯棗湯任下



三錫曰氣鬱久則中氣傷不宜尅伐補中益氣
佐舒鬱川芎香附枳殼之類胎產後同法

三錫曰難經云血主濡之氣主煦之一切氣病
用氣藥不效少佐芎歸血藥血氣流通而愈乃

屢驗者

二陳湯見痰門
四物湯見血門

平胃散見脾胃門

血

張三錫曰榮血之行各有常道爲火所迫則錯

亂沸騰而吐衄唾涎■等血症作矣有如火急

湯沸勢不可遏火去斯止善乎丹溪之論曰口

鼻出血皆是陽盛陰虛有升無降血隨氣上越
出上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經矣乃論
血證三脉語

陽明之脉絡鼻是經火盛迫血妄行從鼻出者
曰衄方書言從肺來非也從口湧出者曰吐血
初起洪大犀角地黃湯按犀角性升散能散一
切有餘之火乃陽明經藥故曰如無犀角以升
麻代之今人不知泥於犀角解乎心熱一句不
分

輒與四物同用若是實火固爲得宜

陰虛者寧免飛揚之禍歟

原病式曰、衄者陽熱拂鬱於足陽明而上熱血妄行故鼻衄也

丹溪曰衄血宜涼血行血爲主

犀角地黄湯加鬱金山茶花薑汁童便酒調下傷寒家得衄爲欲解謂熱隨血去俗曰紅汗是也詳見本門

一方人中白新瓦上焙乾入麝香少許細酒調

下卽止



服犀角不止兼用降藥岑連梔栢丹皮生地玄
參側栢葉赤芍之類選用

衄血後半月一月每洗面卽發是經尚未歸四
物加石膏蒲阿膠蒲黃各半錢煎熟調煨石膏
一錢兼進養正丹

見氣門

失血家須用下劑破血蓋施之于蓄妄之初血
血家不可下蓋戒之于亡失之後

一應上溢之證若脾胃氣壯不瀉能食者皆當
以大黄醋製和生地黃汁及桃仁泥牡丹皮之