

傷寒溯源集

七

重編張仲景傷寒論證治發明溯源集卷之七

虞山 錢潢天來甫 著

男搭壽平

朱良弼賚予 訂

門人 程來祉克昌

日本 天野俊英子雲再訂

少陽全篇 合病併病附

少陽證治第十四

少陽正治

少陽之爲病口苦咽乾目眩也

少陽者足少陽膽經也膽爲東方初

生之木名之曰少陽者天地之陽氣生於黃泉則草木之根荄勾萌于至陰坤土之中謂之厥陰至三陽開泰陽氣透地則萌芽生動二月而陽氣上騰以雷霆之鼓風雨之潤而草木條達陽氣附于草木而初生故爲之少陽人身以臟腑居于軀殼之中者爲三陰陽氣由命門而出爲無形之三焦難經所謂命門爲三焦之原是也三焦附於肝膽猶天地之陽氣附於草木也是爲少陽主乎軀殼之裏層由此而盛陽外布于肌肉而爲陽明行乎營衛達於皮毛而爲太陽矣靈樞經脉篇云足少陽之脈起于目銳眥出走耳前至目銳眥皆後下頸入缺盆邪在少陽之經故目眩而咽乾又云是動則病口苦善太息且手少陽脈之支者亦走耳前至目銳眥皆動則病耳聾嗌腫喉痺故少陽之爲病口苦咽乾目眩也

傷寒中風五六日往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞕或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者與小便

# 柴胡湯主之

五六日六經傳邪之候也、往來寒熱者、或作或止、或早或晏、非若瘧之休作

有時也、以五六日而尚往來寒熱、則知邪未入陰、猶在少陽也、少陽之脉雖行身之側、而其實則軀殼之裏層也、向外則由陽明達太陽而爲三陽表也、向內則軀殼中之臟腑爲三陰裏也、少陽居于表裏之間、故爲半表半裏邪、在少陽則所入已深、衛氣周行一身、故邪氣與衛氣合、則病作、與衛氣離、則痞休、衛氣旋轉流行、如環無端、故其寒熱之作必待正邪相遇、所以有往來之不齊也、非若太陽居表之最外一層、營衛所在、邪氣入之卽寒熱不休也、其所以寒熱者、瘧論所謂邪並於陽、則陽勝、并於陰、則陰勝、陰勝則寒、陽勝則熱也、胸脇苦滿者、少陽脈之支者、別銳皆下大迎、合於少陽、下頰車、自頸合、缺盆以下、胸中貫、膈絡肝屬胆循、腸裏出氣街、其直腸下痞也、胸脇苦滿故、默默不欲飲食、然邪在半裏、爲入陰之漸、且少陽與厥陰相爲表裏、所以如厥陰證之、默默不欲食及飢不欲食、或腹中痛也、邪熱在胸、故心煩喜嘔、或但胸中煩而不嘔、或心下築築然悸動也、或渴或不渴者、寒熱往來、或作或止、卽瘧論所云、或甚

升

或不甚故或渴或不渴也邪在半表故身有微熱少陽之脉下胸中邪入胸中而犯肺故或欬也或者或有或無非必皆有也大凡邪氣在表表實則當汗解邪氣在裏裏實則當攻下邪在膈上將次入裏則當用吐今邪在半表半裏之間汗之則達表之途遠誤汗則陽氣虛而邪必犯胃恐有讞語煩惱之變生吐下則內陷之機速誤吐下則正氣傷而虛邪內侵恐有驚悸之患作故汙吐下皆在所禁而以小柴胡湯和解其半表半裏之邪也以下凡稱少陽病者其見證皆具載此二條中雖未必全見或見一二證者卽謂之少陽病也義見二下條

### 小柴胡湯方

柴胡

半斤

黃芩

三兩

人參

三兩

甘草

三兩

半夏

半斤

生姜

三兩

大棗

十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

柴胡湯而有大小之分者非柴胡有大小之異也蓋以其用之輕重力之

大小而言也大柴胡湯能兩解表裏之邪者以柴胡湯解其半表之邪而以大黃攻下其在裏之實邪其功力

遇

較大故謂之大、小柴胡湯兼能和解半表半裏之邪。且可以調護其正氣，其功用較緩，故謂之小也。夫小柴胡湯乃升發少陽之要劑也。草木得陽氣而生發，陽氣出地而發生草木，陽氣附于草木，故木爲少陽。若木得邪氣而仰鬱不舒，則少陽之氣不能宣布其發生矣。故六元正紀大論云：木鬱則達，之木氣條達，則少陽之氣升發。天地變化而草木蕃矣，人身之陽氣由腎水中命門而出，從陰而始達少陽。若爲邪氣所遏，其氣不得由陽明而達太陽，邪客其經，所以往來寒熱，胸脇滿而脢下痞硬，或嘔或渴之證，肝胆受邪，故口苦咽乾，目眩也。邪在少陽，內逼三陰，達表之途遼遠，汗之徒足以敗衛亡陽，少陽雖外屬三陽，而入裏之路較近，下之適足以陷邪，傷胃，汗下俱所不宜，故立小柴胡湯以升發少陽之鬱邪，使清陽達表而解散之，卽所謂木鬱達之之義也。故少陽一經，惟此一方無他方也。雖有多證，亦不過則更用他法矣。後人之補中益氣湯及逍遙散之類，因此出入變化而已。至變證已離少陽，柴胡不中與之，方用柴胡，故爲君者，李時珍云：柴胡乃手足厥陰少陽之藥，勞在脾胃有熱，或陽氣下陷，則柴胡乃引清氣退熱之。

胡

法

穀

必用之藥李東垣謂能引清氣而行陽道傷寒外諸有  
熱則加之無熱則不必也又能引胃氣上行升騰而行  
春令又凡諸瘧以柴胡爲君隨所在經分佐以引經之  
藥十二經瘡疽中須用以散諸經血結氣聚愚按所謂  
清氣者下焦所升清陽之氣也謂之清陽者蓋穀之獨  
氣降于下焦爲命門真陽之所蒸其清氣騰達于上聚  
膻中而爲氣海通于肺而爲呼吸布于皮膚而爲衛氣  
運行於周身内外上中下而爲三焦附于肝胆而爲少  
陽風木故清陽不升內無以達生發陽和之氣所以外  
不能驅邪出表矣陰陽應象論云清氣在下則生飧泄  
濁氣在上則生腹脹此陰陽反作病之逆從也因此而  
東垣有能引胃氣上行升騰而行春令之語瀕湖有脾  
胃有熱陽氣下陷引清氣而退熱之用是下焦之真陽  
虛則當以溫補命門爲主下焦之真陽不上行則當以  
升發清陽爲急必使陽氣運行清陽出上竅濁陰出下  
竅清陽發腠理濁陰走五臟清陽實四肢濁陰歸六府  
然後陰陽各得其用也小柴胡湯之用柴胡蓋取其清  
陽發腠理也黃芩者佐柴胡而徹其熱也藏氣法時論  
云肝苦急急食甘以緩之故用入參甘草之甘緩腎爲  
奇恒之府其精汁無餘所以藏而不瀉與他府之傳化

乾

不<sub>上</sub>同況少陽爲春生之始氣春氣旺則百物皆生故十一藏皆取決焉乎少陽三焦以氣爲用氣不旺則不能運化流行故以入參助其升發運行之力也其在本方已有因證加減之法今世俗皆棄人參而不用以爲穩當乃盲醫不知虛實之故也惟熱盛而邪實者乃可去之或有兼證之不相合者亦可去也若邪輕而正氣虛者未可概去也或邪氣雖盛而正氣大虛者亦當酌其去取也如柴胡桂枝湯雖發熱微惡寒支節頑疼微嘔而心下支結爲外證未去乃太少兼證故於小柴胡之半劑加入桂枝湯之半以兩解之而人參仍不去也又如柴胡桂枝乾姜湯雖已發汙而復下之爲不虛矣又以胸脇滿而微結但頭汗出往來寒熱非惟少陽之邪未解太陽亦未解也故增入桂枝于姜桔橘牡蛎而人參半夏姜棗皆減去矣又如柴胡加芒硝湯雖有潮熱冒實之證以其胸脇滿而嘔本屬柴胡證柰以下非其治之丸藥下之致成少陽壞病故但加芒硝而人參仍不去也更如大柴胡湯以太陽病而過經十餘日反二三下之亦可謂虛矣更後四五日而柴胡證仍在故先與小柴胡湯服湯而嘔不止心下反急鬱鬱微煩不解者蓋因邪自太陽悞下入裏且柴胡證仍在故仍以柴胡

解少陽之邪、加入大黃枳實以攻入裏之邪、合而爲下兩  
解表裏之劑、然以太陽入裏之熱邪未去、所以竟去二人  
參也。若此之類、皆去取之法、乃小柴胡湯之變法也。總  
之邪氣獨在少陽、未見有去人參者。若兼太陽表證、及  
陽明胃實者、未有不去人參者也。若能得其去取之旨、  
便能隨證加減、無不得心應手矣。半夏辛溫滑利、可以  
去胸膈之滿、及痞硬之邪、卽半夏瀉心之義、非獨治痰  
蠲飲也。生姜辛而能散、太棗甘而和緩、可以和營衛而  
調其往來之寒熱也。以一方而該二經之證、  
苟非靈機活潑、隨證轉移、曷足以盡其變哉。

### 後加減法

若胸中煩而不嘔、去半夏人參、加桔梗實一枚。

傷寒鬱熱

之邪、及中風之陽邪、在胸、皆可發煩。邪在少陽、可煩、太  
陽之邪在胸、亦煩。以邪熱搏聚于胸中、而煩悶、不宜補  
氣、故去人參、外邪犯胃、寒飲聚于胃口、則嘔。故用半夏  
之辛溫滑利、以蠲飲。若不去嘔、則邪未犯胃、飲未搏結、故  
去半夏也。桔梗實甘寒潤燥、降火治咳嗽、故加之以去  
胸邪、而止煩熱。李時珍云：張仲景治下胸痺痛、引心背咳

辣

唾喘息及結胸滿痛皆用桔梗實乃取其甘寒不犯胃氣能降上焦之火使痰氣下降也成氏不知此意乃云苦寒以瀉熱蓋不嘗其味隨文傳會耳然桔梗之性滑半夏又滑因桔梗甘寒宜于煩熱半夏辛溫故不用也

若渴者去半夏加人參合成四兩半桔梗根四兩

夏

辛 辣而溫熱故不宜於燥渴桔梗根苦寒而能徹熱生津故宜加入增人參者所以益氣而添津液也

若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩

腹痛爲太陰脾病  
張元素曰芍藥白

補赤散能瀉肝益脾胃酒浸行經上中部腹痛與姜同用溫經散濕通塞利腹中痛胃氣不通白芍入脾經補中焦乃下利必用之藥蓋瀉利皆太陰病故不可缺得甘草爲佐治腹中痛熱則少加黃芩寒則加桂此仲景神方也李時珍謂白芍益脾能于土中瀉木赤芍散邪能行血中之滯日華言赤補氣自治血久審矣如此則丹溪所云腹痛多是血脉凝濁亦必酒炒用然止能治血虛腹痛餘並不治之說非確論矣腹痛已屬太陰黃芩寒中故去之愚謂太陰腹痛者合溫藥治之則可若兼陽明胃實腹滿而痛當用承氣湯者非芍藥所能治

若腹雖痛而有表邪未去者亦未可用  
不可概以芍藥爲腹痛必用之藥也

若肠下痞硬去大棗加牡蠣四兩

少陽之經脉下胸中貫膈屬肝絡胆

循腸裏邪入其絡故肠下痞硬去大棗者恐其甘緩也牡蠣之加成氏謂鹹以軟堅而已後人皆附會焉不知仲景但以之治肠下痞硬而不<sub>三</sub>用之以治<sub>二</sub>心下痞硬則和不但鹹以更堅併可以平肝邪而合少陽之絡矣神農本經不言及此惟名醫別錄有治<sub>二</sub>心肠下痞熱之語王好古亦云以柴胡引之能去肠下硬以茶引之能消頂上結核以<sub>二</sub>大黃引之能消<sub>二</sub>股間腫以<sub>二</sub>地黃爲使能益精清小便想亦有所自也柴胡龍骨牡蠣湯中用之以治<sub>二</sub>胸滿煩驚不可轉側又所以平<sub>二</sub>木氣而解<sub>二</sub>少陽之邪止也豈止鹹以更堅之用邪

若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩

悸者惕然跳

動之謂也然有心下心中臍下之不同如心中悸而煩者小建中湯之悸也脈結代而心動悸者炙甘草湯之悸也發汗過多而手冒忘而悸者桂枝甘草湯之悸也汙出不解發熱心下悸頭眩身瞞動振振欲擗地者真

武湯之悸也、發汗後、臍下悸、欲作奔豚者、茯苓桂枝甘草大棗湯之悸也、凡此諸悸、皆太陽悞治之虛邪所致也、卽少陽中風、兩耳無聞、目赤、胸滿而煩者、亦因吐下之虛而致驚悸也、雖傷寒脈弦細頭痛發熱者、已屬少陽、若悶汗之致胃不和而讝語者、當以小承氣和胃則愈、其證似乎胃實然亦因邪在少陽不可汗而汙之邪、乘悶汗之虛陷入于胃、胃不知則煩而悸耳、亦虛邪也、至于三陰之悸、皆陰盛陽虛可不言而喻矣、所以陽明一經實邪居多、故絕無悸病、惟太陽病而小便利者、飲水多必心下悸、小便少者必苦裏急之一條、與此義相符、蓋以太陽之熱邪、尚未入府、膀胱無熱、故小便通利、裏既無熱、所以飲水多則水寒停蓄、胃氣不得流行、故心下築築然悸動也、況於小便不利者乎、此以少陽虛無之府、以氣爲用邪氣犯之、則虛故小柴胡湯中有人參之補、雖非飲水多而致心下悸、以小便不利亦必三焦不運、陽氣不行、水飲停蓄於胃、故令心下悸也、去黃芩者、惡其寒中也、加茯苓者、取其淡滲其性上行而下降利水而瀉下、若小便得利、悸自當止耳、然旣去黃芩氣化不行、設小便乃不利者、五苓散或可採擇也。

若不渴外有微熱者去人參加桂三兩溫服取微汗愈  
不渴則邪未入裏外有微熱則表證未除去人參者恐其因太陽之表邪也然何以知其爲太陽之表邪乎觀加桂去人參則知爲太陽之表邪矣溫覆取微汗所以解太陽之風邪也所謂加桂者乃桂枝非桂肉也李東垣曰經云味薄則發泄故桂枝上行而達表味厚則發熱桂肉下行而補腎此但曰加桂而未云桂枝然以溫覆取微汗推之知其爲桂枝無疑矣傳寫脱落其義可見

若咳者去人參大棗生姜加五味子半升乾姜二兩

有聲無痰曰咳、咳者肺氣上逆也肺爲主氣之臟通呼吸而行衛氣若氣上逆則不宜于補故去人參大棗之甘生姜則不必去也加五味子乾姜者卽小青龍湯之制也小青龍以水寒傷肺故以此收肺氣之逆此方用之其義一也但肺寒氣逆者宜之肺熱氣盛者不可加也所謂半升者非今升斗之升也以五味子而加半升令三人讀之無不駭異以爲五味子之酸收本爲難用寧有卽用半升之理孰知古之所謂升者其大如方寸匕

以銅爲之，上口方各一寸，下底各六分，深僅八分，狀如小熨斗而方形，嘗于舊器中見之，而人皆不識，疑其爲香爐中之器用，而不知卽古人用藥之升也。與陶隱居名醫別錄之形像分寸皆同，但多一柄，想亦所以便用耳。如以此升之半，作一劑，而分三次服之，亦理之所有，無足怪也。今廢而不用久矣，故人皆不知有此，謂卽當今升斗之升，所以駭其用之不當，而曰中古方不可治今病也，宜哉。○辨誤

條辨及尚論皆作傷寒五六日，中謂王叔白中風五六日，傷寒往來寒熱，卽是或中風或傷寒，非是傷寒再中風，中風復傷寒也。卽仲景所謂傷寒中風，有柴胡證，但見二證便是，正或中風或傷寒，五六日之後，心煩作煩心，心下作心中，身有作外其說頗合于理。當從之。方氏云：脉經作中風，往來寒熱，傷寒五六日之後，心煩作煩心，心下作心中，身有作外有，雖傳寫之不同，其實非三義也。

## 傷寒中風，有柴胡證，但見二證便是，不必悉具。

(三) 前

條備言少陽經之諸見證，然未必諸證悉備，恐後人必以諸證全見者，方爲少陽病，故又立此條以申明上文。

使但

或胸中煩或渴或腹中痛等諸或有或無之義也傷寒  
中風者或傷寒或中風也言傷寒中風證中凡見少陽  
證卽爲柴胡湯證卽便但見二證便是邪氣已入少陽  
不必如上文之諸證悉具也如但見少陽本經證正宜  
以小柴胡湯主之若有他經兼證者仍當以小柴胡爲  
主而兼用他經藥治之如已見柴胡證而有太陽證未  
罷者卽以小柴胡加桂枝湯主之如少陽未解而陽明  
之裏邪已急則用小柴胡去參甘增入大黃爲太柴胡  
湯以兩解之矣又如少陽誤治而爲壞病則有柴胡加  
芒硝湯及柴胡桂枝乾姜湯柴胡龍骨牡蠣湯等方皆  
一小柴胡湯之變制也蓋以每見少陽一證卽以小柴  
胡主治故稱柴胡證也舊本柴胡湯諸加減方皆雜入  
太陽篇中今悉收置少陽篇內以小柴胡爲主方而總  
統之而以諸方隸其下俾學者循其序而施治焉庶或  
可以希仲景之意稍得其  
得中一二未可知也

傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者  
小柴胡湯主之

(四五日三陽傳遍之後也身熱惡風項強皆太陽表證也脇下滿邪)

傳少陽也手足溫而渴知其邪未入陰也以太陽表證言之似當汗解然腸下已滿是邪氣已入少陽仲景原云傷寒中風有柴胡證但見二證便是不必悉具故雖有太陽未罷之證汗之則犯禁例故仍以小柴胡湯主之但小柴胡湯當從加減例用之太陽表證未除宜去入參加桂枝、芍藥下滿當加牡蠣渴則去半夏加桔梗根爲是

傷寒陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛者先用小建中湯

不差者與小柴胡湯主之

(五)

陽主表陰主裏弦主肝邪勁急濇爲營血留滯

故弦屬肝邪濇爲陰脉也寒在半表衛氣不行營血不貫則脉不流利而澀邪入少陽肝木氣旺脈來勁急則弦陽脉濇者蓋輕取其浮候則濇也陰脉弦者重按其沈候則弦也陽脉濇則知營衛不和氣血濇滯而邪在半表陰脉弦則知邪氣半已入裏木旺乘土太陰受病矣太陰脾土爲肝邪所犯故腹中急痛也腹中者足太陰之脉起于足大指之端上膝股內前廉入腹屬脾絡胃故腹爲太陰之部位也急痛者厥陰肝木勁急之陰

邪傷脾也。藏氣法時論云。肝苦急。急食甘以緩之。又云。  
脾欲緩急食甘以緩之。故先用小建中湯之甘以緩肝  
脾之急。而建立中氣也。中氣已旺。肝邪當退矣。若猶不  
差者。是少陽之邪猶未解也。仍與小柴胡湯主之。以和  
解其邪。但恐腹中急痛。其中氣必寒。成氏  
去黃芩加芍藥之外。或姜桂可加入也。

(文)  
傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。口不欲食。  
大便硬。脉細者。此爲陽微結。必有表復有裏也。脉沈亦  
在裏也。此句應下之脉雖沈緊 汗出爲陽微。假令純陰結。不復有  
外證。悉入在裏。此爲半在裏。半在外也。脉雖沈緊。不得  
爲少陰病。所以然者。陰不得有汗。今頭汗出。故知非少  
陰也。可與小柴胡湯。設不了了者。得屎而解。六 此條非但

別少陽少陰之疑似。推而廣之。實六經辨別陰陽之精義也。五六日邪氣入裏之候也。頭汗出邪在陽經也。惡