

弗雅內編

009

4742.



串雅內編卷三

頂藥

巴霜頂

丹溪喉閉丸

治纏喉風喉閉先胸膈氣緊驀然咽喉腫

痛手足厥冷氣不能通頃刻不治

雄黃

一錢

鬱金

五分

巴豆

七粒去殼皮

冰片

麝香

各少許

爲末

醋糊爲丸如麻子大清茶下五分口噤喉塞用竹管納藥

入喉中須臾吐痰立解未吐再服

四寶頂

狗藥丸

丁丹崖祖師傳治噎膈翻胃

硫黃

水銀

各一錢同炒成金色

狗寶

三錢爲末

雞卵

一枚去白留黃

和勻紙封



錢塘趙學敏想軒纂



中醫藥大學圖書館藏

泥固煆火煨半日取出研細每服五分燒酒調下不過三

服效驗

熱灰謂之煆煨

牛郎頂

牛郎丸

治氣築奔衝不可忍兼追蟲取積亦消水腫

黑牽牛

五錢炒

檳榔

二錢五分

爲末每服一錢紫蘇湯送下蟲積

及水腫用酒下

青綠頂

治頑痰不化

石膏

一兩

石綠

五錢

並水飛爲末麴糊丸菴豆大溫湯下

十丸吐去痰一二碗不損人

又方

風痰卒中用生絲

二兩

乳細水飛去石慢火熬乾取辰日



辰時辰位修合再研入麝香

一分糯米粉糊丸彈子大陰

乾每丸作二服卒中薄荷酒研下餘風硃砂酒化下

吐

青涎瀉下惡物大效小兒用銅綠研細醋麪糊丸芡實大

每服薄荷酒化下一丸須臾吐痰如膠神效

硫黃頂 治腰痛如神

黑丑半生半炒取頭末水和丸梧桐子大硫黃爲衣空心

鹽酒送下五十丸

玉環來笑丹 治疝氣癰腫並諸氣腫痛

荔枝核

四十粒

陳皮

連白九錢

硫黃

四錢

爲末鹽水打麪糊丸棗

豆大痛時空心酒服九丸良久再服不過三服神效



黑鹽丸

鹽

一升納入粗瓷瓶中實築泥頭初以塘火燒漸漸加炭火勿令瓶破候赤徹鹽如水汁即去火待凝破瓶取出

豉

一升熬煎桃仁一兩和巴豆二兩去心壓紙中令油出

四物搗勻入蜜丸桐子大每服三丸平旦時服天行時氣

豉汁及茶送下心痛酒送下入口便止血痢米飲下初變

水痢後便止鬼瘧茶飲下骨蒸蜜湯下凡服藥後吐利勿

怪吐利若多服黃連汁止之或遇殺藥人藥久不動者更

服一兩丸服後忌口三二日其藥臘月合之瓷瓶密封勿

令泄氣一劑可救百人或在道途村落無藥可求但用此

藥即敵大黃朴硝數兩曾用有效小兒女子不可服被攪



作也

輕粉頂 治小兒涎喘

無雄雞子一箇取清入輕粉一分拌和銀器盛置湯瓶上蒸熟三歲兒食盡當吐痰或泄而愈實者乃不用

羊莢頂 治骨蒸傳尸

羊肉一拳大煮熟另用皂莢一箇炙以無灰酒二升銅鐺內煮三五沸去渣入黑鉛一兩令病人先啜肉汁乃服一合當吐蟲如馬尾爲效

截瘡頂 治三日大瘡

活大烏龜一箇連殼左右肩上各鑽一孔近尾處亦鑽一

孔以明雄黃九錢研細每孔糝入三錢外以瓷器黃泥包
固勿令泄氣炭火上煨存性研細每服準一錢空心陳酒
送下二三服卽止

又方

陳香櫟一枚去頂皮大者加明雄黃三錢中者二錢小者
一錢研細糝入香櫟內炭火中煨存性再研極細末每服
七分用腐衣分作六七包乾咽下此日不可飲湯水任其
嘔去頑痰卽愈

三奇頂 治小兒天哮神效

經霜天燭子

蠟梅花

各三錢

水蛭

一條俱預收

水煎服一劑



南京中医药大学图书馆藏

一卽愈

金線頂 凡一切要吐痰涎之症用代瓜蒂最妙

金線重樓

俗名金線吊蝦蟇
米得去外黑皮

用石槌打碎勿犯鐵器晒乾

爲末小瓷瓶收貯用之治風痰結胸取一錢陰陽水和服

吐去痰卽愈傷食成瘧臨發時空心水和服一錢卽愈噤

口痢疾涼水和服一錢卽愈

砒霜頂 治哮喘三年後可用

精豬肉

三十兩

切作骰子塊信石

一兩

研細末拌在肉上令

勻用紙筋黃泥包之候乾白炭火於無人處煨青烟出盡
爲度研細以湯浸蒸餅丸如菉豆大食前茶湯送下大人



二十丸小兒四五丸量虛實與之

又方 齁喘痰積凡天雨便發坐卧不得飲食不進乃肺竅

久積冷痰遇陰氣觸動則發也用此一服即愈服至七八

次即出惡痰數升藥性亦隨而出即斷根矣

江西淡豆豉 一兩 蒸搗如泥入砒末 一錢 枯礬 三錢 九棗

豆大每用冷茶冷水送下七丸甚者九丸小兒五丸即高

枕仰卧忌食熱物等

卑礬頂

稀涎散

凡人卒然中風昏昏如醉形體不收或倒或

不倒或口角流涎俄頃不治便成大病此證風涎潮於上

胸脾氣不通用此吐之



皂角末

一兩

生礬末

膩粉

各五錢

水調下二錢過咽卽吐

涎用礬者隔下涎也

碧霞丹

凡中風痰厥癰癩驚風痰涎上壅牙關緊閉

上視

搐搦並宜主之

烏頭尖

附子尖

全蝎稍

各七錢

石綠

研幾度飛過十兩

爲細末

麪糊丸芡實大每用一丸薄荷汁半盞化下更服溫酒半

合須臾吐出痰涎爲妙小兒驚癰加白僵蠶等分

吐蠱

人頭面上有光他人手近之如火熾者此中蠱也

蒜汁

半兩

和酒服之當吐出如蛇

瓜蒂散

治痰涎頭目濕氣皮膚水疸濕熱諸症



XINING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE
中醫藥大學圖書館

瓜蒂

赤小豆

各二錢五分

炒黃爲末每用一錢以香豉一合

熱湯七合煮糜去渣和服少少加之快吐乃止

又方

風癰喉風咳嗽及遍身風疹急中涎潮等症不拘

小此藥不大吐逆只出涎水

瓜蒂爲末壯年服一錢老少減半早晨井水下食頃含

沙糖一塊良久涎如水出年深者出黑涎有塊布水上也

涎盡食粥一兩日如吐多人困甚取麝香泡湯一盞飲之

卽止

凡宜吐之症必須看痰吐在壁上有亮光者放心吐之餘則皆忌光亮者如蝸牛之涎一樣光亮也但看

見光亮者無論其痰上中下皆宜吐之此光亮之色必須俟其痰跡乾而分辨之不可據其濕痰時而卽以爲光亮也



162
Xiangyin University of Chinese Medicine
中醫藥大學圖書館藏

倒頑痰法 治痰結胃中不能吐出狂言如見鬼狀時發時

止氣塞胸膈

牛肉五斤水二斗煎湯飲之至不可食而止以鷲翎探吐

必吐至黃色頑痰而止前病頓失後以陳皮茯苓甘草白

朮湯徐徐飲之平復如故

陰陽湯 治凡在上焦欲吐而不能吐者

滾水涼水各一碗均之加炒鹽一撮打百餘下起泡飲之

立吐而愈

串藥

牛郎串

遇仙丹

治邪熱上攻痰涎壅滯翻胃吐食十膈五噎

齠哈酒積蟲積血積氣塊諸般痞積瘡熱腫痛或大小便

不利婦人女子面色痿黃鬼產癥瘕食吞銅鐵銀物患

治之五更冷茶送下三錢天明可看去後之物此藥有疾

去疾有蟲去蟲不傷元氣臟腑小兒減半孕婦忌服

白牽牛頭末

四兩五錢
半生半炒

白檳榔

一兩

茵陳

蓬朮

醋煮

三

稜

同

牙皁

去皮炙
各五錢

右其爲末醋糊爲丸如葉豆大依前數

服行後隨以溫粥補之忌食他物

椰霜串

必勝
散

治遠年近日大麻風症癩瘡三服卽愈

大黃

白牽牛

檳榔

各五錢

粉霜

五分

各爲細末分作三

服用生薑

四兩

絞汁入沙糖半盞水調勻於晚臨睡腹中

稍空卧牀上服之至三更遍身手足俱麻木如針刺頭目
齒縫俱痛此藥尋病之功取下二便或青或白或黑或黃
或紅蟲之類此乃病根也二十日內服三次漸痊眉
髮俱生肌膚如舊或齒縫出血漱齒藥列於後

漱齒藥

貫仲

黃連

各五錢

爲末用水一鍾煎四五沸入冰片少許

攪勻漱口每日一服煎漱忌動風油膩之物一月愈

黃甲串

偷刀散

治橫痃便毒未成者內消已成者膿從大便

下

生大黃

穿山甲

煨存性

白芷

各二錢

爲末每服三錢空心酒

送下

巴豆串 治痢疾

蒼朮

取堅白者米泔水浸一宿去毛皮

厚朴

薑汁炒

陳皮

各十兩

蓬朮

歸身

各六兩

枳殼

木通

各八兩

土黃連

一兩

木香

天竺

黃

各五錢

用陳米一斗

入巴豆

四百九十粒

同炒

黃色爲度

去巴

豆不用其前藥爲末和勻每服一錢或二錢三錢視病之

輕重空心午後晚每日三服紅色甘草湯下白色薑湯下

紅白相兼甘草薑湯下水瀉米湯下氣滯木香湯下噤口

人參白朮湯下忌生冷油膩滑腸之物茶水並忌之

無極丸 治男女諸病婦人經血不通赤白帶下崩漏不止



腸風下血五淋產後積血癥瘕腹痛男子五勞七傷小兒
骨蒸潮熱其效如神宜六癸日合

大黃一斤作四分一分用童便一碗入食鹽二錢浸
切晒一分用醕酒一碗浸一日切晒再以巴豆仁三十五
粒同炒豆黃去豆不用一分用紅花四兩泡水一碗浸一
日切晒一分用當歸四兩入淡醋一碗浸一日去當歸切
晒其爲末煉蜜丸桐子大每服五十丸空心溫酒下取下
惡物爲驗未下再服

備急丸 治心腹諸疾卒暴百病

大黃 巴豆

乾薑

各一兩

搗篩煉蜜搗和丸小豆大每服

三九凡中客忤心腹脹滿痛如鑽刺氣急口噤卒死以暖水或酒服之或灌之未知更服三九腹中鳴轉以吐下便愈若口已噤者灌下即瘥

烏龍串

一粒金丹又名捉虎丹

專治風寒暑濕脚氣不問遠年近日

一切走注疼痛不可忍臨發時空心服一丸趕到足面上赤腫痛不散再服一丸趕至脚心出黑汗乃除根如病在上食後臨卧酒送下自然汗出定痛爲驗中風癱瘓麻痺不仁手足不能屈伸偏枯酒下二丸初中風不省人事牙關不開研一丸酒調灌下亦驗

草烏

去皮臍

地龍

去土淨

木鼈子

去油

五靈脂

白膠香

研各一兩五錢

