

頭痛

鬚髮

面病

耳病

鼻病

口舌

牙齒

眼目

咽喉

結核

梅核

癭瘤

心痛

腹痛

腰痛

脅痛

臂痛

癰疽

腳氣

痿躄

痺痛

消渴

古今醫鑑

範

新刻增補古今醫鑑卷之五

鮑集

太醫院醫官金谿龔

信編

男廷賢續編

書林蘊古堂金元聲重刊行

頭痛

脉頭痛陽強浮風繁寒風熱洪數溫細而堅氣虛頭痛雖茲必瀆痰厥頭痛腎
厥堅實又曰頭痛短瀆應瀕死浮滑風痰必易除寸心緊急或短或浮或弦
皆主頭痛

病東垣曰東風生于春病在肝俞在項頸故春氣者病在頭又諸陽會於頭面
如手足太陽膀胱之脉起于目內眦上額交巔之上入絡腦還出別下病衝
頭痛又足少陽膽之脉起於目銳眦上抵頭角病則頭角額痛夫風從上受
之風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府

調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病在耳過在手巨陽少陰乃溫熱頭痛也如氣上不下頭痛顛疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒溫頭痛也如頭半寒痛者先取手少陽陽明後取足少陽陽明也偏頭痛也有真頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節死不治有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓者頭腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛凡頭痛者皆以爲風治之者總其大體而言之也高顛之上惟風可到故味之薄者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異

治故太陽頭痛惡風脈緊川芎羌活獨活麻黃之類爲主少陽經頭痛脈弦細往來寒熱柴胡爲主陽明頭痛自汗發熱惡寒脈浮緩長寒者升麻乾葛白芷石膏爲主太陰頭痛必有痰飲重或腹滿爲痰癖其脈沉緩蒼朮半夏南星爲主少陰頭痛三陰三陽經不流行而足寒氣逆爲寒厥其脈沉細麻

黃細辛附子爲主厥陰頭項痛或吐痰沫厥冷其脉浮緩吳茱萸湯主之血
虛頭痛當歸川芎爲主氣虛頭痛黃芪人參爲主氣血俱虛頭痛調中益氣
湯少加川芎細辛蔓荊子其效如神白朮半夏麻湯治痰厥頭痛藥也羌
活附子湯治厥陰頭痛藥也如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治先師
嘗病頭痛發時兩頰青黃眩暈眼不欲開懶言身體沉重兀兀欲吐潔古曰
此厥陰太陰合病名曰風痰以局方玉壺丸治之更灸俠谿穴卽愈

丹溪云多主於痰其痛甚者火多諸經氣滯亦能頭痛勞役下虛之人似傷寒
發熱汗出而太陽作痛此相火自下衝上宜補中益氣多加川芎當歸甚者
加知母蔓荊子又曰自魚尾上攻而痛屬血虛川芎當歸酒黃柏

偏頭風在右屬痰屬熱痰用蒼朮半夏熱用酒片苓在左屬風屬血虛風用荆
芥薄荷虛用芎歸芍藥酒黃柏

節齋云久病頭痛覺感風寒便發寒月須重綿厚帕包裹者此屬鬱熱而標寒

世人不識悉用溫辛散之藥暫時得效候認爲寒殊不知因其本有鬱熱毛竅常踈故風易入外寒束其內熱閉逆而爲痛辛熱之藥雖能開通閉逆散其標之寒邪然以熱濟熱病本益深惡寒愈甚矣惟當瀉火涼血而佐以辛溫散表之劑以從法治之則病可愈而根可除也

方

春用香蘇散加川芎白芷羌活

應圓秘傳

夏用五苓散加香薷厚朴扁豆羌活

秋用金沸草散加桔梗石膏防風羌活

冬用十神湯加羌活

○按右方治頭風隨時倍加真羚羊角服之如神

川芎茶調散

治諸風土攻頭目昏沉偏正頭真塞聲重壅寒壯熱肢體煩

一肌肉懦動膈熱痰盛婦人血攻注太陽穴痛但感風寒皆效

南薄荷

四錢

香附米

四錢

荊芥穗

川芎

各二錢

羌活

甘草炙各一錢

防風七錢半

白芷一錢

右爲細末每服二錢食後清茶調下薑蔥煎服亦可○一方加菊花一錢細辛五分蠶三分蟬退三分名菊花茶調散

○按右方治風氣頭痛之劑

白朮半夏天麻湯

治痰厥頭痛其證眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘

無力以言心神顛倒目不敢開如在風雲中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安臥此乃胃氣虛損停痰而致也

黃芪三錢半

人參三錢半

白朮五錢

白茯苓三錢半

陳皮七分半

神麴炒五分

麥芽炒七分半

乾薑炒黑三分

黃柏一分半

澤瀉二分半

天麻三分半

半夏湯泡姜汁七分半

蒼朮米泔浸炒三分半

右剉一劑生薑三片水煎服食前熱服可一劑而愈

○按右方治風氣頭痛之劑

當歸補血湯

治血虛頭痛

當歸

生地黃

川芎

白芍各一錢

防風五分

荆芥四分

藥本四分

黃芩酒炒一分

柴胡五分

蔓荊子五分

右剉水煎服

○按右方治血虛頭痛之劑

補中益氣湯

治氣虛頭痛

方見內傷寒門依本方加川芎白芷細辛蔓荊子

○按右方治氣虛頭痛之劑

調中益氣湯

治氣血俱虛頭痛其效如神

陳皮

黃柏酒炒各三分

升麻

柴胡各四分

人參

炙甘草各六分

黃芪二錢

川芎六分

蔓荊子三分

細辛三分

右剉作一服水二鍾煎至一鍾去渣溫服一方有木香二分無黃柏如大便

虛坐不得或下而不了腹中逼迫此血虛血溢也加當歸身五分

○按右方治氣血而虛頭痛之劑

芎芷散

治遠年近日偏正頭風疼痛難忍諸藥不效收功如神

川芎三錢

白芷三錢

右為末黃牛腦子一箇擦藥在上磁器內加酒煑熟棄熱和酒食之重者一醉睡後酒醒其疾如失

都梁花

治偏正頭風一切頭痛

香白芷

二兩切碎晒乾

右為細末煉蜜為丸如龍眼大每服二三丸食後細嚼茶清下

○按右方專治之劑

養血祛風湯

秘方

治婦人頭風十居其半每發必掉眩如立舟車之上蓋

因肝血虛損風邪乘虛而襲之耳

當歸

川芎

生地黃

防風

荊芥

細辛

藁本

石膏

蔓荊子

半夏

旋覆花

甘草

一方加羌活

右劉薑惠煎食後服

加減芎辛湯秘方

治頭風攻目

川芎

白芷

石膏

稿本

細辛

皂角

羌活

防風

荊芥

桔梗

蔓荊子

菊花

薄荷

甘草

右劉水煎食後服

選奇方

治眉稜骨痛屬風熱與痰痛不可忍者

羌活

防風各三錢

甘草

一錢夏生冬炙用

酒片苓

一錢半冬不用甚者冬亦炒用

右劉水煎食後服一法加半夏姜製三錢

回首散

治頭項強急筋痛或枕枕轉項不得者

用烏藥順氣散方見中風門加羌活獨活木瓜

鬚髮

醫者所謂人鬚髮眉雖皆毛類而所生五臟各異故有老而鬚白眉髮不自者或髮白而鬚眉不白者臟氣有所偏故也大率髮屬心稟火氣故上生鬚屬腎稟水氣故下生眉屬肝稟木氣故側生男子腎氣外行上為鬚下為髮故女子宜入無勢則亦無鬚而眉髮無異於男子則知不屬腎也明矣

天下烏鬚第一方

高閣老傳

五倍子

不拘多少隨碎去灰

砂鍋內炒盡烟為度以青布

烏黑霜即炒

細麵

四兩當歸尾一兩為末

白及紅銅末

不拘多少火內燒極紅投入水

末

一兩三味攪勻每用一分

半白及紅銅末

不拘多少火內燒極紅投入水

然之末用水洗淨將好醋煮

至乾隨炒黑色所用每用一分

明礬末一分

青鹽一分

訶子

二厘半二味俱用

炒至焦乾

沒石子

二厘

右用細茶調如糊磁器內重湯煮洗淨擦乾了洗去

京師秘傳烏鬚方

五倍子

製法如前

紅銅末

製法如前

食鹽二分

明礬末 六分

白灰麪 一分

右合火酒調擦無酒濃茶亦可調勻以酒盞盛貯用鐵杓注水煮至如糖香鏡臉方可取用先將皂角水

洗淨鬚髮然後塗藥包裹一夜次早洗去即黑如鬚少只用半帳

○按右方外染烏鬚藥

旱蓮草 馬翰林傳

烏鬚髮神方

旱蓮草十六斤在六月下

十月七月上半月採十六斤不許水洗挑乾取汁

對日晒過五日不住手攪

午時方好真生薑汁一斤蜜一斤和汁同前晒

揅攪至數日似稀糖成膏

確收藏每日空心用無灰好酒一鍾藥一匙服

午後又服至二十一日將

鬚髮拔去即長出黑鬚黑髮

神仙黑雲丹 吳待卽傳

髮黑髮返老還童壯筋骨補真精固元陽神效

無比

何首烏

半斤入破鍋內以黑豆同蒸

十日去

破故紙

酒洗一斤炒

旱蓮汁

二兩如無汁旱蓮葉末亦可

槐角子

二兩為末

桐淚

郎水律為末二兩

右其一處為細末棗肉二斤核棗仁半

其一處搗為丸如梧子大每五十

九空心鹽湯下服三箇月勿斷一日

皇蓮丸

王吏目傳

烏鬚髮服一月

曰若退再生者黑其效如神士大

夫不可一日無此藥

旱蓮汁

晒半斤

生薑

三斤取汁

生地

二斤酒泡去

細辛

一兩

破故紙

一兩晒半斤

五加皮

酒浸半斤

赤茯苓

乳汁浸半斤

杜仲

半斤炒

枸杞子

四兩

川芎

四片

沒石

二兩

右為細末核棗仁去皮半斤棗肉同和為丸

如梧桐子大每服五十丸黃酒

送下

五前膏

刻太府傳

烏鬚髮固牙齒壯筋

旱蓮草

黑桑椹

何首烏

生地黃

白茯苓

右五味各自為咀片煎汁濾淨渣熬成膏合

一處和勻置磁器內封固埋上

七日每服二三匙一日三服

一醉不老丹

劉念憲傳

專養血化痰烏鬚

鬚髮男女皆可服

蓮花蕊

生地黃

槐角子

五加皮

各三兩

沒石子

六個三陰三陽

右將藥用木石柏搗碎以生絹袋盛藥同無意酒十斤入不滲罈內春冬浸一月秋二十日夏十日緊封罈口浸滿日任意服之以醉為度須連日服盡久則恐味變也酒盡而鬚髮白者自黑若未黑再製服不過二三次神効

○按右方內服烏鬚之劑

蒲公散

劉小亭傳

烏鬚生髮

蒲公英

淨同兩炒

血餘

洗淨四兩

青蘊

四兩

右用磁罐一個盛蒲公英一層血餘一層青蘊

層蘊泥封固淹春秋五日

夏三
日冬七日
桑柴火煨
出礬為末每服一錢
清晨酒

調服

巨仙丸
賈開客傳

治頭髮脫落神效

側柏葉
八兩
焙乾

當歸
全
身
四兩

共石
鐵器為末水糊為丸
梧桐子大每服五七十丸
早晚各一服黃酒鹽湯

任下

生頭髮方

大附子一個
要二兩重者佳為末用烏骨黑肥雞一隻
取其油攪藥末擦頭
其髮即生

面病

病難經曰人面獨能耐寒者何也蓋人頭者
頭陽之會也諸陰脉皆至頭胸中而還
獨諸陽脉皆上至頭故令面耐寒也
一云手足六陽之經雖皆上至頭

而足陽明胃之經起鼻交頰中入齒中俠口環唇倚頰車上耳前過客主人穴其或胃中風熱或風熱乘之令人面腫面鼻色紫風刺癰疹或面熱而寒隨其經證而治之

升麻黃連湯

治面熱

升麻一錢

葛根一錢

白芍七分

川芎四分

白芷一分 薄荷三分

荆芥三分

蒼朮八分

黃連五分

黃芩六分

犀角四分 甘草五分

右剉一服水煎食後服

升麻白芷湯

治面唇紫黑乃陽明經氣不足也

升麻一錢

葛根一錢

芍藥三分

防風一錢

白芷一錢

黃芪七分

人參七分

甘草四分

蒼朮三分

右剉一劑薑棗煎服宜早飯後午而取大氣上升于中使陽易達于面也

連翹散

治面生穀疳俗名粉刺

連翹 川芎 白芷 黃連 苦參 荆芥

甘草 桑白皮 山梔子 貝母 右剉水煎食後臨臥服

清上防風湯 清上焦火治頭面生瘡 癰風熱毒

防風 一錢 荆芥 五分 連翹 八分 梔子 五分 黃芩 七分 炒黃連 五分

薄荷 五分 川芎 八分 白芷 八分 枳殼 八分 甘草 三分

右剉一劑水煎食後服人竹瀝尤效

薑黃丸 治頭面腫大疼痛并喉痺

姜黃 一兩 大黃 三兩 為末姜汁丸如彈子大每服一九井水入蜜少

許研徐徐食後呷服

苦參丸 治肺風皮膚瘙癢或癰疥癬有 人病遍身風熱細癰痒痛不可

忍者連胸脛臍腹及近隱處皆然涎痰亦多 夜不得睡

苦參 一斤 川皂角 去皮 以水一斗 浸燥去濃汁攪去渣熬成膏和

丸如梧桐子大每服三十丸荆芥薄荷酒下

惟酒下亦可

麥門冬膏

黃瀆江傳

治面上肺風瘡

麥門冬

去心一斤

橘紅去白絲西兩

右用水煎汁熬成膏入蜜一兩再熬成入水中一夜去火毒每服五匙滾水

化開食後服夜將後春容散擦之

○按右方治面病內服之劑

春容散

黃瀆江傳

白附子 六錢

枯礬 三錢 硫黃 五錢

黑

石炒枯輕粉一兩

黃丹 飛過一錢

蜜陀僧 二兩

白二錢

右爲末先將冷水擦紅處濕後以末藥擦之

可擦破忌酒色惱怒

玉容散

治面生黧黯或生小瘡或生瘰癧

粉刺之類併皮膚瘙癢能去

垢膩