

海陵叢刻
第十五種
陸完泉醫書



傷寒證治賦

養三軒學人陸儋辰編

下篇

傷寒分經經有主證傷寒類證證亦多門巨陽熱發於營
衛故翕翕陽明熱發於肌肉故蒸蒸半表半裏於腠理兮
乃作時開時合因寒熱兮互乘脾爲胃府行液熱於手足
可徵故太陰中風四肢煩痛而太陰傷寒手足自溫惟少
陰有表熱多足冷而脈沉謂爲封藏之司或七八日來而
膀胱熱熾謂爲坎陽無蔽或風寒始受而脈浮熱薰兩陰
交盡一陽初生熱厥多少分以陽進陽退熱厥相等知其
陰停陽停



日晡發爲潮熱未申旺屬陽明承氣湯用於大便鞭小柴

胡治夫表未清

發熱惡寒爲陽無熱惡寒爲陰

柯琴曰六經皆有惡寒而太陽應寒水之化惡寒特甚與陽明之二日自

止少陽之往來寒熱三陰之內惡寒者異矣○少陰無熱惡寒四逆湯

既汗之後而見惡寒補虛芍附

芍藥甘草湯

具下之證而微惡

寒解表葛根

湯

少陰口

和背惡寒用附子湯兼治骨節煩

疼與夫身痛肢冷

陰證亦少

陽明潮熱背惡寒柴胡入桂

柴胡桂枝湯

加腹痛承氣小劑加煩渴白虎人參惡風無汗發汗有汗

解肌汗後不解表裏俱熱煩渴而惡風者白虎加參可用

汗出過多溺澀肢攣亡陽而惡風者桂枝附子

桂枝加附子湯

爲



宜身疼惡風

風濕相搏惡風身疼小便不利

甘草附子

湯

身重惡風防已黃

芪湯

無汗邪或在表邪或裏行或為陽虛難作或為水飲內停

太陽無汗為表實加煩躁兮青龍用夫大製陽明無汗欲

飲水無表證者白虎加以人薤薤或作薤藎俗書作參少陰脈沉乾熱

麻黃附子細辛湯若但厥無汗而強發斯下厥上竭而命

坑少陰但厥無汗強發之必動其血或從口鼻出或從目出名曰下厥上竭必死

太陽自汗為風傷衛氣宜桂枝解肌若多汗用黃芪建中

則表虛元府不閉陽明自汗而小便不利宜承氣急下為津

液竭也若大汗用人參四逆湯加桂枝芪朮乃吐逆厥冷身痛脈沉

三陽合病目合則汗者胆有熱也柴胡小柴胡湯陽明潮熱脈浮盜

汗者黃芩蓋雜病盜汗主陰虛之說而傷寒盜汗半表裏之因

頭上汗出邪搏陽經

三陰無汗

血證頭汗額多屬心部者求

甘四物

紅花白朮甘草

熱瘀頭汗劑頸

湯身必發黃

屬陽明者

茵陳五苓

散

陽明下後懊憹頭汗者梔子豉

湯

關格不通

不尿頭汗者死爲隣濕家下之額汗小便不利相仍或下利而不止均大命之必傾

傷寒邪熱聚於胃遂津液旁達也大便已鞭而手足汗或兼譫渴兮大承氣爲主治陽明中寒不能食是穀水不化也小便不利而手足汗欲作痼瘕兮理中湯却可憑

三陽固有頭痛



巔頂腦後痛者太陽也頭額痛者陽明也頭角痛者少陽也

厥陰脈却會巔乃風溫

病在少陰

與濕溫

病在太陰

亦爾且陰毒及

兩感皆然

太陽少陰兩感頭痛

此由於痰氣之逆壅而上難拘乎陰脈

之至頸而旋

太陰頭痛氣逆有痰也二陳加枳實川芎細辛少陰頭痛足寒而氣逆麻

黃附子細辛湯

身痛非一六經宜分風在三陽者脈浮寒在三陰者脈沉

然太陽汗後身疼亦有沉遲之脈斯營分血虛邪戀宜新

加輔正之參

桂枝新加人參湯

陰毒身疼宛如被杖中濕身痛重

若不勝

咽痛少陰之證

六經皆無咽痛惟少陰篇中有咽傷咽痛之證

汗下皆誣通用甘桔陰陽不拘陰陽脈緊汗主於無有汗

亡陽咽痛猪膚湯

陽毒口瘡咽痛升麻六物咬咀

即升麻
鼈甲湯

胸滿多帶表證脇滿多帶少陽胸滿而氣上冲喉吐寒痰
以甜瓜蒂散脇滿而脈見沉緊平乾嘔以小柴胡湯或用

十棗

湯

治裏氣不和或用理中

湯去參朮
加香附

治生冷所傷

太陽下利嘔逆汗出頭痛胸脇鞭滿不惡寒表解裏未和也十棗湯胸脇

腹痛滿唇青厥冷脈沉細此生冷傷脾理中湯去參朮加香附

病發於陰而反下之因作痞病發於陽而反下之因結胸

李士材曰成註云無熱惡寒發於陰誤矣無熱惡寒是爲陰證豈有誤下

之理又豈止作痞而已哉仲景所謂陰陽指表裏而言在表當汗而反下



之因結胸病雖在裏尙未入府而輒下之因痞也結胸有大小寒熱水血
食痰入者而痞則所傳猶淺但一味氣凝耳若未經下者不名結胸或痰
或食或熱隨證治之

治痞者瀉心

湯

有五寒熱各異散結者求本有八處療不

同小則得按乃切刺大則不按亦攻衝

大小陷胸湯隨證用之

煩渴便

閉爲熱黃連大陷

熱結胸者大陷胸湯加黃連

不渴溺清爲寒枳實理中

湯

氣口脈大爲食結

胸加枳實厚朴

喘嗽脈滑爲痰壅

黃連半夏生薑湯加

實枳犀角地黃治血結

胸

其證小便利而大便黑且喜忘狂

而漱水半夏茯苓

湯

治水結

胸

其證無大熱而有水聲且

頭微汗而怔忡病兼斑狂

斑黃

者險脈見沉小者凶

主結

胸證已備具煩躁甚亦罔功

亦主死

痞在心下與結胸殊結

按嘔痛痞按或濡半夏甘草生薑分以三陽主治

柯琴曰太陽用生薑瀉心湯以未經誤下而心下痞嘔雖汗出表解水氣未散故君生薑以散之仍不離太陽爲開之義陽明用甘草瀉心湯者兩番誤下胃中空虛其痞益甚故倍甘草以建中而緩客氣之上逆從乎中治之法也少陽用半夏瀉心者以誤下成痞邪既不在表則柴胡湯不中與之又未全入裏則黃芩湯亦不中與之矣胸脇苦滿與心下痞滿皆半表裏證也倍半夏而去生薑稍變柴胡半表之治推重少陽半裏之意耳君火以明相火以位故仍名瀉心亦以佐柴胡之不及也○生薑瀉心湯即小柴胡去柴胡加黃連乾薑

大黃黃連附子辯有柯氏來蘇

本文云心下痞按之濡其脈關上浮者大黃黃連瀉心湯主之又云心下

痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之柯琴曰大黃黃連瀉心湯獨任二
味苦寒下泄之品且用麻沸湯漬絞濃汁而生用之利於急下如此而不
言及熱結當攻諸證夫按之濡爲氣痞是無形也則不當下且結胸證脈
浮大者不可下豈心下痞而關上浮者反可下乎小結胸按之痛者尙不
用大黃此比陷胸湯更峻是必有當急下之證比結胸更甚者故製此峻
攻之劑也學者勿以斷簡殘文尊爲聖經曲護其說以遺禍後人也又曰
心下痞而復惡寒者表未解也當先解表宜桂枝加附子而反用大黃何
也旣加附子復用芩連抑又何也若汗出爲胃實則不當用附子若汗出
爲亡陽又烏用芩連乎許學士云但師仲景意不取仲景方蓋謂此耳
誤下成痞表證未罷者或柴胡合乎枳桔湯傷寒支結外
證未去者桂芍加入柴胡

卽柴胡桂枝湯○補註柯琴曰人身外爲陽內爲陰發陰發陽俱指發熱不可以發陰作無熱解若梔子豉之心中懊懣瓜蒂散之心中溫溫欲吐與心下滿而煩黃連湯之胸中有熱皆是病發於陰結胸者從心下至小腹按之石硬而痛不可近爲大結胸正在心下未及脇腹按之則痛未曾石鞭者爲小結胸大結胸是水結在胸腹故脈沉緊小結胸是痰結於心下故脈浮滑水結宜下故用甘遂葶杏硝黃大陷胸湯丸下之痰結可消故用黃連栝蒌半夏小陷胸湯消之心下痞鞭不痛按之濡者此爲痞太陽之上寒氣主之中見少陰少陰者心也心爲陽中之太陽寒熱交爭於心下變證蜂起君主危矣治以瀉心亦止戈爲武之義也

藏結之證狀如結胸過下冷積不能流通寸浮關沉與結胸同沉小細緊更困中宮時時下利飲食能容舌白苔滑



君主塵蒙

本文云按之痛寸脈浮關脈沉名曰結胸也如結胸狀飲食如故時時下利寸脈浮關脈小細沉緊名曰藏結舌上白苔滑者難治○如結胸狀而非結胸者結胸不能食不下利舌上燥而渴按之痛脈雖沉緊而實大此則結在無形之氣分五藏不通故曰藏結五藏以心爲主舌爲心之外候舌上白苔滑是水來尅火心火幾於熄矣故難治

藏結無陽慎不可攻穴灸關元四逆理中

本文云藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上苔滑者不可攻也○藏結是積漸凝結而爲陰五藏之陽已竭雖有鞭滿之證慎不可攻理中四逆輩溫之尙有可生之義宜灸關元

自脇下連臍旁有痞引小腹入陰筋而恟

借代本
文痛字

陽氣先

絕陰氣尋終

本文云病人脇下素有痞連在臍旁痛引小腹入陰筋者此名藏結死○
臍旁天樞之位氣交之際陽明脈之所合少陽脈之所出肝脾腎三藏之
陰凝結於此所以痛引小腹入陰筋也陽氣先絕陰氣繼絕故死

陽結陰結何以別之陽結脈浮而數陰結脈沉而遲陽結
則陰病故能食不便但納而輸不出陰結則陽病故便鞭
不食但輸而納失司太過不及劇以節期陽結者特屬胃
家之實陰結者急用參附庶幾

本文云其脈浮而數能食不大便者此爲實名曰陽結也期十七日當劇
其脈沉而遲不能食身體重大便反鞭名曰陰結也期十四日當劇

腹滿屬虛時減腹滿非虛却不陽邪腹痛痛必不常陰邪



腹痛痛無休息拒按喜按尤為標的太陰自利腹痛溫中

散寒為則小建中湯治腹痛洩利而陰脈弦陽脈承氣湯

治腹痛便閉而右關實小腹為滿為痛膀胱屬冷屬血

蓄桃仁承氣冷結當歸四逆湯

口舌燥乾引飲曰渴不引飲曰燥乾皆為熱甚經謂戒汗緣多裏證花粉

葛乾加入柴胡湯惟少陽之口苦承氣用夫調胃以陽明

之便鞭或白虎加參而清中

經云味過於苦脾氣不濡胃氣乃厚甘寒之品乃瀉胃火生津液之上劑

或大承氣湯而救腎

少陰有口燥咽乾急下證

汗下後虛脈微來應補中益氣生脈柏知合併



邪在表則舌無苔入半而形白滑邪傳裏則苔乾燥熱深而見厚黃舌如純黑病勢猖狂水來尅火者附子理中湯

醫寒極火極似水者承大氣治熱傷

陽渴飲多而喜冷陰渴飲少而喜溫蓋裏渴甚於表渴故

三陽不若三陰太陽無汗而渴禁白虎陽明多汗而渴禁

五苓少陰渴而用四逆湯以下利溺色全白少陰渴而用

承氣以自利而水色純青

漱水不欲嚥

此證屬陽明熱在經不在府也

兼頭痛熱身脈微犀角地黃衄血可治鮮不止漱水不欲嚥

無寒熱外證桃仁承氣蓄血可行

甚當湯者抵

有聲無痰咳之象有聲有痰嗽之常古曰肺疾發散則愈
經謂發汗踰滿宜防

李士材曰古云咳爲肺疾發散則愈然亦有不可發散者如經曰欬而小
便不可發汗發汗則肢厥又曰欬而發汗踰而苦滿腹堅爲逆者是也

裏熱欬嗽者梔芩桑杏表寒欬嗽者三拗麻黃細閱仲景
治例不分證陰證陽陽每加乾薑散肺經之逆而用五味收

肺氣之傷

真如少陽證小柴胡湯少陰病
武湯四逆散俱有加用法

張口擡肩喘形可說或

金虛而火來刑或汗後而水多啜

小青龙加
杏仁猪苓

謂陽明腹滿而

喘可以峻攻而合病胸滿而喘何堪下奪

太陽陽明合病喘而
胸滿不可下麻黃湯

諸喘爲惡陰喘更烈四肢逆冷虛火泄越惟反陰丹死中

求活



短氣似呻吟而身無痛若喘促而口不張惡風汗出身腫

短氣者

兼骨節痛小便不利風濕也

甘草附子

湯

手足汗出潮熱短氣者

大承氣湯十棗

湯

治表解短氣心下痞鞭而兼乾嘔小柴

治無汗短氣脈弦浮大而復身黃

兼腹滿脇痛小柴胡湯便難潮熱小柴胡湯

三法

已行

汗吐下後

脈微而氣不能續異功五味

五味異功散

爲的陰證逆

冷脈沉而息不能布人參四逆

四逆湯加人參

爲良此治法雖增於

括要而心源實紹夫南陽嘔者有物有聲爲或寒或熱吐

者無聲有物爲不熱但寒寒者脈遲逆冷熱者脈數渴煩

用生薑而散逆藉半夏以除痰葛根半夏可投治在上焦

之分四逆理中加法主乎陰經之三正氣散

藿香正氣散

治初病

嘔吐之寒傷胃柴胡桂

湯

主支結微嘔而表猶兼先嘔後

