

明·彭用光撰

體仁彙編·十二經絡臟腑病情藥性



明·彭用光 撰

體仁彙編·十二經絡臟腑病情藥性



肺臟藥性

肺迺手太陰之經少血多氣此右手寸口脈名大淵者其經起自少商穴在手大指端內側終於中府穴在乳上三肋正間動脈應手處是也辛金之臟相傳之官位高非君故治節出焉主行榮衛故其旺於秋旺於為氣之本也肺諸氣其味辛而其色白從華作秋於為氣之本也肺諸氣其味辛而其色白從華作新白者西其聲哭而其志憂哭哀聲也內藏魄而外方金色也

養皮毛肺內藏魄肺之精氣生養皮毛上榮膚而中生液涕眉毛肺可見又云肺熱湧出開竅於鼻鼻所司呼吸脈沉診候大腸浮是肺也實則脈實診見實者肺

體仁彙編·十二經絡臟腑病情藥性 解題

明·彭用光撰。成書於嘉靖二十八年（公元一五四九年）。

彭用光，生卒年不詳。廬陵（今江西吉安）人。曾在河北、江蘇、廣東等地行醫，有很好的效果，並著有多種醫書。

此部分為《體仁彙編》叢書卷之四《十二經絡臟腑病情藥性》，內容主要是根據十二經脈隸屬臟腑的關係，分別記述了各臟腑的常用藥物。對於每一臟腑的用藥法則均分為三部分。其一是該臟腑病症常用藥的「藥性」（包括主治）。其二是醫療該臟腑、經脈，並具有補、瀉、溫、涼藥性的藥名。其三是該臟腑循經報使的藥名。此卷卷末附「新增藥性陰陽論」及「雷公炮製法」，前者係收錄的「藥性賦」全文，後者包括多種製藥方法。

今據明·嘉靖二十八年（公元一五四九年）南昌體仁堂刊本《體仁彙編》影印。

（張瑞賢）

體仁彙編·十二經絡臟腑病情藥性

總目

體仁彙編卷之四

十二經絡臟腑病情藥性

心臟藥性	〇七一
本經補瀉溫涼藥	〇七三
東垣報使引本經藥	〇七三
小腸藥性	〇七三
本經補瀉溫涼藥	〇七七
東垣報使引本經藥	〇七七
肝臟藥性	〇七七
本經補瀉溫涼藥	〇八〇
東垣報使引本經藥	〇八一
膽腑藥性	〇八一
本經補瀉溫涼藥	〇八三
東垣報使引本經藥	〇八四
脾臟藥性	〇八四
本經補瀉溫涼藥	〇八七
東垣報使引本經藥	〇八八
胃腑藥性	〇八八
本經補瀉溫涼藥	〇九二
東垣報使引本經藥	〇九三
肺臟藥性	〇九三
本經補瀉溫涼藥	〇九六
東垣報使引本經藥	〇九七
大腸藥性	〇九七
本經補瀉溫涼藥	一〇〇
東垣報使引本經藥	一〇〇

腎臟藥性	一一〇
本經補瀉溫涼藥	一一〇
東垣報使引本經藥	一〇三
膀胱腑藥性	一〇四
本經補瀉溫涼藥	一〇四
東垣報使引本經藥	一〇六
命門臟藥性司晷	一〇七
本經補瀉溫涼藥	一〇七
東垣報使引本經藥	一〇八
三焦腑藥性	一〇八
本經補瀉溫涼藥	一〇八
東垣報使引本經藥	一〇九
新增藥性陰陽論	一一〇
寒	一一一
熱	一一三
溫	一一五
平	一一六
諸經瀉火藥	一一八
雷公炮製法	一一九
煎藥大法	一一九
服藥大法	一一九
用藥大法	一一九
隨證治病藥品說	一二〇
用藥凡例說	一二二
隨時用藥例說	一二三
隨證治氣藥論說	一二四
隨證治血藥論說	一二五
隨證治火藥論說	一二六

丸散說

.....

一二七

體仁彙編卷之四

十二經絡臟腑病情藥性

廬陵彭用光集註

心臟藥性

且夫心乃手少陰之經居左手手少指內應之端起自少衝

泉穴在腋下筋間動脈入臍多氣少血丁火之臟君主之官神明

出焉清靜神靈故曰神明出焉其旺於夏心火旺於夏為

生之本也君王者萬物繫之以內合球而外榮乎色

過行榮衛味喜古而志在平矣屬火故喜則大言火

而養血也

之象髮乃血苗汗為心液開竅於舌五熱則汗出司辨

五味脈在左寸取候小腸是心也實則熱而虛則

寒熱虛則寒靜則安而動則燥養心惟靜老子曰

已虛寒者怯怕多驚健忘恍忽清便自可脰必濡細

遲虛實熱者顛狂讖語腮赤舌乾一腑瀝黃脈須數

洪沉實心盛則熱見乎標五心臟實熱則口心虛則

熱收於內心虛煩虛則補其母心之母實則瀉

其子脾乃心之實當虛實既失補瀉必當味其

瀉而補之以鹹凡味鹹者能補心氣熱補而瀉之以

體仁彙編卷四

冷

凡氣熱者能補心氣寒者能瀉心

心陽不足桂心代赭紫石英補

須參附

參附湯姜煎服

離火有餘竹葉大黃山梔子瀉用苓

蓮涼心者硃砂壯心者琥珀舌長過寸研水片敷之

即收

血也血衄如泉炒槐花摻之即止除瘡落菌膏

犀角與辰砂

琥珀犀角膏方治咽喉口舌生瘡前用真琥珀研一錢生犀角屑一錢辰砂研

一錢茯苓二錢以人參茯苓神犀角為細末入乳鉢內

別研藥味和勻用煉蜜搜為膏子以瓦瓶收貯俟其

疾作每服

彈子大以麥門冬去心瓦煎湯化服一

日進五服

服取効定志寧神丸硃砂共蓮草按方硃砂安神

亂取連五錢其

氣亂心下痞悶食入反吐出硃砂四錢研黃連五錢甘草生二錢半為末蒸餅丸如黃米大

體仁彙編卷四

二

身服十九

唾津送下蔓荊子涼諸經之血草連香瀉六經之火

驚悸不安須龍齒沙參小草捷忘失記必茯苓遠志

當歸多睡方飲盧仝之苦茶不眠方服雷公之酸棗

涼血補陰生地黃行津止渴天花粉文蛤末付愈口

瘡綉鐵粉噲消舌腫中風不語燒竹瀝涼之更良感

熱多言末硃砂鎮之又善胞閉瘡痛開之枳實瓜萎

心內懊懷治之梔子豆豉心熱痛炒菖蒲川練梔子

宜焦冷心痛須木香肉桂玄胡可炒心驚盜汗末白

豈與辰砂

有一男子因驚恐自汗無度以致倦怠因弱服麻黃根黃耆朮鷓鴣無効滑絡曰汗

為心液以白芷一兩味砂半兩為細末每二錢酒鼻
調下因不用酒用狀神麥門冬煎湯調服良愈
衄流紅煮黃芩草芍藥礬熟獨妙真珠顛狂惟佳鐵
粉鐵拍作片置醋樽中漬安鎮靈臺琥珀砂和王
屑開清神府茯神遠志共葛蒲病在心詳藥須心悟

本經補瀉溫涼藥

補 酸棗仁 天竺黃 金屑 銀屑 麥門冬

遠志 山藥 紅花 川芎 羚羊角

川歸

瀉 枳實 葶蘆 苦參 貝母 半夏

體仁彙編卷四

三

杏仁 欒金 玄胡 前胡 黃連

木香

溫 石菖蒲 藿香 蘇子

涼 竹葉 丹砂 礬石 玄胡粉 牛黃

真珠 麥門冬 欒金 黃連 知母

貝母 連翹 蘆根 柴胡

東垣報使引本經藥

獨活 細辛

小腸藥性

小腸乃手太陽之經多血少氣其經起自少澤穴在

風穴在肩上丙火之躡受盛之官化物出焉承奉

舉臂有空丙火之躡受盛之官化物出焉合心臟而長三丈

二尺曲十六而廣二寸有四泌清別濁各歸前後

下口乃小腸上口也臍上一寸水分穴則小腸下口

也至是而泌別清濁水液入膀胱滓穢入大腸也

候在人中千金云唇厚人小腸脈詳左寸與心脈同位若

實也小腸是腸也病則小腸痛連腰脊控睪而疼實則脈

實左寸浮實左寸浮煩滿而口舌生瘡虛則脈虛左寸浮懊懣

而唇青下白氣涼補而瀉溫藥性氣涼者補小腸味辛

瀉而酸補藥味辛小便秘頻而美縮泉縮泉九治頻數

丸天台烏藥益智仁各等分為細末酒煮山藥末糊

精不固而佳感喜威喜丸治精氣不固憂泄白濁

分同放於磁器內用水煮至二十餘沸取出焙乾研

馬細末四兩將黃蠟四兩熔化攪和茯苓末為丸如

彈子九如梧桐子大每服七十九臨卧鹽酒吞下是効

遠志九如梧桐子大每服五龍益石蓮果澁精思濟口

為丸九如梧桐子大每服五龍益石蓮果澁精思濟口

十九臨卧用蜜湯送下龍益石蓮果澁精思濟口

白濁夢遺洩精等疾用石蓮肉益智仁龍骨五

者各等分為細末每服二錢空心清米飲調下服

小腸疝氣苗香薑浸入青鹽搗面香一介以若生薑

體仁堂編卷四

四

好清鹽二兩同炒去取一夜約姜汁盡入茴香
 飲九如梧子入每日空心食前服三十粒大治小
 腸病氣脹之暴有欲爭常治疝氣多足膝草久
 未病不為害者此藥用姜汁專一發散而無鍊毒之
 為妙也川練炒成加木破川練子九皆治之腫痛縮
 小雖多年服此藥去根川練子一斤淨肉四兩用麩
 一合煎獨一合巴豆四十九粒同炒黃色去麩不閉
 兩用麩一合巴豆一合一兩同炒黃色去麩不閉
 用○四兩用麩一合巴豆一兩同炒黃色去麩不閉
 要○去鹽苗香不用同木香一兩不見火破黃紙一兩
 妙黃為度為木酒糊九如梧桐子大每服五
 汁九鹽湯下甚者日進三兩服空心食前服
 而能治諸淋 透隔散治諸淋○用滑石一兩細研勞
 疎勞倦虛損則發用葵花末煎湯調二

體仁堂編卷四 五

錢服効又方白化散治小便不通膀胱溫沉香溫而
 熱用朴硝為末每服二錢煎茴香湯調服氣不舒行陰
 行諸氣 沉香散治氣淋多因五內鬱結氣不通大便多
 歸小便不列○用沉香石菖去毛搗皮各一錢為細
 歸各五錢菜子白芍各三錢甘草搗皮各一錢為細
 末每服二錢 尿血 黃芩 苦蕒 菜根 酒與水煎服血淋煎
 煎大麥湯下 車前子 葉 用車前根葉子清泉旋汲飲髮灰用自
 或或也人者亦可細創清水利調服薄荷時煎琥珀
 灰或也人者亦可細創清水利調服薄荷時煎琥珀
 小便尿血用琥珀研為細末每服熱入小腸為赤帶
 二錢燈心薄荷煎湯調服神効 熱入小腸為赤帶
 苗香苦練當歸 煨枲方苦練丸治婦人帶病熱入小
 也○宜苦練碎炒茴香炒當歸各五錢為細邪歸
 末酒湖光每服五十九空心溫酒送下立効 邪歸

大腑變膏淋滑石金砂甘草

海金沙砂滑石經各淋一兩

甘草木一分研勻每匙用自朝至夜思義果痊

麥門冬湯下燈心湯亦可長安王善夫病小便不通漸成中

欲死之瘵滿腹大堅硬如石墮寒之極脚堅脹裂

裂出黃水雙睛白出晝夜不得眠飲食不下痛苦不寐

何名狀伊賦越謙甫求治視歸從夜至旦歌賦不寐

又云勝脫州者州都之官津液驢焉氣化則能出矣此

病小便便閉閉是無陰而陽氣不化九利小便之藥

皆淡味滲泄為陽是此乃奉養太過膏梁積熱損比

陰中之陰所化者不足勝脫腎之空久而乾涸小便火反

逆上而為嘔噦非隔上可生也獨為關非格病內關

古云熱在下焦噎塞不便須關格之法今病若內關

外格之病悉具死在旦夕但治下焦可愈隨處以稟

此方寒水所化大苦寒之味者黃柏知母桂為引用

丸如梧桐子大沸湯下二百丸少時來人云服藥濕

更如刀刺前陰火熱之痛溺如瀑泉湧出卧具皆濕

床下成窠顧盼之間腫脹消散驚異曰大哉聖人之

之言豈可編覽而執一者也其証小便閉塞而不

渴時見燥者是也凡諸病君下焦皆不渴而二者之

病一居上焦在氣分而必渴居下焦在血分而不渴

血中有濕故不渴也二考古驗今得論詳辛濟將危

體仁彙編卷四

六

之秘適之不行及一富人因事繫獄得大便秘醫以大黃藥

診其脈虛弱不渴此因體虛傷於七情致小焦氣逆

運掉不行乃氣秘耳遂與一精散三焦氣逆

而勿藥熱似壅食飲少貪余無所治之用諸苦寒之劑

湯愈甚熱未甚餘日求其退熱而及甚熱從之劑

若見脚浮可止藥數日腫果浮小便亦濁少時乾如

湖皆曰熱甚有欲進至實得者余曰非熱甚也迺苦