

醫門棒喝二集傷寒論本旨卷九

張仲景先師原文

會稽虛谷章楠編註

冀子陳祖望

山陰

校訂

允占錢中昌

太陽篇方

桂枝湯

桂枝 三兩

芍藥 三兩

甘艸 二兩



醫門棒喝二集傷寒論本旨卷九

彙方目錄

各篇證治有同用一万者方列於
主治篇檢方者須先查目錄也

太陽篇方

桂枝湯

麻黃湯

調胃承氣湯

列陽明篇

大青龍湯

真武湯

列少陰篇

小青龍湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二越婢一湯

桂枝二麻黃一湯

四逆湯

列少陰篇



甘草干薑湯

芍藥甘草湯

小建中湯

炙甘草湯

五苓散

文蛤散

柴胡桂枝湯

小柴胡湯

列少陽篇

桃核承氣湯

抵當湯

抵當丸

陽明篇方

麻黃湯

列太陽篇

桂枝湯

列太陽篇



北京中醫藥大學圖書館版權所有

梔子豉湯

列少吐
下後篇

白虎加人參湯

猪苓湯

小柴胡湯

列少陽篇

四逆湯

列少陰篇

吳茱萸湯

列厥陰篇

五苓散

列太陽篇

白虎湯

黃連湯

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

麻仁丸

抵當湯

列太陽篇

蜜煎導法

土瓜根猪膽汁導法



少陽篇方

小柴胡湯

小建中湯

列太
陽篇

柴胡加龍骨牡蠣湯

大柴胡湯

柴胡加芒硝湯

合病并病篇方

桂枝加葛根湯

葛根湯

葛根加半夏湯

麻黃湯

列太
陽篇

大承氣湯

列陽
明篇



北京中醫藥大學圖書館版權所有
1964

太陰篇方

四逆湯

列少陰篇

桂枝湯

列太陽篇

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

少陰篇方

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

附子湯

四逆湯

白通湯

白通加膽汁湯

通脈四逆湯

真武湯



通脈四逆加膽汁湯
四逆加入參湯

吳茱萸湯
列厥陰篇
四逆散

半夏散及湯
薤白湯

桃花湯
大承氣湯
列陽明篇

抵當湯
列太陽篇

厥陰篇方

茯苓甘草湯
列霍亂下後篇
當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

吳茱萸湯

小柴胡湯 列少陽篇

白頭翁湯

小承氣湯 列陽明篇

梔子豉湯

列汗吐下後篇

烏梅丸

干薑連芩人參湯

麻黃升麻湯

汗吐下後誤治諸證篇方

桂枝湯

列太陽篇

桂枝加附子湯

真武湯

列少陰篇

芍藥甘草附子湯

桂枝去芍藥生薑新加入參湯

一方加芍藥生薑證治條下已申明



調胃承氣湯

列陽明篇

茯苓桂枝甘艸大棗湯

桂枝甘艸湯

禹餘糧丸

論中缺

柴胡桂枝湯

列太陽篇

麻黃杏仁甘艸石膏湯

五苓散

列太陽篇

茯苓甘艸湯

厚樸生薑甘艸半夏人參湯

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝加厚樸杏仁湯

葛根黃芩黃連湯

四逆湯

列少陰篇

小柴胡湯

列少陽篇



大承氣湯

列陽明篇

梔子豉湯

梔子甘艸豉湯

梔子生薑豉湯

梔子厚樸湯

梔子干薑湯

茯苓桂枝白朮甘艸湯

柴胡桂枝干薑湯

茯苓四逆湯

干薑附子湯

桂枝去桂加苓朮湯

白虎加人參湯

列陽明篇

小承氣湯

列陽明篇

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯



桂枝加桂湯

桂枝甘艸龍骨牡蠣湯

結胸痞證篇方

大陷胸湯 有二方

大柴胡湯 列少陽篇

大陷胸丸

小陷胸湯

白散

半夏瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

甘艸瀉心湯

生薑瀉心湯

十棗湯

旋覆代赭石湯



南京中醫藥大學圖書館版權所有

理中丸及湯

赤石脂禹餘糧湯

五苓散

列太
陽篇

桂枝人參湯

差後復陰陽易病方

枳實梔子豉湯

小柴胡湯

列少
陽篇

牡蠣澤瀉散

理中丸

列結胸
痞證篇

竹葉石膏湯

燒裨散



醫門棒喝二集傷寒論本旨卷九

張仲景先師原文

會稽虛谷章楠編註

冀子陳祖望

山陰

校訂

允占錢中昌

太陽篇方

桂枝湯

桂枝 三兩

芍藥 三兩

甘艸 二兩



生薑

三兩切

大棗

十二枚擘

右五味，㕮咀，以水七升，微火煮取三升，去滓，適寒溫服一升，服已須臾，啜稀熱粥一升餘，以助藥力。溫覆令一時許，遍身漿漿微似有汗者佳，不可令

大汗如水淋漓，病必不除。若一服汗出病差，停後服，不必盡劑。若不汗，更服依前法。又不汗，小促役其間半日許，令三服盡。若病重者，一日一夜服，周時觀之。服一劑盡，病證猶在者，更作服。若汗不出

者乃服二三劑禁生冷粘滑肉麪五辛酒酪臭惡等物

余按論中每言當發其汗宜桂枝湯則是無汗者
可使其發汗也又曰發熱汗出者此爲營弱衛強
故使汗出欲救邪風者宜桂枝湯則是有汗者又
可使其收汗也又曰桂枝本爲解肌若脈浮緊發
熱汗不出者不可與勿令誤也則是無汗者不但
不能使其發汗且恐誤用爲害也何其一方之功



用而各相悖。有如是耶。歷來解者。雖明其所當然。總未表出其所以然。爲因義理精微。有難言喻者。也。學者不知其所以然。則當用而不敢用。不當用而誤用。或見有誤用之害者。於是置之而不用。遂將至妙至神之法。永遠埋沒。可不惜哉。余姑畧言其所以然。以質夫君子。不知有常於理否。經曰。飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。則是一

身之氣血輸布周流皆出於脾胃水穀之所生化者也。夫藥之功用全在氣味。辛甘化陽，酸甘化陰。必由脾胃生化，上歸於肺，達於周身，故脾胃爲營衛之本。營衛爲脾胃之標。凡治營衛之病，必從脾胃立法也。此方薑桂之辛配甘棗之甘以化陽，芍藥之酸配甘棗之甘以化陰。陽走表而入衛，陰走裏而入營。陽勝則陰從陽，陰勝則陽從陰。陰主收攝，陽主疎通。以其薑桂之辛多，芍藥之酸少，則陽