

温病

方

條辨

歌括

歌

合

輯

上



附言

本書係根據我館館藏鈔本傳鈔。原書名《溫病條辨歌括》劉維之著附丁企儒著《溫病方歌》。在整理時，感此書實為兩書合輯，因改名《溫病條辨歌括，溫病方歌》合輯。

泰州市圖書館

一九八三年 月 日



溫病條辨歌括

東台劉氏維之著

序

大凡物有輕重長短非權度不可知事有巨細精粗  
非理義不可決人有情慾感觸非醫藥莫能治病有  
變化不同非明眼莫能辨是則病不可無醫醫不可  
不明也苟其道義未精一旦臨司命之任將遇病症  
稍異勢必束手無策勉為製方藥必妄投遂使輕病  
變重重變不起矣夫求醫以療病今反足以益病醫  
以濟人今反足以害人是則病又不如無醫醫又不



如不為也若徒為覓衣食計而輕忽性命則是殺人  
以為己利此盜賊之為也醫云乎哉况溫邪一症四  
四季皆有患者甚多傷人亦速且斯症有風溫溫熱  
暑溫溼溫疫溫毒溫瘧冬溫秋燥不同或風暑交  
感暑溼相兼或風與溼搏溼罷燥生種種夾雜難以  
枚舉設不分清豈克有濟賴有鞠通吳氏辨症千條  
所立大意以三焦為主其論病之來路始於始上焦論  
病之去路終於下焦証有氣血虛實輕重之分治有  
先後補瀉緩急之妙其中反覆辨論極加詳慎因証  
定法加減隨宜遵古酌今以合時變決生死於將來



得格物之妙諦補前人之未備正各証之淆訛無不  
井井有條絜絜入扣誠千古渡醫之寶筏為百代救  
世之慈航其功可勝言哉故此書一出為治溫邪之  
祖為醫家必讀之書然願讀是書者務將條款分明  
彼此互証前後貫通瞭然心目一過溫邪到手方能  
迎刃而解若粗知大略偶一獲效則可如期必效則  
誠難矣吾故粗編成歌不敢輕易句字以失原條本  
真惟取音諧悅口以便朝夕誦記庶可條析縷分不  
致張冠李戴再加原本日置案頭細閱註解歌中有  
未及者必欲詳悉不可以此失彼反成遺漏之書此



蓋為吾等愚者計敢與智者語乎讀者諒之



溫

溫病條辨歌括目次

溫邪上焦篇 風溫 溫熱 溫疫 溫毒 冬溫

溫邪中焦篇 風溫 溫熱 溫疫 溫毒 冬溫

溫邪下焦篇 風溫 溫熱 溫疫 溫毒 冬溫

暑溫上焦篇 暑溫 伏暑

暑溫中焦篇 暑溫 伏暑

暑溫下焦篇 暑溫 伏暑

溼溫上焦篇 溼溫 寒溼附

溼溫中焦篇 溼溫 瘧痢 疸痺附

溼溫下焦篇 溼溫 瘧痢 疸痺附

溫病條辨歌括 目錄





寒溼中焦篇

寒溼下焦篇

寒溼

便血

咳嗽

疝瘕附

秋燥上焦篇

秋燥中焦篇

秋燥下焦篇

溫瘧



溫病條辨歌括

東台劉氏維之著

溫邪上焦篇

風溫 溫熱 溫疫 溫毒 冬溫

凡病溫邪始上焦邪由口鼻太陰脰

脰寄寓也溫邪由口鼻而入鼻

通於肺故邪必先寓於手太陰

脈不緩緊而動數或是兩寸獨大超

微惡風寒頭內痛身熱自汗尺膚燒

尺部肌膚熱甚火反克水也

口渴或不渴而咳午後熱甚溫病標春初風令風溫

識

春初陽氣始開厥陰行令風夾溫也

春末陽張溫熱調

春末夏初陽氣地張溫盛

為熱

溫疫流行多穢濁

厲氣流行多兼穢濁家家如是若役使然

冬溫陽

氣失潛消

冬應寒而反溫陽不潛藏消息民病溫也

諸溫夾毒為溫毒

穢濁

溫病條辨歌括

溫邪上焦

一



甚太勿與傷寒混一條初起桂枝寒是惡風寒不惡法

銀翹

如服桂枝湯惡寒已解餘病不解者風溫微渴銀翹散主之

身微熱但咳輕清桑菊邀太陰溫病氣分燥脈象浮

洪大汗飄口渴苔黃兼惡熱辛涼重劑白虎澆太陰

浮大兼乳脈汗湧鼻煽微喘感此是化源欲絕苗急

倍人參湯內服

陰虛陽不固脈散大者倍用雖然白參六錢固正陽使陽生陰

虎退陽邪四層不可與宜熟脈浮弦細與不可脈來沈

不可

口不渴兮

與不可

汗內伏

汗不可與

氣血兩燔玉女

煎

去牛膝加玄參

血從上溢犀黃逐

犀角地黃湯合銀翹散主之

若吐粉

紅血水形

非血非液實血與液交迫有燎原之勢化源速絕

脈煩至七八面黑

皆難育

宜用清絡育陰法

渴甚須用雪梨漿吐沫粘滯五

汁肅三日

太陰病得之二三日

苔微黃寸洪

寸脈盛洪

心煩懊懷不

安躬

起卧不安

欲嘔不得中無病

中焦無証

在膈

邪已不全在肺中而在上

焦膈中也

吐以梳鼓功重則疾涎壅盛者胸中痞塞瓜蒂

雄

甜瓜蒂一錢赤小豆二錢研山梔子二錢

與上條有輕重之分

舌大

絳而乾應口渴若還不渴在營中

邪熱入營蒸騰營氣上升故不渴

清營湯去黃連治不用黃連深入攻溫病從來禁發

汗若還誤汗病如風汗多過出傷心液謔語神昏包

絡蒙須藉芳香開內竅

牛黃紫雪至寶之類

入心絳濁有清宮

湯

若曾誤汗汗不出鬱成斑疹色宜紅

誤汗不出溫邪鬱於肌表



血分故必發斑自應化斑主發疹銀翹加減通翹散

內去豆豉加生地丹皮熟厥有三邪在絡居多而

大青葉倍元參主之陽明症少者則從芳香邪

搏陽明陽明太實上冲心包神迷肢厥甚則通體厥

者則從下法日久邪殺陰屬而厥者則從育陰育潛

法邪入心包舌舌屬手蹇厥肢牛黃紫雪蔽能聰溫

毒咽喉皆腫痛咽痛喉腫耳前耳後腫煩腫甚為竅

閉耳中聾俗名蝦蟆大頭症普濟從來法最崇普濟

飲蓋取輕能去實義升柴減去穩而工水仙膏拔毒

專敷外皮起小瘡再另窮水仙膏敷後皮間有小黃

仙膏過敷則痛甚而瘡如黍米者不可再敷水

爛三黃二香散主之溫毒神昏謔語者安宮牛黃丸

謔

紫雪丹冲溫病死形難盡訴大綱不越五條路肺源



化絕勢無生內閉心神在朝暮

此二症屬上焦

若是陽明太

實強上來克水身難度脾家鬱極發為黃黃極濁填

諸竅銅

銅閉也諸竅為穢濁塞閉者亦死二症屬中焦

熱入下焦消燍陰液

竭津亡持不住

在下焦無非熱邪深入消燍津液涸盡而死也

數症若逢命

必危靈丹縱有難相護

桂枝湯方

桂枝

六錢芍藥三錢

炙甘草二錢

生姜

三片

大棗

二枚去核

辛涼平劑銀翹散

連翹

一兩銀花一兩

苦桔梗

六錢

薄荷

六錢



竹葉 四錢 生甘草 五錢 芥穗 四錢 淡豆豉 五錢

牛蒡子 六錢 葦根

辛涼輕劑桑菊飲方

桑葉 二錢五分 菊花 一錢 杏仁 一錢 連翹 一錢五分

薄荷 八分 苦梗 二錢 甘草 八分 葦根 二錢

辛涼重劑白虎湯方

生石膏 一兩研 知母 五錢 生甘草 三錢 白粳米 一合

玉女煎去牛膝熟地加細生地元參湯方

生石膏 一兩 知母 四錢 元參 四錢 細生地 六錢

麥冬 六錢

犀角地黄湯

乾地黄 一兩 生白芍 三錢 丹皮 三錢 犀角 三錢

五汁飲方 甘寒法

梨汁 勃薺汁 鮮葦根汁 麥冬汁 藕汁

或用  
蔗汁

梔子豉湯 酸苦

梔子 五枚 搗碎 香豆豉 六錢

清營湯方

犀角 三錢 生地 五錢 元參 三錢 竹葉心 一錢

麥冬 三錢 丹砂 二錢 黃連 二錢 銀花 三錢



連翹 二錢 連心用





溫邪中焦篇 風溫溫熱溫疫溫毒冬溫

溫邪中走陽明切不惡寒今但惡熱呼吸俱粗面目

紅語聲重濁老黃舌甚為黑色刺芒生口燥渴兮二

便結大便閉每到日晡熱勢加或清或下脈中別脈

浮洪躁白虎湯清沉數有力求承氣大承氣湯泄浮而促者

病勢危減味竹葉石膏設數而時止如趨者過急忽

涼重劑透表逐邪陽明諸証備皆微謂陽明溫病諸証

尤脈不浮者小承微症不甚重故以小承氣湯微和

汗多譫語舌乾黃舌苔老黃內因結糞宜下潔譫語

糞而然宜無汗譫語小便難此屬心包絡症看須用

溫病條辨歌括

溫邪

中焦

五

