

金匱要略



金匱方歌括凡例

一方中分兩者法服法俱遵原本但古今之權量不同漢之一兩今止二錢零予遵程氏活法每方取古方三分之一以作一劑又從二劑中取三分之一為一服每劑分為三劑如桂枝湯此方生薑桂枝芍藥各三兩今一劑此每味用各九錢分而三之是每服此數味各三錢是也甘草二兩今一劑用六錢分而三之是此味每服二錢是也大棗全料用十二枚今照數不減者以秤則隨時不同而此之分枚則一也分而三之是此味每服四枚是也啜粥溫覆禁忌俱依古法餘倣此

一每方歌括之後必加方解間有治法方法意義既詳於歌中者不復於方後再解

一前賢名言精論千古不磨者本集或於歌中或於註中採集不遺間有未愜於心者取原文細釋其旨求其合於內經又與難經之言相為表裏參之千金外臺之說相發明者而後補註之當閱吳醫彙講以獨開生面不襲老生常談為高而予正與之相反覽斯集者必以剿說病之然而甘受而不辭也

一傷寒金匱諸方皆出伊聖湯液經說見藝文志其方通造化之微不可以尋常寒溫補瀉之說以窺測之且其用法俱本神農本草經若執宋元後之本草及李時珍綱目汪訥菴備要等查對藥性失之遠矣家君刻有神農本草經讀行世凡讀傷寒金匱者不可一日離之

一金匱附方雖係後人贅入而方引藥味却亦不凡今低一字以別之

小引



金匱方歌括目錄

卷一

痼濕渴病方

括薑桂枝湯

麻黃  
杏仁 蕙以甘草湯

甘草附子湯

百合狐惑陰陽毒方

百合知母湯

百合洗方

苦參湯

升麻  
薑甲 湯去雄黃蜀椒

卷二

瘧病方

鱉甲煎丸

附柴胡去  
半夏加括 薑根湯

葛根湯

防己黃耆

人參白虎湯

百合滑石代赭石湯

括薑狂蠟散

雄黃熏法

大承氣湯

桂枝附子湯

一物瓜蒂散

百合雞子黃湯

百合滑石散

赤小豆當歸散

麻黃加朮湯

白朮附子湯

百合地黃湯

甘草瀉心湯

升麻鱉甲湯

白虎加桂枝湯

附柴胡桂薑湯

蜀漆散

附牡蠣湯



中風歷節方

侯氏黑散

桂枝知母湯

附千金三黃湯

血痺虛勞方

黃耆桂枝五物湯

黃耆建中湯

大黃蟄蟲丸

卷三

肺痿肺癰欬嗽上氣方

甘草乾薑湯

澤漆湯

越婢加半夏湯

附千金生薑甘草湯

附千金葶藶大棗瀉肺湯

方見前

風引湯

烏頭湯

附崔氏八味腎氣丸

桂枝加龍骨牡蠣湯

八味腎氣丸

方見婦人雜痛

附千金翼天甘草湯

射干麻黃湯

麥門冬湯

小青龍加石膏湯

附千金甘草湯

防己地黃湯

礬石湯

附千金越婢加朮湯

天雄散

薯蕷丸

附千金翼天甘草湯

皂莢丸

葶藶大棗瀉肺湯

附外臺桔梗白散

附外臺桔梗白散

頭風摩散

附古今錄驗續命湯

小建中湯

酸棗仁湯

附千金翼天甘草湯

厚朴麻黃湯

桔梗湯

附千金桂枝去芍加皂莢湯

附千金薑並湯



奔豚氣病方

奔豚湯

胸痺心痛氣短方

栝蒌薤白白酒湯

茯苓杏仁甘草湯

赤石脂丸

腹滿寒疝宿食方

朴厚七物湯

大承氣湯

方見  
痙病

大烏頭煎

附外  
臺藥胡桂枝湯

卷四

五臟風寒積聚方

旋覆花湯

痰飲欬嗽方

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

栝蒌薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

橘枳生薑湯

薏苡附子散

附九痛丸

桂枝生薑枳實湯

人參湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

大建中湯

大黃附子湯

當歸生薑羊肉湯

烏頭桂枝湯

附外臺走馬湯

大承氣湯

附外臺烏頭湯

方見

赤丸

大柴胡湯

瓜蒂散

麻仁丸

甘草乾薑茯苓白朮湯



苓桂朮甘湯

大青龍湯

澤瀉湯

小半夏湯

小青龍湯方見上

苓甘五味加仁湯  
薑辛半夏杏

消渴小便不利淋病方

腎氣丸方見婦人

蒲灰散

水氣病方

防己黃耆湯

甘草麻黃湯

桂枝加黃耆湯

卷五

黃痺方

腎氣丸方見婦人雜病

小青龍湯

厚朴大黃湯

五苓散

桂苓五味甘草湯

苓甘五味加薑辛  
半夏杏仁大黃湯

五苓散方見痰飲

滑石白魚散

越婢湯

杏子湯

桂枝去辛附子湯  
芍加麻

甘遂半夏湯

木防己湯

小半夏加茯苓湯

附外臺茯苓飲

桂苓五味甘草湯  
草去桂加薑

小半夏茯苓湯

文蛤散

茯苓戎鹽湯

防己茯苓湯

蒲灰散見消渴

枳朮湯

十棗湯

木防己芒硝湯  
加茯苓

已椒藶黃丸

十棗湯方見上

苓甘五味加薑辛夏湯

五苓散

括萋瞿麥丸

猪苓湯

越婢加朮湯見中風

耆芍桂酒湯

附外臺已湯方見風濕黃耆防



茵陳蒿湯

消石礬散

梔子大黃湯

桂枝加黃耆湯見水氣病

猪膏髮煎

茵陳五苓散

大黃硝石湯

小半夏湯見痰飲

柴胡湯見嘔吐

小建湯見虛勞

附瓜蒂湯見病

附千金麻黃醇酒湯

驚悸吐衄下血胸滿瘀血方

桂枝去芍加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

半夏麻黃丸

柏葉湯

黃土湯

赤豆當歸散見狐惑

瀉心湯

嘔吐噦下利方

吳茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

小半夏湯見痰飲

猪苓散

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

半夏乾薑散

生薑半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

四逆湯

桂枝湯

大承氣湯

小承湯

桃花湯

白頭翁湯

梔子豉湯

通脈四逆

紫參湯

訶梨勒散

附千金翼小承氣湯

附外臺黃芩湯

瘡癰腸癰浸淫方

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

王不留行散

排膿散

排膿湯

黃連粉

卷六

蹶手指臂腫轉筋狐疝蚘蟲方

藜蘆甘草湯方未見

雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅丸

婦人妊娠方

小柴胡湯見嘔吐

大承氣湯見瘕病

當歸羊肉湯見寒生薑

枳實芍藥散

下瘀血湯

大承氣湯見瘕病

陽旦湯

竹葉湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草阿膠湯

附子金匱黃芩湯

附子金匱歸建中湯

婦人雜病方

小柴胡湯見嘔吐

半夏厚朴湯

甘麥大棗湯

小青龍湯見欬嗽

瀉心湯見驚悸

溫經湯

土瓜根散

旋覆花湯見五臟積聚

膠薑湯

大黃甘遂湯

抵當湯

礬石丸

紅藍花酒

當歸芍藥散見妊娠

小建中湯

腎氣丸

蛇床子散

狼牙湯

膏髮煎見黃

小兒疳積方

金匱方歌括卷一

閩長樂陳念祖脩園著

男 蔚古愚參訂 孫男 心典徽菴 全校字  
元犀靈石韻註 心蘭芝亭

瘧濕暈病方

括萆桂枝湯 治太陽病其症備身體強八八然脈反沉遲此為瘧病此湯主之

括萆根三兩

桂枝三兩

生薑切

芍藥各三兩

甘草二兩

大棗十二枚擘

右六味咬咀以水九升微火煮取三升溫分三服微汗汗不出食頃啜熱粥發

歌太陽症脈備反沉遲身體八八欲瘧時三兩萆根薑桂芍二甘十二棗枚宜

元犀按瘧是血虛筋燥為病言濕者是推其未成瘧之前濕氣挾風而鬱成內熱也本條云太陽症備脈反

沉遲者此沉遲乃血虛所致非臟寒症也故以桂枝湯和榮衛以祛風加括萆根則清氣分之熱而大潤太

陽既耗之液則經氣流通風邪自解濕氣自行筋不燥而瘧愈矣 又按方中萆桂合甘棗為辛甘化陽芍

藥合甘棗為苦甘化陰陰陽和則得微汗而邪解矣啜粥則又資陽明之穀氣以勝邪更深一層立法但項

背八八脈浮數者為風淫於外而內之津液未傷故加葛根以宣外脉沉遲者為風淫於外而內之津液已

傷故加括萆根以滋內以括萆根苦寒潤燥之功大也 內經云肺移熱於腎傳為柔瘧龐安常謂此方括

萆根不主項強八八其意以肺熱不令移於腎也此解亦超

葛根湯歌見

傷寒 治太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛瘧此湯主之 元犀按無汗例用



麻黃湯然惡其太峻故於桂枝湯加麻黃以發汗君葛根以清經絡之熱是發表中寓養陰之意也又此方與前方皆是太陽中兼陽明之藥以陽明主宗筋也

大承氣湯 治瘧病胸滿口噤臥不著席脚攣急必斷齒可與此湯 元犀按胸滿口噤脚攣急必斷齒等證皆

熱甚灼筋筋急而甚之象以此湯急下而救陰 斷牙藥不能進以此湯從鼻中灌之 三承氣湯歌解見於傷寒長沙方歌括

麻黃加朮湯 治濕家身煩疼發其汗為宜慎不可以火攻之宜此湯主之

麻黃 三兩 去節 桂枝 二兩 甘草 一兩 炙 白朮 四兩 杏仁 七十個 去皮尖

右五味以水九升先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微汗

歌曰煩疼濕氣裏寒中發汗為宜忌火攻莫訝麻黃湯走表朮加四兩裏相融

元犀按身煩疼者寒濕之邪著於膚表也膚表實故無汗無汗則邪無從出矣方用麻黃湯發膚表之汗以散表寒又恐大汗傷陰寒去而濕反不去加白朮補土生液而助除濕氣此發汗中寓緩汗之法也又白朮補脾驅濕之功甚大且能助脾之轉輸而利水觀仲祖用朮各方可知今人炒燥炒黑上蒸水漂等製皆失

經旨

麻黃杏仁薏苡甘草湯 治病者一身盡疫發熱日晡所劇者此名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所

致也

麻黃 半兩 杏仁 十個 去皮尖 薏苡 半兩 甘草 一兩 炙

右劉麻豆大每服四錢匕水一盞半煎八分去滓溫服有微汗避風

歌曰風濕身疼日晡時濕無去來風有休息與上節濕家分別在此當風汗出久傷取冷病之基意麻半兩十枚杏仁甘草扶中其

權一兩宜參以上二方為濕家立法也又有風濕之證其痛輕掣不可屈伸非如濕家之痛重者不能轉

側且濕家發熱旦暮不殊風濕發熱日晡增甚晡申時也陽明旺於申酉戌土惡濕今為風濕所干當其旺

時邪正相搏則反劇也濕無去來風有休作故名風濕然言風寒亦在其中觀原文云汗出當風或久傷取

冷意可知矣蓋瘧病非風不成濕痺無寒不作方中麻黃散寒意故除濕杏仁利氣助麻黃驅寒之力甘草

補中于意故勝濕之權制方之精密如此

防已黃耆湯 治風濕脈浮身重汗出惡風者主之

防已一兩

甘草半兩

白朮七錢

黃耆一兩一分

一本用一兩右劉麻豆大每服五錢匕生薑四片大

棗一枚水盞半煎八分去滓溫服 喘者加麻黃半兩 胃中不和者加芍藥三分 氣上衝加桂枝三分

下有陳寒者加細辛三分 服後當如蟲行皮中從腰下如冰後坐被上又以一被繞腰下溫令微汗差

歌身重脈浮汗上節無汗故用麻黃發之惡風七錢半朮五錢甘草通已者一兩磨分服每服五錢七四片生薑

一棗充

附加喘者再入五錢麻胃不和今芍藥加三分分字去聲讀七錢五分今不差寒取細辛氣衝桂俱照三分

效可誇服彼如蟲行皮裏腰下如水取被遮遮繞要溫得微汗伊岐秘法闡長沙 合參上方治實邪無汗



即桂枝麻黃二湯例也虛汗自出故不用麻黃以散之只用防己以驅之服後如蟲行及腰下如冰云皆濕氣下行之徵也然非耆朮甘草焉能使衛陽復振而驅濕下行哉元犀按張隱菴本草經注云防己生於漢中者破之紋如車輻莖籐空通主通氣行水以防己土之藥故有防己之名金匱治水治痰諸方蓋取氣運於上而水能就下也李東垣謂防己乃下焦血分之藥上焦氣分者禁用等論張隱菴歷歷指駁使東垣聞之當亦俯首無詞噫不讀神農本草經而妄為臆說甘為伊岐之罪人復何責焉防己功用余先君注有

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

以上三方歌解證治俱見傷寒

白虎加人參湯

歌見  
傷寒

太陽中熱者暈是也汗出惡寒身熱而渴者主之

元犀按白虎西方神名也其餘為

秋其政清肅涼風至白露降則溽暑潛消以此湯有徹暑熱之功行清肅之政故以白虎名之

瓜蒂湯  
治太陽中暈身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也此湯主之

瓜蒂二七

右剉以水一升煮取五合去滓溫服

歌曰：喝病陰陽認，真要熱痰身重得其因。暑為濕戀名陰暑，二七甜瓜蒂可珍。

元犀按此物能去水氣水去則暑無所依而自愈矣  
尤在涇云暑雖陽邪而氣恒與濕相合陽求陰之義

也暑因濕入而暑反居濕之中陰包陽之象也 又云暑之中人也陰虛而多火者暑即寓於火之中為汗

出而煩渴陽虛而多濕者暑即伏於濕之內為身熱而疼重故暑病恒以濕為病而治濕即所以治暑瓜蒂

苦寒能吐能下去身面四肢水氣水去而暑解此治中暑兼濕者之法也

百合狐惑陰陽毒方

總歌百合尤云百脉朝於肺以肺為主病從百脉成起居冒昧各難名藥投吐利如神附頭痛參觀溺更明以溺時頭痛為辨蓋百脉之所  
重在少陰太陽以太陽統六經之氣其經上循巔頂下通水道氣化不行乃下溺而上頭痛少陰為生水之源開閉澀乃溺而漸然

百合知母湯 百合病發汗後者此方主之

百合十枚

知母三兩

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水別以泉水二升煎取一升去滓別

以泉水二升煎知母取一升後合煎取一升五合分溫再服

歌應病非汗汗傷陰知母當遵三兩箴漬去沫涎七枚百合別煎泉水是金鉞諸方煎法俱同

元犀按百脉俱朝於肺百脉俱病病形錯亂不能悉治只於肺治之肺主氣氣之為病非實而不順即虛而不足百合能治邪氣之實而補正氣之虛知母入肺金益其水源下通膀胱使天水之氣合而所傷之陰轉則其邪從小便出矣若誤汗傷陰者汗為陰液陰液傷故以此湯維其陽維陽即所以救陰也 王晉三本  
文云百脉一宗明言病歸於肺君以百合甘草清肺即此可療此疾再佐以各經清解絡熱之藥治其病所從來當用先後煮法使不悖於手足經各行之理若誤汗傷太陽者溺時頭痛以知母救肺之陰使膀胱水府知有母氣救肺即所以救膀胱是陽病救陰之法也

百合滑石代赭石湯 百合病下之後者此湯主之

百合七枚

滑石三兩碎

代赭石如彈丸大一枚碎縣裏

右先煎百合如前法別以泉水二升煎滑石代赭

石取一升去滓後合和重煎取一升五合分溫服五合

歌不應議下下之差既下還當竭舊邪百合七枚赭彈大滑須三兩效堪誇

元犀按誤下者其熱必陷熱陷必傷下焦之陰故以百合清補肺金引動水源以代赭石鎮離火而不使其上騰以滑石導熱氣而能通水府則所陷之邪從小便而出自無灼陰之患矣此即見陽救陰法也王晉三云誤下傷少陰者溺時漸然以滑石上通肺下通太陽之陽恐滑石通府利竅仍蹈出汗之弊乃復代赭石重鎮心經之氣使無汗泄之虞是陰病救陽之法也

百合雞子黃湯 百合病吐之後者此方主之

百合七枚

雞子黃一枚

右先煎百合如前法取一升去滓納雞子黃攪勻煎五分溫服

歌不應議吐吐傷中

中者陰之守也

必伏陰精上奉功

內經云陰精上奉其人壽

百合七枚洗去沫雞黃後入攪渾融

元犀按吐後傷中者病在陰也陰傷故用雞子黃養心胃之陰百合滋肺氣下潤其燥胃為肺母胃安則肺氣和而令行此亦用陰和陽無犯攻陽之戒王晉三云誤吐傷陽明者以雞子黃救厥陰之陰以安胃氣救厥陰即所以鎮陽明救肺之母氣是亦陽病救陰之法也

百合地黃湯 百合病不經吐下發汗病形如初者此湯主之

百合七枚

生地黃汁一升

右洗煎百合如前法取一升去滓納也黃汁煎取一升三合溫分再服

病勿更服大便當如漆

歌不經汗下吐諸傷形但如初守太陽遷延日久始終在太陽經不變者地汁一升百合七陰柔最是化陽剛

元犀按病久不經吐下發汗病形如初者是鬱久生熱耗傷氣血矣主之百合地黃湯者以百合苦寒清氣分之熱地黃汁甘潤洩血分之熱皆取陰柔之品以化陽剛為洩熱救陰法也中病者熱邪下洩由大便而出矣故曰如漆色

百合洗方 百合病一月不解變成渴者此方主之 右以百合一升以水一斗漬之一宿以洗身洗已食煮餅勿以鹹豉也

歌月週不解渴因成邪熱流連肺不清百合一升水一斗洗身食餅不和羹勿以鹹豉合參皮毛為肺之合洗其外亦所以通其內也又食煮餅者假麥氣穀氣以輸津勿以鹹豉者恐鹹味耗水以增渴也

括蔓牡蠣散 百合病渴不差者此散主之

括蔓根 牡蠣熬等分 右為細末飲服方寸匕日三服

歌洗而仍渴屬浮陽牡蠣蔓根並等量研末飲調方寸匕寒兼鹹苦苦寒鹹寒效逾常

元犀按洗後而渴不差是內之陰氣未復陰氣未復由於陽氣之亢故用牡蠣以潛其陽括蔓根以生其津津生陽降而渴愈矣

百合滑石散 百合病變發熱者此散主之

百合炙一兩

滑石三兩

右為散飲服方寸七日三服當微利者止服熱則除

歌

前此寒無熱亦無

首章言如寒無寒如熱無熱

變成發熱熱堪虞清疎滑石宜三兩百合烘篩一兩需

元犀按百合病原無偏熱之證變發熱者內熱充滿浮于肌膚非如熱之比主以百合滑石散者百合清金瀉火降逆氣從高源以導之滑石退表裏之熱利小便二味合為散者取散以散之之義散調絡脈於周身引内外之熱氣悉從小便出矣

甘草瀉心湯

治狐惑病狀如傷寒默默欲眠目不得開卧起不安蝕於喉為惑蝕於陰為狐不欲飲食惡聞

食臭其面目乍赤乍黑乍白蝕於上部則聲啞宜此湯蝕於下部則咽乾宜苦參湯洗之蝕於肛者雄黃之

甘草四兩

黃芩

乾薑

人參各三兩

半夏半升

黃連一兩

大棗十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

歌

傷寒論中甘草瀉心湯却妙增參三兩匡彼治痞成下利其此醫狐惑探源方

元犀按蟲有情識故能亂有情識之心臟而生疑惑矣蟲為血化之物故仍歸於生血之心方且類聚羣分

若有妖妄憑藉而然其實不外本身之血氣以為祟耳此方補虛而化濕熱雜以辛苦之味名曰瀉心意深

苦參湯

龐安時傷寒總論用苦參半斤槐白皮狼牙根各四兩煎熏洗之

苦參一升以水一斗煎取七升去滓熏洗日三次

雄黃熏法

雄黃一味為末筒瓦二枚合之燒向肛熏之