

卷十



張氏醫通卷十一

長洲石頑張

璐路王父纂述

以柔安世

叅訂

訥遜言

婦人門下

產後

經曰乳子而病熱脈懸小手足溫則生寒則死。

乳子中風熱喘鳴肩息者脈實大而緩則生急則死。

上條言產後以乳哺子之時而患熱病其脈只宜

懸小不宜實大者以產後新虛故也設脈雖懸小

而見手足逆冷又爲脾氣衰絕陰氣暴逆之候亦

主死也。下條言產後中風熱而至喘鳴肩息以風熱逆於陽位其脈必不能懸小。但須實大之中而往來和緩則脾胃之氣在其中矣。設見急疾胃氣已絕安得不死。後世以爲乳子二字誤認小兒如張介賓之明亦不加察且因此而謂小兒不當視虎口三關卽宜診兩手六部非智者之一失歟。

金匱云問曰新產婦人有三病一者病瘥二者病鬱胃三者大便難何謂也師曰新產血虛多汗出善中風故令病瘥亡血復汗寒多故令鬱胃亡津液胃燥故大便難產婦鬱胃其脈微弱嘔不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解

必大汗出。以血虛下厥。孤陽上出。故頭汗出。所以產婦善汗出者。亡陰血虛。陽氣獨盛。故當汗出。陰陽乃復。大便堅。嘔不能食。小柴胡湯主之。
病解能食。七八日能發熱者。此爲胃實。大承氣湯主之。

產後氣血俱虛。汗下皆禁。獨此一證。用大承氣者。乃證治之變。不當以尋常例測也。以其病解之後。尚有餘熱在胃。所以能食。食入既多。至七八日。更加發熱者。此必復傷飲食之故。故知胃有實結。恐其煎迫津液。故以急下救陰爲務。然必年體強旺。脈証俱實。且時日既久。與新產大便難不同。是可

議下。設遇胃虛之人。雖能食而所食不多。卽有發熱便秘。亦屬血虛急。宜調養氣血。斷非承氣所宜。不可恣行攻擊也。

產後腹中疴痛。當歸生薑羊肉湯主之。并治腹中寒疴。虛勞不足。若寒多者。加生薑皮一觔。痛多而嘔者。加橘皮一兩。白朮一兩。

產後腹中疴痛。乃寒積厥陰衝脈。故用辛溫以散血中之寒。助以血肉之性。大補精血。較諸補劑。功效懸殊。若腹痛兼嘔。而所嘔皆是稀痰。是知脾虛濁氣上逆。故加橘皮以宣散其氣。白朮以固護其脾。倘見血逆而嘔。所嘔渾是清水。腹脹滿急。則加

桃仁肉桂其見言外矣。至於寒疝虛勞少腹結痛。總是下焦寒結。亦不越是方也。

產後腹痛煩滿不得臥。枳實芍藥散主之。并主癰膿。以麥粥下之。

仲景凡治腹痛多用芍藥。以其能收陰氣之散也。以其能除血痺之痛也。以其能緩中而止急痛也。本草謂主邪氣腹痛。故多用之。蓋五氣之邪莫如厥陰肝水之性急暴。一有不平。則曲直作痛也。此方治疝痛用芍藥為主。佐以枳實炒黑入血破積。聚收陰緩中逐陳致新。麥粥補血下氣而壯血脈也。

師曰產婦腹痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此為腹中有乾血著臍下宜下瘀血湯主之亦主經水不利頓服之新血下如豚肝

血之燥乾凝著者非芍藥枳實可能治須用大黃桃仁蟅蟲下其血閉更加蜜以緩大黃之急也

產後七八日無太陽證少腹堅痛此惡露未盡不大便煩躁發熱切脈微實再倍發熱日晡時煩躁者不食食則讖語至夜即愈宜大承氣湯主之熱在於裏結在膀胱也

太陽為表膀胱為裏七八日表證入裏故曰無太陽證惡露已為病氣所鬱不能盡去邪因入裏與

惡露相搏結在膀胱而作少腹堅痛下焦熱極故不大便煩躁發熱更切其脈微實再倍其發熱在日晡時而煩躁不食熱邪又攻於胃胃熱則不食食入則穀氣之熱更助兩熱相併故譫語至夜即愈者產後血虛熱邪易入血室入血室則夜如見鬼狀言此以明其熱不在血室而在膀胱與胃故用大承氣湯也。

產後風續之數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下悶乾嘔汗出雖久陽旦證續在者可與陽旦湯。舉此與上文承氣湯爲表裏之例。

產後中風發熱面正赤喘而頭痛竹葉湯主之溫覆

使汗出頸項強用大附子一枚破之如豆入前藥湯去沫嘔者加半夏半升洗。

此證太陽上行至頭表陽明脈過膈上循於面二經合病多加葛根以葛根爲陽明解肌藥也防風佐桂枝去二經之風竹葉桔梗主氣上喘參草和中氣薑棗行營衛穀氣行則上下交濟而汗出解矣附子恐是方後所加治頸項強者以邪在太陽禁固其筋脈不得屈伸故用附子溫經散寒湯去沫者不使辛熱上浮之氣助其虛陽上逆也若邪在胸而嘔加半夏治之上言破之如豆入前藥舊本作如豆大今如徐忠可駁正。

婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大圓主之。有熱者倍白薇煩喘者加栝實一分。

乳中虛言乳哺而乳汁去多則陰血乏而胃中亦虛。陰乏則火撓而神昏亂。胃虛則嘔逆。用甘草瀉心火。石膏療煩亂。竹皮主嘔逆。桂枝和營氣。又宜導諸藥使無杆格之逆。煩喘者爲心虛火動。故加栝實以安之。

產後下利虛極白頭翁加甘草阿膠湯主之。

傷寒厥陰證熱利下重者用白頭翁湯。苦寒治熱以堅腸胃。此產後氣血兩虛故加阿膠甘草然不利血滯也。古人云血行則利自止。此方豈獨治產

後哉

婦人在草蓐。自發露得風。四肢苦煩。熱頭痛者。與小柴胡湯。頭不痛但煩者。千金三物黃芩湯。

自發露。謂自發衣露體得風。非邪外傷者。故不爲自汗風病。蓋產時天機開發。雖微風亦得入之。外感之風。內應之火。合化淫於四末。而作四肢苦煩。熱。上至於頭。作頭痛。病在表裏之間。故用小柴胡湯。主治少陽。若頭不痛。是無表也。惟肝膽風熱。內動。上膈作煩。故用黃芩退熱。苦參養肝。熟地補血。而益腎水。則肝膽之火寧矣。

婦人產後虛羸不足。腹中刺痛不止。吸吸少氣。或苦

少腹中急。摩痛引腰背。不能食飲。千金內補當歸建中湯。產後一月。日得服四五劑。爲善。令人強壯。若太虛。加飴糖六兩。湯成內之。於火上煖。令飴消。若去血過多。崩傷內衄不止。加地黃六兩。阿膠二兩。合八味湯成內阿膠。

產後血去。營衛俱虛。內不充於五藏。肝木妄動。脛腹中刺痛。上不充於臆中。遂吸吸少氣。下不濟於腎。故少腹急引。外連腰脊。六府不和。則不能食用。此以益營衛。伐肝邪。補中和內。○按此卽黃耆建中之變法。彼用黃耆以助外衛之陽。此用當歸以調內營之血。然助外則用桂枝。調中則宜肉桂。兩

不移易之定法也

千金二字義見中風門方千金三黃湯下

諸禁○一禁臥二禁酒三禁浴四禁寒五禁汗六禁下七禁利小便八禁寒涼藥九禁起動作勞蓋初產血氣未定遽臥則惡血上升故分娩之後須高臥仰倚切不可卽臥三朝始可稍去其壅尙宜高枕七日後如無他病方可安枕多有半月後未能貼席者酒能助火亂經誤用不無動血之虞至如雞子猪腎一切滯氣堅紉難化物及生冷膩滑皆不可食卽砂仁湯亦能動血咸在禁例浴能升動惡露雖當夏月亦須禁之曾有產數日後因浴瘀血上衝而斃者亦有因浴動血誤用寒涼瘀結不行血化爲水喘滿腫脹

而死者不可不慎也。新產驟虛最忌著寒。寒則血氣凝滯。諸變元生。每至飲食不化。腹痛作瀉。禍患莫測。欲去其瘀。則正氣并脫。欲止其瀉。則瘀結不行。惟薑桂參朮辛溫峻補。庶幾血行瀉止。故冬月一產卽宜重綿兜護其腹。在夏月亦當複巾裹之。機要云。胎產之病。從厥陰。無犯胃氣。及上中二焦。爲之三禁。不可汗。不可下。不可利小便。制劑之法。能不犯三禁。則營衛自和而寒熱止矣。故產後雖有表證。一切風藥皆不可用。以其性升。不特載血上行。令人發暈。抑且令人凶陽。多致汗脫而死。不特風藥當禁。卽佛手散中芎藭皆爲散用。恐湯能發汗也。至於下藥尤爲切禁。

非特硝黃難於輕試。卽洩便數難者。只宜調養元氣。若車前澤瀉之類。咸非所宜。以產後百脈空疎。自裏至表。無一不虛。虛則諸寒皆禁。卽芍藥亦難輕用。以其酸寒伐生發之氣也。地黃皆當慎用。以純陰之味。能令作瀉也。黃芩能凝滯瘀血。令人惡露不行。爲害不淺。然皆產後常禁。設有表裏客邪。又不當拘於上說也。試觀金匱產後例中。陽旦湯之用芩芍。以其中有桂也。薛按八珍十全之用熟地芍藥。以其中有參朮及桂也。豈復拘於此例哉。況乎大承氣小柴胡三物黃芩下瘀血等方。皆產後治例。此聖人臨證如日大轉回天之手。非尋常下土可得而測識也。迨夫早

起作勞。不避風寒。不禁飲食。往往致成大病者。皆自
作之孽耳。○凡產後之脈。寸口洪疾。不調者死。沉微
附骨不絕者生。緩骨沉小者吉。實大弦急者危。半革
結代。及瀉滯不調者不治。

血暈○產後元氣虧損。惡露乘虛上攻。眼花頭暈。或
心下滿悶。神昏口噤。或痰涎壅盛者。急用熟重便主
之。若血下多而暈。或神昏煩亂者。芎歸湯加入參三
五錢。澤蘭葉一握。童便半盞。兼補而散之。痰合二陳
加烏梅薑汁。并用鐵秤鎚燒令赤。以醋沃之。或燒漆
器并亂髮以烟熏之。產後因虛火載血上行而暈。用
鹿茸灰爲細末。好酒童便灌下。一呷卽醒。行血極快。

產後昏暈嘔逆不能飲食。此胃虛挾痰所致。以抵聖散去赤芍加炮薑茯苓。慎不可用芍歸血藥。臍膈其嘔逆愈不能止矣。○初產血暈速與扶起勿臥。用韭菜一握切碎入有嘴磁瓶中。將醋煎滾澆入瓶內急蓋瓶口以嘴向婦鼻孔令氣透入鼻中。卽蘇若惡露未盡忽昏悶不省人事。須問先因感氣而下胎者以二陳加芍歸香附桃仁山查薑汁。切不可作中風治。產後口眼喎斜等證。當大補氣血十全大補下黑龍丹。肥人佐以痰藥。如星牛木香之類。若作中風治而用小續命必殆。若腹中刺痛者。嚴氏清魂散。血暈語言顛倒健忘失志。此血入心包。宜失笑散加鬱金或