

S294

46-3419

陳修園醫書五十種  
十九



傷 訣

寒 串

醫 解



序

傷寒醫訣串解者長樂陳修園先生晚年所編集也惜六篇之中尙缺其一以其未成書故不及付梓其門徒猶子陳道著有盧扁風閩之名醫也既能學先生之學又能承先生之志日嘗手披而秘藏之復體會其遺意而敬續一篇以補其缺合成六篇而篇帙遂成茲修園古矣其猶子道著亦古矣閩中林子壽萱專心衛世於舊書肆中檢得脩園先生註解葛可久十藥神書一卷購而珍存之并恐此二種沒而不彰因細加讐校韻而錄之欲與兩先生傳名兼以傳世值余奉命巡撫全閩因舊疾復起探知林子精於療治常勞診視論及閩中名醫林子以陳修園陳道著兩先生對敬以修園先生所著南雅堂十一種醫書見示且余本善病人也又耳熟是書久矣適林子復以傷寒醫訣串解手錄一通乞序於余余不敏每兢兢官守尙恐才不足以經世何暇論及衛世然串解實補傷寒淺註所未備不可以無傳若再附以

十藥成書註解合而刻之庶可以作岐黃家秘本矣今之術岐黃者果能默  
會精審互相參校其裨益良不淺也姑就林子所述其緣起爲之弁數語於  
簡端云爾

咸豐丙辰秋九月望後三日福建巡撫呂佺孫書



序

彙集傷寒淺註凡三百九十七法依法條晰期於明  
易曉而又慮學者未能融會貫通而得其要旨也不揣  
固陋復爲綜貫衍繹名曰傷寒醫訣串解其於疑似細  
微之處抉剔詳辨頗費苦心脩園老矣敢謂於此道三  
折肱然有志之士誠能卽此紬繹其端緒推尋其綱領  
而不眩於似是而非未必非活國活人之一助也

閩長樂陳念祖修園識

傷寒醫訣串解目錄

卷之一

太陽篇

卷之二

陽明篇

卷之三

少陽篇

卷之四

太陰篇

卷之五

少陰篇

卷之六

厥陰篇



傷寒醫訣串解卷一

閩長樂陳念祖修園著

太陽篇第一

太陽爲寒水之經主一身之表

何謂太陽經症曰頭痛項強發熱惡寒是也有虛邪實邪之辨

脈緩自汗惡風爲虛邪宜桂枝湯

如八九日過經不解如瘧狀面熱身癢以其不得

小汗故也宜桂枝麻黃各半湯

因前此未汗不得不發其汗因日數頗久故小發其汗

如服桂枝湯大汗出後形如瘧日再發者

以餘邪未盡故也宜桂枝二麻黃一湯大

汗之後不得再行大汗之法而餘邪未盡

不得不從汗而竭之但藥品宜輕耳

脈浮緊無汗惡寒爲實邪宜麻黃湯

如無汗煩躁者加石膏薑棗名大青龍湯如

乾嘔而咳去杏仁加五味乾姜半夏細辛芍藥

名爲小青龍湯此二湯卽麻黃湯之加

減總不出麻黃湯之範圍此二法治表中之表也

何謂太陽府症曰表邪不去必入於裏膀胱爲表中之裏也有蓄水蓄血之辨

太陽症其人口渴煩躁不得眠脈浮小便不利水入卽吐爲膀胱蓄水症宜五苓散

太陽症其人如狂小腹鞭滿小便自利脈沉爲膀胱蓄血症宜桃仁承氣湯此二法治

表中之裏也

何謂太陽變症曰汗下失宜從陰從陽之不一也

不應下而下之。續得下利清穀。身疼痛。宜四逆湯以救清穀之裏。又以桂枝湯以救身疼痛之表。

病發熱頭痛。脈反沈。若不瘥。身體疼痛。當救其裏。宜四逆湯。

大汗大下利而脈冷者。四逆湯主之。

太陽病發汗太過。遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難以屈伸。桂枝加附子湯主之。

太陽病發汗太過。動其榮血。而衛邪反內伏。其人仍發熱。心下悸。頭眩。身瞤動。振振欲擗地者。真武湯主之。

已上言汗下太過。傷正而虛。其陽陽虛則從少陰。陰化之症。多以太陽少陰爲表裏也。陽盛於內。誤服桂枝湯。大汗出後。大煩大渴不解。脈洪大者。白虎加人參湯主之。

傷寒若吐若下後。七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時惡風。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升者。白虎加人參湯主之。

傷寒不大便六七日爲裏症。頭痛發熱爲表症。外不解由於內不通也。下之裏和而表自解矣。與承氣湯。

病人煩熱。汗出則解。又如瘧狀。日晡所發熱。屬陽明也。脈實者宜下之。與大承氣湯。脈虛者宜發汗。與桂枝湯。發汗後惡寒者。虛故也。不惡寒但熱者。實也。當和胃氣。與調胃



承氣湯

太陽病未解。脈陰陽俱停。停者沈滯不起也。陰陽者尺寸也。先振慄。汗出乃解。但陽脈微者。先汗而解。但陰脈微者。下之而解。若欲下之。宜調胃承氣湯。按此脈微。即上文脈停也。已上言汗下失宜。熱熾而傷其陰。陰傷則從陽明。陽化之症。多以太陽陽明遲相傳也。

何謂發汗利水。爲治太陽兩大門。曰邪傷太陽病。在寒水之經。驅其水氣以外出。則爲汗。逐其水氣以下出。後爲黃涎蓄水。前爲小便長。

太陽爲寒水之經。邪之初傷。必須發汗。麻黃湯發皮膚之汗。桂枝湯發經絡之汗。葛根湯發肌肉之汗。小青龍湯發心下之汗。大青龍湯發其內擾胸中之陽氣而爲汗。此發汗之五法也。若汗之而不能盡者。則爲水。水在心下。乾嘔而咳。宜小青龍湯發熱而煩渴欲飲水。水入即吐。名曰水逆。宜五苓散。汗後心下痞硬。乾噫食臭。脇下有水氣。腹中雷鳴下利者。病勢雖在腹中。而病根猶在心下。宜生姜瀉心湯。此水氣在上焦。在上者汗而散之也。若妄下之後。自心上至小腹硬滿而痛不可近。所水與氣結脈遲名大結胸。宜大陷胸湯。若項亦強如柔痙之狀。宜大陷胸丸。蓋病勢連於下者。主以湯。病勢連於上者。主以丸是也。若其結止在心下。按之始痛。脈浮滑。名小結胸。邪氣尚在脈絡。宜小陷胸湯。若無熱症。名寒實結胸。宜三物白散。若心下痞鞭滿引脇

下痛乾嘔短氣汗出不惡寒三焦升降之氣阻格難通宜十棗湯此水氣在中焦中滿瀉之於內也若頭痛項強翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者因膀胱之水不行營衛不調不能作汗宜以桂枝去桂加茯苓白朮湯治之是水氣在下焦在下者引而竭之是也

內經云太陽之上寒氣治之所謂本也本之下中之見也見之下氣之標也又曰太陽從本從標又曰太陽爲開又熱病論曰傷寒一日巨陽受之故頭項痛腰脊強傷寒論云太陽之爲病脈浮頭項強痛而惡寒又云太陽病發熱汗出惡風脈緩者名爲中風又云太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之又云太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

太陽主一身之表六經中最外一層故表病俱屬太陽俱有表中之表病在肌腠則有汗宜桂枝湯病在膚表則無汗宜麻黃湯兩法用之得當一劑可愈又有脈微惡寒面色反有熱色而身癢是邪欲出而未得遽出必得小汗而解宜桂枝麻黃各半湯又有服桂枝湯大汗出後形如瘧日再發是肌病兼見表病宜桂枝二麻黃一湯是二方卽上兩法之佐也然二方能治肌腠膚表之病不能治經輸之病太陽之經輸在背內經云邪入於輸腰背乃強論中以項背強几几無汗惡風用葛根湯項背



強凡反汗出惡風用桂枝加葛根湯二方亦上兩法之佐也但兩法俱是太陽本寒之症故方中取用辛熱之品若太陽標熱之症自汗症不得逕用桂枝湯宜用藥甘草湯以各症與桂枝症無異惟脚攣急獨異是太陽之標熱合少陰之本熱之病也無汗症不得用麻黃湯宜用麻杏甘膏湯以各症與麻黃證相似惟初起口渴發熱而無惡寒或發汗已身灼熱不似論雖另別為溫病風溫之證然節首冠以太陽病三字蓋指太陽之標熱而言明明為一隅之舉不讀內經不能解也其云桂枝二越婢一湯為標內陷於裏陰而化熱故熱多寒少而脈微弱論曰無陽言無在表之陽也論曰不可發汗言不可發太陽之表汗也故用此湯直從裏陰而外越之也此又可借用為上兩法之佐也然太陽為表而亦有裏膀胱即太陽之裏也如太陽症發熱無汗而心下滿微痛小便不利不宜取汗宜桂枝去桂加茯苓白朮湯令小便便利則愈又有發汗後脈浮小便不利微熱消渴之症又有中風發熱六七日不解而煩為表症渴欲飲水為裏症論名曰表裏症水入則吐論名曰水逆證兩證俱宜五苓散多飲煖水以出汗此表中裏症之治法也至若大青龍湯因脈浮緊身疼痛不汗出而煩躁為麻黃證之重者而設小青龍湯因表不解水停心下而咳噎變大青龍湯之大寒大散而為發汗利水之劑即是麻黃湯之加減總不出麻黃湯之範圍即若桂枝去芍藥湯因桂枝症誤下脈促胸滿而設桂枝去芍藥加附子湯又因

前症脈不見促而見微身復惡寒而設桂枝加附子湯因發汗太過遂漏不止惡風小便難四肢微急難以屈伸而設此因大汗以亡陽因亡陽以脫液取附子以固少陰之陽固陽即所以止汗救液也推之汗後病已解復煩及桂枝病初服桂枝湯反煩不解刺風池風府却再與桂枝湯則愈其用甚廣總不出於桂枝證頭痛發熱汗出惡風八個字之外須知太陽治法不外桂枝麻黃二湯服麻黃湯之後復有再服桂枝湯之法服桂枝湯之後並無再服麻黃湯之法更須知太陽爲寒水經病本寒者較多病標熱者較少若標本兼病亦以熱多寒少爲欲愈治傷寒者當知所重矣此論太陽病以桂枝麻黃二湯爲主一線到底千古註家無此明晰外此亦即桂湯之更進一步非離乎二湯之外而立法也太陽主一身最外一層邪從外來須要驅之使出服上二湯尙不能出或留本經或侵他經必藉少陽之樞轉以達太陽之氣而外出也故小柴胡湯爲太陽篇之要劑今人不知擅改爲少陽主方失之遠矣故無論桂枝證麻黃證若值三日九日十五日少陽主氣之期必藉其樞轉而出或又見往來寒熱樞不轉現出開闔不利之象胸脇若滿胸乃太陽出入之部脇爲少陽所主之樞默默不欲食心煩默默必神機內鬱而心煩喜嘔不欲食必胃氣不和而喜嘔嘔則逆氣少疏故喜也或涉於心而不涉於胃則胸中煩而不嘔或涉於陽明之燥氣則渴或涉於太陰之脾氣則腹中痛或涉於厥陰之肝氣則脇下痞鞭或

涉於少陰之腎氣則心下悸而小便不利或太陽藉少陽之樞轉已有向外之勢則不渴身有微熱或涉於太陰之肺氣則咳者皆以小柴胡爲主而隨其或然之證加減而治之若太陽病過經不解先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩與大柴胡湯下之以平其胃則愈凡太陽篇有柴胡之方或因其病象有從樞欲達之意而以柴胡達之抑因其久鬱未解之邪而以柴胡可以從樞達之無非乘機利導之法亦卽麻黃桂枝二湯進一步之佐也推而言之太陽之氣外行於胸膈不能外而病於內實則爲大小陷胸湯證虛則爲諸瀉心湯證且太陽之氣上行而至於頭下行而歸於腹不能上而病於下從背而下結於胞室則爲桃仁承氣湯證從胸而下瘀於胞室則爲抵當湯證何莫非桂枝麻黃二湯應用不用或用之失法所致哉蓋太陽經正治法不過二十餘條而已其他則皆權變法幹旋法也假使治傷寒者審其脈之或緩或緊辨其症之有汗無汗則從而汗之解之如桂枝麻黃等法則邪却而病除矣其或合陽明或合少陽或合三陽者則從而解之清之如葛根湯治太陽陽明合病下利葛根加半夏湯治合病不下利而但嘔者黃芩湯治太陽少陽合病而自利黃芩加半夏生薑湯治合病而嘔者如白虎湯治三陽合病其云腹滿者爲陽明經熱合於前也其云身重者爲太陽經熱合於後也其云難以轉側者爲少陽經熱合於側也其云口不仁而面垢者熱合少陽之府也其云譫語者熱合陽明之府也

其云遺尿者。熱合太陽之府也。既審其爲三陽之合。又必得自汗出之的證。而後用白虎湯之的方。斯邪分而病解。此爲正治之法。顧人氣體有虛實之殊。藏府有陰陽之異。或素有痰飲痞氣。以及咽燥淋瘡。汗衄之疾。或適當房室。金刃產後亡血之餘。是雖同爲傷寒之候。不得竟用麻桂之法矣。於是。有旋覆代赭石湯。治傷寒汗吐下解後。心下痞。噯氣不除。是胃氣弱而。禾和痰氣動。而上逆之症。自茯苓桂枝白朮甘草湯。治吐下後邪解。而爲飲發之證。金匱云。臍間支飲。其人喘滿。心下痞堅。又云。心下有痰飲。胸脇支滿。目眩。又云。其人振振身瞤。劇者必有伏飲。其云發汗則動經者。言無邪可發。而反動其經氣也。有承氣湯。治傷寒六七日不大便。頭痛有熱。必衄。以陽熱太重。以此湯承在上之熱氣。而使之下也。有小建中湯。以治傷寒二三日心悸而煩。補中氣。以生心血。有炙甘草湯。治脈結代。心動悸。啓腎陰。以行於脈道。有四逆湯。治發熱頭痛。脈反沈。身體疼痛。扶腎陽。以救其虛陷。是爲權變之法。而用桂枝麻黃等法。又不能必其無過與不及之弊。或汗出不徹。而邪不外散。則有傳變他經。及發黃蓄血之病。如中風以火劫汗。則兩陽熏灼。其身發黃。陽盛則欲衄。陰虛則小便難。甚則見發蟻。譫語。捻衣摸床。諸危症。服藥得小便利者。方可治之。如桂枝證外不解。而熱結膀胱。其人如狂。血得自下。乃愈。若小腹急結。有桃仁承氣湯之輕攻法。如麻黃證表不解。脈微而沉。其人狂。其邪反不結於胸。而直下於少腹。而鞭滿爲瘀。

熱在裏。又身黃。脈沉結。小便不利。不爲水而爲血。其血不能自下。必攻而始下。又有抵當湯之峻攻法也。或汗出過多而并傷其陽氣。則有振振擗地肉。瞶筋惕爲真武湯之證。有發汗後血液內亡。身疼痛。脈沉遲者。爲桂枝加芍藥生薑人參新加湯證。有發汗過多。虛其心氣。其人叉手冒心。喜按者。爲桂枝甘草湯證。有發汗後虛其腎氣。臍下悸。欲作奔豚。爲茯苓桂枝甘草大棗湯證。有發汗後傷其中氣。不能運行。升降而腹脹滿。爲厚樸生薑甘草人參半夏湯證。有發汗後反惡寒。陰陽兩虛。爲芍藥甘草附子湯證。且有更發汗。小發汗。論中有論而無方。亦可以意會之。是爲轉旋之法。學者宜究心焉。

傷寒醫訣串解卷一終



傷寒醫訣串解卷二

閩長樂陳念祖修園著

陽明篇第二

陽明主裏外候  
肌肉內候胃中

何謂陽明經症。曰身熱目痛鼻乾不得眠反惡熱是也。有未罷太陽已罷太陽之辨。若兼見頭痛惡寒是太陽症未罷。自汗脈緩宜桂枝湯。項背強几几葛根湯。主之。無汗脈浮宜麻黃湯。項背強几几葛根湯主之。若無頭痛惡寒但見壯熱口渴是已罷太陽為陽明經之本症。宜白虎湯主之。何謂陽明腑症。曰潮熱譫語手足腋下濺然汗出腹滿大便鞭是也。有太陽陽明少陽陽明正陽陽明之辨。

本太陽症治之失法亡其津液致太陽之熱乘胃燥而轉屬陽明其症小便數大便硬傷寒論謂之脾約宜麻仁丸。已上言太陽陽明之症也。

本少陽病治之失法亡其津液致少陽之邪乘胃燥而轉屬陽明為大便結燥傷寒論謂為大便難以蜜煎膽汁導之。已上言少陽陽明之症也。

病人陽氣素盛或有宿食外邪傳入遂歸於胃腑傷寒論謂為胃家實宜以三承氣湯下之。已上言正陽陽明之症也。

陽明在經未離太陽宜汗之既離太陽宜清之在腑審其輕重宜下之若在經絡之