

古今

名醫驗方類編

古今名醫驗方類編目錄

卷三 通治部

霍亂門

霍亂吐瀉	一
乾霍亂	二
霍亂轉筋	二
轉筋入腹	三
霍亂須吐	三
霍亂欲死	三
霍亂煩悶躁渴	三
伏暑霍亂	四
霍亂脹痛	四
霍亂腹痛	四
霍亂嘔惡	五
霍亂厥逆	五
霍亂成痢	五
吐痢卒死	五

霍亂困篤	五
吐瀉不止	五
霍亂煩脹	五
霍亂吐逆	五
霍亂大渴	五
霍亂不通	五
乾濕霍亂	五
中惡霍亂	五
風痰霍亂	五
霍亂不進藥食	五
傷寒門	
傷寒初起	五
傷寒謔語	六
傷寒咳逆	六
傷寒狐惑	六
傷寒陽毒	六
傷寒發汗	六

傷寒無汗	六
傷寒發狂	七
傷寒煩血	七
傷寒頭痛	七
傷寒咽痛	七
傷寒煩渴	七
傷寒心悸	七
夾驚傷寒	七
傷寒腹脹	七
傷寒目翳	七
乾嘔脇痛	八
傷寒肢痛	八
傷寒舌出	八
傷寒胸痛	八
傷寒熱結	八
傷寒結胸	八
傷寒血結	八



傷寒餘熱	八	夾陰傷寒	一	桃葉發汗	一四
傷寒時疫	八	陰盛格陽	一	風熱驚狂	一五
傷寒氣喘	九	陰症呃逆	一	橘皮湯	一五
傷寒乾嘔	九	少陰傷寒	一	文蛤散	一五
傷寒厥逆	九	少陰下痢	一	正陽丹	一五
傷寒搖擗	九	傷寒勞復	一二	茵陳黃	一六
傷寒懊憹	九	傷寒食復	一二	傷寒雪煎	一六
傷寒呃噎	九	傷寒不解	一二	紫雪	一六
下早成痞	九	傷寒發黃疸	一二	傷風門	
傷寒尿澀	九	傷寒黃疸	一二	風寒流涕	一六
傷寒赤斑	九	四肢傷寒	一三	偶感風寒	一六
傷寒下痢	九	急傷寒病	一三	感冒風寒	一六
傷寒下蠱	一〇	熱病吐下	一三	風祕氣祕	一六
傷寒動氣	一〇	傷寒時疫	一三	惡風入腹	一六
傷寒脫陽	一〇	預防勞復	一三	傷風下痢	一六
傷寒毒攻	一〇	百合病	一三	風寒無汗	一六
傷寒痞滿	一〇	百合變渴	一三	初感風寒	一六
傷寒發躁	一〇	百合變熱	一四	風濕發汗	一六
陰症傷寒	一〇	百合腹痛	一四	中寒門	
陰毒傷寒	一〇	一切傷寒	一四	中寒昏困	一六

感寒上氣.....一六

感寒無汗.....一六

腹中痞硬.....一六

發散邪寒.....一六

冬月感寒.....一六

內傷寒中.....一六

寒澀宿食.....一七

虛寒積滯.....一七

陰痺毀法.....一七

三建湯.....一七

中濕門

中濕骨痛.....一七

濕氣作痛.....一七

濕熱水病.....一七

濕熱眩暈.....一七

濕熱氣.....一七

風濕冷痺.....一七

濕氣中滿.....一七

渾身拘痛.....一七

蒼朮散.....一八

癰冷門

久冷反胃.....一八

一切冷氣.....一八

元藏久冷.....一八

元藏冷泄.....一八

元藏腹冷.....一八

腹中冷癖.....一八

諸冷極病.....一九

冷勞久病.....一九

大腸積冷.....一九

冷症伏火.....一九

腎藏虛冷.....一九

積冷痲痺.....二〇

虛冷短氣.....二〇

心腹冷痛.....二〇

宿冷惡病.....二〇

下焦冷氣.....二〇

薤苳仁飯.....二〇

快膈湯.....二〇

烏沉湯.....二〇

麻木門

麻木疼痛.....二〇

麻痺疼痛.....二〇

十指疼痛.....二〇

年久麻痺.....二〇

手足麻痺.....二〇

項強身急.....二〇

腹皮麻痺.....二〇

身體麻木.....二〇

風痰麻木.....二〇

風病麻木.....二〇

面上木痺.....二〇

三蛇愈風丹.....二〇



古今名醫驗方類編卷三

通治部

霍亂門

●霍亂吐瀉

【救急良方】勿食熱物飲井華水一碗仍以水一盆浸兩足立止

【主治】霍亂及中暈卒死者用地漿一升飲之妙取時掘黃土三尺以新汲水沃之入攪濁少頃取清用之故曰地漿亦曰土漿

【兵部手集方】酸漿水煎乾薑屑呷之 嘉謨曰漿酢也炊粟米熟投冷水中浸五六日味酢生白花色類漿故名若浸至敗者害人

【發明】凡脾胃濕多吐瀉霍亂者以東壁土新汲水攪化澄清服之即止蓋脾主土喜燥而惡濕故取太陽真火所照之土引真火生發之氣補土而勝濕則吐瀉自止

【經驗方】鍋底墨煤半錢灶額上墨半錢百沸湯一盞急攪數千下以盥覆之通口服一二口立止

【衛生易簡方】屋下倒掛塵滾湯泡澄清服即止
【指南方】冷熱霍亂分利陰陽元精石半夏各一兩硫黃三錢爲末麪糊丸梧子大每米飲服三十九

【聖濟錄】硫黃一兩胡椒五錢爲末黃蠟一兩化

九桂子大食酒力一

【華陀危病方】枯白礬末一錢百沸湯調下

【聖濟總錄】煩躁不止人參二兩橘皮三兩生薑一兩水六升煮三升分三服

【外臺方】火炙高良薑令焦香每用五兩以酒一升煮三四沸頓服亦治腹痛中惡

【普濟方】肉豆蔻爲末薑湯服一錢

【百一選方】垂死者服之回生用藿香葉陳皮各半兩水二盞煎一盞溫服

【外臺祕要方】不止以艾一把水三升煮一升頓服

【食醫心鏡方】篇竹入豉汁中下五味煮羹食

【孫兆祕寶方】不止用附子重七錢者炮去皮臍爲末每服四錢水二盞鹽半錢煎一盞溫服立

【本草方】山豆根末橘皮湯下三錢

【聖惠方】防己白芷等分爲末新汲水服二錢

【普濟方】煩渴欲絕用硬米二合研粉入水二盞研汁和淡竹瀝一合頓服

【外臺方】霍亂煩躁黃梁米粉半升水升半和攪如白粉頓服

【生生編】綠豆粉白糖各二兩新汲水調服卽愈

【聖惠方】豌豆三合香葉三兩爲末水三盞煎一盞分二服

【千金方】扁豆香薷各一升水六升煮二升分服

【如宜方】鹽醋煎服甚良

【聖濟總錄】芥子搗細水和敷臍上

【如宜方】鹽梅煎湯細細飲之

【聖惠方】梨枝煮汁飲

【百一選方】不拘男女但有一點胃氣存者服之
再生廣陳皮去白五錢真藿香五錢水二盞煎
一盞時溫服

【聖惠方】用陳皮末二錢湯點服不省者灌之仍
燒磚沃醋布裹磚安心下噤之便活

【孫真人方】用胡椒三十粒以飲吞之

【直指方】用胡椒四十九粒綠豆一百四十九粒
研勻木瓜湯下一錢

【聖惠方】生藕搗汁服之

【集元方】儉本人頭縉以百沸湯泡汁服一呷勿
令知之

【事海文山方】出路在家應急方用路旁破草鞋
去兩頭洗三四次水煎湯一盞滾服之即愈

【肘后方】蠟一彈丸熱酒一升化服即止

【劉涓子鬼遺方】用烏牛齡草一團人參生薑各
三兩甜漿水一升半煮汁五合服

【外臺方】四肢逆冷用黃牛屎半升水二升煮三
沸服半升止

【聖惠方】用烏牛糞絞汁一合以百日兒乳汁一
合和溫服

●乾霍亂

【千金方】不吐不利脹痛欲死地漿三五盞服即
愈大忌米湯

【摘元方】千年石灰沙糖水調服二錢或醋湯亦
可名落盞湯

【發明】頌曰唐柳州纂救三死方云元和十一
年十月得霍亂上不可吐下不可利出冷汗三

大斗許氣即絕河南房偉傳此方入口即吐絕氣復通一法用鹽一大匙熬令黃色用童子小便一升合和溫服少頃吐下即愈

【小品方】心腹脹痛蘆蓬茸一把水煮濃汁頓服一升

【韋宙獨行方】以薤一虎口以水三升煮取一半頓服不過三作即已

【聖濟總錄】心腹脹痛不吐不利煩悶欲死用檳榔末五錢童子小便半盞水一盞煎服

【聖濟總錄】吳茱萸炮炒乾薑炮等分水煎服之

【孫思邈千金方】丁香十四枚研末以沸湯一升和之頓服不瘥更作

【本草方】巴豆一枚去皮心熱水研服得吐利即定也

【發明】劉義慶幽明錄云張甲與司徒蔡謨有親謨晝寢夢甲忽暴病心腹脹滿不得吐下名乾霍亂惟用蜘蛛生斷脚吞之即愈但人不知甲某時死矣謨覺使人驗之果死矣後用此治乾霍亂輒驗也按此說雖怪正合唐註治嘔逆霍亂之文當亦不謬蓋蜘蛛服之能令人利也

【十便良方】脹滿煩躁亂髮一團燒灰鹽湯一升和服取吐

●霍亂轉筋

【嘉祐本草方】以器盛湯熨之仍令蹋器使足底熱徹冷則易

【聖濟錄方】青銅錢四十九枚木瓜一兩烏梅炒五枚水二盞煎分溫服

【外臺祕要方】身冷心下微溫者硃砂研二兩或



三兩和丸著火籠中薰之周圍厚覆之勿令煙

洩兼牀下著火令腹微煖良久當汗出而甦

【救急方】欲死氣絕腹有暖氣者以鹽填臍中灸

鹽上七壯即甦

【聖濟總錄方】腹痛木香末一錢木瓜汁一盞入

熱酒調服

【聖惠方】肝虛轉筋吐瀉赤蓼莖葉切三合水一

盞酒三合煎至四合分三服

【藥性論方】蓼葉一升水三升煮取汁二升入香

鼓一升更煮一升半分三服

【普濟方】白扁豆爲末醋和服

【聖濟錄】入腹殺人以小蒜鹽各一兩搗傳臍中

灸七壯立止

【外臺祕要方】入腹欲死生薑三兩搗酒一升煮

三兩沸服仍以薑搗貼痛處

【聖惠方】木瓜一兩酒一升煎服不飲酒者煮湯

服仍煎湯浸青布裹其足

【聖惠方】柏葉搗爛裹脚上及煎汁淋之

【經驗方】以煖物裹脚後以柏木片煎湯淋之

【深師方】皂角末吹豆許入鼻取嚏即安

【聖惠方】入腹煩悶桑葉一握煎飲一二服立定

【肘后方】心腹脹滿未得吐下卮子二七枚燒研

熱酒服之立愈

【千金方】入腹無可奈何者以酢煮青布搽之冷

則易

【聖惠方】腹痛以苦酒煮綿絮裹之

【陳藏器本草方】故蓆鞋底燒赤投酒煮取汁服

【千金方】入腹痛用敗小木梳一枚燒灰酒服永

瘥

【聖惠方】垂死者敗蒲蓆一握切漿水一盞煮汁

溫服

【千金方】入腹痛車轂中脂塗足心

●轉筋入腹

【肘后方】釜底墨末和酒服一錢

【聖濟錄方】茱萸炒二兩酒二盞煎一盞分二服

得下即安

【張仲景方】其人臂脚直其脈上下微弦用雞屎

爲末水六合和方寸七溫服合

●霍亂須吐

【發明】時珍曰霍亂及乾霍亂須吐者以樟木屑

煎濃汁吐之甚良

●霍亂欲死

【梅師方】生薑五兩牛兒屎一升水四升煎二升

分再服即止

●霍亂煩悶躁渴

【聖濟總錄】向陽壁土煮汁服

【聖濟總錄】霍亂煩滿氣逆腹脹手足厥冷不灰

木陽起石煨阿魏半兩巴豆去心杏仁去皮各

二十五個爲末粟飯丸櫻桃大穿一孔每服一

丸燈上燒煙盡研末薑湯下以利爲度

【聖惠方】人參五錢桂心半錢水二盞煎服

【聖濟總錄方】草豆蔻黃連各一錢半烏豆五十

粒生薑三片水煎服之

【千金方】蘆根三錢麥門冬一錢水煎服

【聖惠方】蘆葉二握水煎服 又方蘆葉五錢糯

米二錢半竹茹一錢水煎入薑汁蜜各半合煎

兩沸時時呷之

【聖惠方】蓼子一兩香薷二兩每服二錢水煎服

【聖惠方】蘆根炙一兩半水萍焙人參枇杷葉炙

各一兩每服五錢入薤白四寸酒煎溫服

【楊氏產乳方】糯米三合水五升蜜一合研汁分

服或者煮汁服

【外臺方】黃梁米粉半升水升半和攪如白粉頓

服

【深師方】坐臥不安葱白二十莖大棗二十枚水

三升煎二升分服

【主治時珍】聖惠方每嚼木瓜核七粒溫水嚥服

之

【聖濟總錄方】茶葉末一錢煎水調乾薑末一錢

服之即安

【聖濟總錄】藕汁一鍾薑汁半鍾和勻飲

【聖惠方】槐葉桑葉各一錢炙甘草三分水煎服

●伏暑霍亂

【鄭氏小兒方】伏熱吐瀉陰陽丸用硫黃半兩水

銀一錢研墨薑汁糊丸小豆大三歲三丸冷水

下大人三四十九

【普濟方】或吐或瀉或瘧小便赤煩渴玉液散用

桂府滑石燒四兩藿香一錢丁香一錢爲末米

湯服二錢

【禹講師經驗方】滑石炒二兩藿香二錢半丁香

五分爲末每服一二錢浙米泔調服

【本草方】小便不利頭暈引飲三白散用澤瀉白

朮白茯苓各三錢水一盞薑五片燈心十莖煎

八分溫服

【本草方】陳倉米二升麥芽四兩黃連四兩切同蒸熟焙研爲末水丸梧子大每服百丸白湯送下

【和劑局方】傷冷吐利煩濕水浸丹用巴豆二十個去皮心及油黃丹炒研一兩二錢半化黃蠟和丸綠豆大每服五七丸水浸少頃別以新汲水吞下

●霍亂腹痛

【肘后方】未得吐下用生紫蘇搗汁飲之佳乾蘇煮汁亦可

【太平聖惠方】蘆根一升生薑一升橘皮五兩水八升煎三升分溫服

【肘后方】半夏桂等分爲末水服方寸匕

【聖惠方】生薑蒲剉四兩水和搗汁分溫四服

【普濟方】大豆生研水服方寸匕

【肘后方】不得吐下名乾霍亂小蒜一升水三升煮一升頓服

【瀕湖集簡方】蕪菁子水煮汁飲之

【肘后方】用生薑一斤水七升煮二升分三服

●霍亂腹痛

【救急方】炒鹽一包熨其心腹令氣透又以一包熨其背

【聖惠方】高良薑一兩剉以水三大盞煎二盞半去渣入粳米一合煮粥食之便止

【外臺方】桃葉三升切水五升煮一升分二服

【聖惠方】木瓜五錢桑葉三片棗肉一枚水煎服之

【本草方】用厚朴炙四兩桂心二兩枳實五枚生

薑二兩水六升煎取二升分三服此陶隱居方

也 唐石泉公王方慶廣南方云此方不惟治

霍亂凡諸病皆治 聖惠方用厚朴薑汁炙研

末新汲水服二錢如神

●霍亂嘔惡

【衛生家寶方】人參二兩水一盞半煎汁一盞入

雞子白一枚再煎溫服一加丁香

【普濟方】用高良薑生剉二錢大棗一枚水煎冷

服立定名冰壺湯

●霍亂厥逆

【千金方】服烏牛尿二升

●霍亂成痢

【聖濟總錄】劉寄奴草煎汁飲

●吐痢卒死

【子母秘錄】及大人小兒卒腹皮青黑赤不能喘

息卽急用女青末納口中酒送下

●霍亂困篤

【聖惠方】雞蘇三兩水二升煎一升分三服

【千金方】童女月經衣和血燒灰酒服方寸七百

方不瘥者用之

●吐瀉不止

【普濟方】或四肢厥逆虛風不省人事服此則陽

回用天南星爲末每服三錢京棗三枚水二鍾

煎八分溫服未省再服名回陽散 又方醋調

南星末貼足心

●霍亂煩脹

【千金方】未得吐下用好苦酒三升飲之

●霍亂吐逆



【錢氏小兒方】不問虛實冷熱用水銀硫黃等分

研不見星每服一字至半錢生薑湯調下一氣

散一名青金丹

●霍亂大渴

【肘后方】不止多飲則殺人用黃梁米五升水一

斗煮三升稍稍飲之

【永類鈴方】以黃倉米三升水一升煮汁澄清飲

良

●霍亂不通

【總錄方】脹悶欲死因傷飽取涼者用雄雀糞二

十一粒研末溫酒服未效再服

●乾濕霍亂

【永類鈴方】當分利陰陽轉筋用大蒜搗塗足心

立愈

●中惡霍亂

【聖濟總錄】海桐皮煮汁服之

【聖惠方】麝香一錢醋半盞調服

●風痰霍亂

【外臺祕要】食不消大便瀉用訶黎三枚取皮爲

末和酒頓服三五次妙

●霍亂不進藥食

【主治】陰陽水調中消食凡痰瘡及宿食毒惡之

物腫脹欲作霍亂者卽以鹽投中進一二升令

吐盡痰食便愈藏器方 凡霍亂及嘔吐不能

納食及藥危甚者先飲數口卽定時珍方

傷寒門

●傷寒初起

【發明】張從正曰凡傷寒傷風傷食傷酒初起無

藥便飲太和湯盃許或酸薑汁亦可以手揉肚

覺恍惚再飲再揉至無所容探吐汗出則已

【陳藏器本草】取熱湯飲之候吐則止

【千金方】傷寒初得不問陰陽以皂角一挺肥者

燒赤爲末以水五合和頓服之陰病極效

●傷寒謠語

【簡便方】奔走似顛如見鬼神久不得汗不知人

事者用蚯蚓尿涼水調服

【聖惠方】傷寒發黃用大黃五兩剉炒微赤爲散

用臘雪水五升煎如膏每服半匙冷水下

【傷寒類要】氣壯者大黃一兩水二升漬一宿平

旦煎汁一升入芒硝一兩緩服須臾當利下

●傷寒咳逆

【活人方】服藥無效雄黃二錢酒一盞煎七分乘

熱嗅其氣卽止

【醫林集要】聲聞四隣四花青皮全者研末每服

二錢白湯下

【聖惠方】日夜不止寒氣攻胃也胡椒三十粒打

碎麝香半錢酒一鍾煎半鍾熱服

【蘇頌圖經】用畢澄茄高良薑各等分爲末每服

二錢水六分煎十沸入酢少許服之

【簡要濟衆方】丁香一兩乾柿蒂焙一兩爲末每

服一錢煎人參湯下

●傷寒狐惑

【聖惠方】蟲蝕下部痛痒不止雄黃半兩燒於瓶

中薰其下部

【小品方】食肝者蔥草黃連各四兩咬咀以白酸



漿一斗漬一宿煮取二升分三服

【金匱要略】張仲景曰狐惑病脈數無熱微煩默默但欲臥汗出初得三四日目赤如鳩七八日目四眇黃黑若能食者膿已成也赤小豆當歸散主之赤小豆三升水浸令芽出當歸三兩爲末漿水服方寸七日三服

●傷寒陽毒

【全幼心鑑】狂言妄語亂走毒氣在臟也鐵粉二兩龍膽草一兩爲末磨刀水調服一錢小兒五分

【易簡方】陽毒發狂奔走不定宜黃連寒水石等分爲末每服三錢濃煎甘草湯下

【活人書】青布一尺浸冷水貼其胸前

●傷寒發汗

【外臺祕要】治傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脈盛始得一二日者取真丹一兩水一斗煮一升頓服覆被取汗忌生血物 肘后方用真丹末酒調遍身塗之向火坐得汗愈

【葛洪肘后方】云傷寒原有數種庸人卒不能分別者今取一藥兼療之凡初覺頭痛身熱脈洪一二日者便以葱豉湯治之用葱白一虎口豉一升綿裹水三升煮一升頓服取汗更作加葛根三兩再不汗加麻黃三兩 肘后方又法用葱湯煮米粥入鹽豉食之取汗 又法用豉一升小男溺三升煎一升分服取汗

●傷寒無汗

【傷寒蘊要】代赭石乾薑等分爲末熱醋調塗兩手心合掌握定夾于大腿內側溫覆汗出乃愈

●傷寒發狂

【本事方】踰垣上屋寒水石二錢黃連一錢爲末煎甘草湯冷服名鵲石散

【傷寒蘊要】元明粉二錢朱砂一錢爲末冷水服

【傷寒蘊要】草龍膽爲末入雞子清白蜜化涼水服三錢

【醫林集要】驚怖恍惚用撒法卽二分水一盞浸一夕服之天方國人所傳玉璽

【肘后方】六七日熱極狂言見鬼欲走取桐皮削

去黑擘斷四寸一束以酒五合水一升煮半升

去滓頓服當吐下青黃汁數升卽瘥

【食鑑方】煩躁熱極吞生雞子一枚效

●傷寒衄血

【本事方】滑石末飯丸梧子大每服十九丸微嚼破

新水嚥下立止湯晦叔云鼻衄乃當汗不汗所

致其血紫黑時不以多少不可止之且服溫和

藥調其營衛待血鮮時急服此藥止之也

●傷寒頭痛

【梅師方】三二日發熱者葛根五兩香豉一升以

童子小便八升煎取二升分三服食葱粥取汁

卽愈

【活人書】如破者連髮葱白半斤生薑二兩水煮

溫服

【梅師方】肚熱胸中煩痛四五日不解烏梅十四

枚鹽五合水一升煎半升溫服取吐吐後避風

良

●傷寒咽痛

【張仲景傷寒論】少陰證甘草湯主之用甘草二

