

醫統正脈全書

五十



內外傷辯序

僕幼自受難素於易水張元素先生講誦既久稍有所得中年以來更事頗多諸所診治坦然不惑曾撰內外傷辯惑論一篇以證世人用藥之悞陵谷變遷忽成老境神志旣惰懶於語言此論束之高閣十六年矣崑崙范尊師曲相獎借屢以活人爲言謂此書果行使天下之人不致夭折是亦仁人君子濟人利物之事就令著述不已精力衰耗書成而死不愈於無益而生乎予敬受其言僅力疾就成之雖未爲完備聊答尊師慈憫之



志師宋文正公之後也丁未歲重九日東垣老人李杲

明之題

人不好天也景亦人探之
或尊曲曲中樂計樂以
更師志謂計樂以人言
國藏題一辭以獨世人
中平以來更事題之
或內自受藏素然以水
或內自受藏素然以水



內外傷辨目錄

卷上

辨陰證陽證

辨脉

辨寒熱

辨外感八風之邪

辨手心手背

辨口鼻

辨氣少氣盛

辨頭痛

辨筋骨四肢

辨外傷不惡食

辨渴與不渴

辨勞役受病表虛不作表實治之

辨證與中熱頗相似

卷中

飲食勞倦倫

補中益氣湯

立方本指

硃砂安神丸

四時用藥加減法

除風濕羌活湯

通氣防風湯

羌活勝濕湯

升陽順氣湯

升陽補氣湯



暑傷胃氣論

清暑益氣湯

參朮調中湯

升陽散火湯

當歸補血湯

硃砂涼膈散

黃連清膈丸

門冬清肺飲

人參清鎮丸

皂角化痰丸

白朮和胃丸

肺之脾胃虛方

升陽益胃湯

雙和散

寬中進食丸

厚樸溫中湯

腎之脾胃虛方

沈香溫胃丸

神聖復氣湯

卷下

辨內傷飲食用藥所宜所禁

易張先生枳朮丸

橘皮枳朮丸

麴蘗枳朮丸

木香枳朮丸

木香化滯湯

半夏枳朮丸

丁香爛飯丸

草豆蔻丸

三黃枳實丸

除濕益氣丸

上二黃丸

枳朮導滯丸

枳實梔子大黃湯

白朮丸

木香見睨丸

三稜消積丸

備急大黃丸

神應丸

益胃散

飲食自倍腸胃乃傷分而治之

論酒客病

葛花解酲湯

除濕散

五苓散

臨病制方

隨時用藥

吐法宜用辨上部有脉下部無脉

瓜蒂散

重明水鬱則達之之理

說病形有餘不足當補當瀉之理

內外傷辨目錄終



內外傷辨卷上

辨陰證陽證

金 眞定李 杲著

曰甚哉陰陽之證不可不詳也徧觀內經中所說變化百病其源皆由喜怒過度飲食失節寒溫不適勞役所傷而然夫元氣穀氣榮氣清氣衛氣生發諸陽上升之氣此六者皆飲食入胃穀氣上行胃氣之異名其實一也既脾胃有傷則中氣不足中氣不足則六腑陽氣皆絕於外故經言五臟之氣已絕於外者是六腑之元氣



病也氣傷臟乃病臟病則形乃應是五臟六腑真氣皆不足也惟陰火獨旺上乘陽分故榮衛失守諸病生焉其中變化皆由中氣不足乃能生發諸疾有脾胃以受勞役之疾飲食又復失節耽病日久事息心安飽食太甚病乃大作概其外傷風寒六淫客邪皆有餘之病當瀉不當補飲食失節中氣不足之病當補不當瀉舉世醫者皆以飲食失節勞役所傷中氣不足當補之證認作外感風寒有餘客邪之病重瀉其陽使榮衛之氣外絕其死只在旬日之間所謂差之毫釐繆以千里可不



詳辯乎按陰陽應象論云天之邪氣感則害人五臟是
八益之邪乃風邪傷人筋骨風從上受之風傷筋寒傷
骨蓋有形質之物受病也繫在下焦肝腎是也肝腎者
地之氣難經解云肝腎之氣已絕於內以其肝主筋腎
主骨故風邪感則筋骨疼痛筋骨之絕則腎肝之本亦
絕矣乃有餘之證也又云水穀之寒熱感則害人六腑
是六腑之病乃內傷飲食也黃帝鍼經解云適飲食不
節勞役所傷濕從下受之謂脾胃之氣不足而反下行
極則衝脈之火逆而上是無形質之元氣受病也繫在



上焦心肺是也心肺者天之氣故難經解云心肺之氣已絕於外以其心主榮肺主衛榮者血也脈者血之府神之所居也衛者元氣七神之別名衛護周身在於皮毛之間也肺絕則皮毛先絕神無所依故內傷飲食則亦惡風寒是榮衛失守皮膚間無陽以滋養不能任風寒也皮毛之絕則心肺之本亦絕矣蓋胃氣不升元氣不生無滋養心肺乃不足之證也計受病之人飲食失節勞役所傷因而飽食內傷者極多外傷者間而有之世俗不知往往將元氣不足之證便作外感風寒表實

內小易粹
卷二
三
之證而反瀉心肺是重絕其表也安得不死乎古人所
謂實實虛虛醫殺之耳若曰不然請以衆人之耳聞目
見者證之向者壬辰改元京師戒嚴迨三月下旬受敵
者凡半月解圍之後都人之不受病者萬無一二既病
而死者繼踵而不絕都門十有二所每日各門所送多
者二千少者不下一千似此者幾三月此百萬人豈俱
感風寒外傷者耶大抵人在圍城中飲食不節乃勞役
所傷不待言而知由其朝饑暮飽起居不時寒溫失所
動經三兩月胃氣虧之久矣一旦飽食大過感而傷人



而又調治失宜其死也無疑矣非惟大梁爲然遠在眞
祐興定間如東平如太原如鳳翔解圍之後病傷而死
無不然者余在大梁凡所親見有表發者有以巴豆推
之者有以承氣湯下之者俄而變結胸發黃又以陷胸
湯丸及茵陳湯下之無不死者蓋初非傷寒以調治差
悞變而似眞傷寒之證皆藥之罪也往者不可追來者
猶可及輒以平生已試之効著內外傷辯論一篇推明
前哲之餘論厯舉近世之變故庶幾同志者審其或中
觸類而長之免後人之橫天耳僭易之罪將何所逃乎



辯脈

古人以脈上辯內外傷於人迎氣口人迎脈大於氣口
爲外傷氣口脈大於人迎爲內傷此辯固是但其說有
所未盡耳外感風寒皆有餘之證是從前客邪來也其
病必見於左手左手主表乃行陽二十五度內傷飲食
及飲食不節勞役不節皆不足之病也必見於右手右
手主裏乃行陰二十五度故外感寒邪則獨左寸人迎
脈浮緊按之洪大緊者急甚於弦是足太陽寒水之脈
按之洪大而有力中見手少陰心火之脈丁與壬合丙



顯洪大乃傷寒脈也若外感風邪則人迎脈緩而大於氣口一倍或兩倍三倍內傷飲食則右寸氣口脈大於人迎一倍傷之重者過在少陰則兩倍太陰則三倍此內傷飲食之脈若飲食不節勞役過甚則心脈變見於氣口是心火刑肺其肝木挾心火之勢亦來薄肺經云侮所不勝寡於畏者是也故氣口脈急大而澀數時一代而澀也澀者肺之本脈代者元氣不相接脾胃不及之脈洪大而數者心脈刑肺也急者肝木挾心火而反克肺金也若不甚勞役惟右關脾脈大而數謂獨大於

