

戊辰年

五十五

卷一

~~五十五~~

幼科什病心法要诀

痘疹心法要诀

医案金鑑

卷

5P-63

痘疹心法要訣
眼科心法要訣
刺灸心法要訣

編輯痘疹心法要訣目錄

痘中雜證下

痘後癰毒

解毒內托湯

紅玉膏

目

洗肝散

龍膽湯

唇

加味升麻葛根湯

黃連解毒湯

痘後牙疳

清毒涼血飲

人中白散

舌

加味犀角湯

咽喉

加味甘桔湯

利咽解毒湯

牛黃散

夾疹

升麻葛根湯

夾癍

荆防敗毒散

黃連解毒湯

夾痧

荆防敗毒散

水痘

荆防敗毒散

加味導赤散

男婦年長出痘門

男子年長出痘

參麥清補湯

參歸鹿茸湯

鷄冠血酒

婦女出痘行經

涼血解毒湯

四物解毒湯

十全大補湯

孕婦出痘

如聖散

痘出遇產

十全大補湯

黑神散

產後出痘

十全大補湯

疹門

疹原

麻疹輕重

麻疹主治大法

麻疹未出證治

宣毒發表湯

麻疹見形證治

升麻葛根湯

三黃石膏湯

人參敗毒散

麻疹收沒證治

荆防解毒湯

胡荽酒

柴胡四物湯

身熱不退

化毒清表湯

柴胡清熱飲

煩渴

升麻葛根湯

白虎湯

竹葉石膏湯

譫妄

三黃石膏湯

黃連解毒湯

喘急

麻杏石甘湯

清氣化毒飲

欬嗽

升麻葛根湯

清金寧嗽湯

喉痛

元參升麻湯

涼膈消毒飲

失音

元參升麻湯

加減涼膈散

兒茶散

嘔吐

竹茹石膏湯

瀉泄

升麻葛根湯

黃連解毒湯

痢疾

清熱導滯湯

腹痛

加味平胃散

衄血

髮灰散

犀角地黃湯

瘙疹

蓋痘疹

加味消毒飲

癰疹

加減羌活散

加味消毒飲

血

和平散

散

發熱門

諸熱總括○小兒有病多發熱表裡虛實宜分別觀形色辨因由審證切脈有妙訣表證須汗裏下之虛則宜補實則瀉平昔體認要精詳方得臨時無遺闕註小兒發熱有表裡虛實之異治亦有汗下補瀉之殊須觀形色審證切脈以別之惟在平昔講習精詳臨證庶不致誤

表熱○表熱之證因外感脈浮發熱惡風寒頭痛身疼而無汗十神通聖表為先註小兒外感寒邪脈浮發熱惡風寒頭痛身疼無汗此表熱也宜十神通湯主之若兼內熱者雙解通聖湯兩解之

十神通湯 升麻 葛根 麻黃 香附炒 陳皮 蘇葉 赤芍藥 川芎 香白芷 甘草生 引用生薑水煎服 以十神通治表熱證并麻乾葛共麻黃香附陳皮蘇葉芍藥甘草引生薑

雙解通聖湯 方見傷寒

裏熱○裏熱之證因內熱偏身蒸熱小便紅面赤唇焦舌燥渴調胃白虎解毒清註小兒肥甘過度必生內熱以致發熱蒸蒸小便赤澀面赤唇焦舌燥而渴脈實有力者先以調胃承氣湯下之不愈用白虎湯或黃連解毒湯清之

調胃承氣湯 大黃 芒硝 甘草 引用生薑水煎服 方調胃承氣治裏熱大黃甘草共芒硝引用生薑水煎服大便通利熱自消

白虎湯 石膏煨 知母生 甘草生 粳米 水煎服 方胃熱白虎湯知母生用良石膏合甘草粳米共煎當

黃連解毒湯 黃芩 黃連 梔子 黃蘗 水煎服 方黃連解毒湯清熱效非常連梔子蘗煎服保安康

虛熱○虛熱病後榮衛弱神倦氣乏用補中嘔渴竹葉石膏治面赤尿白厥白通宜虛熱者因小兒病後氣血虛弱榮衛尚未調勻之故其證神倦氣乏宜用補中益氣湯治之若兼口渴引飲而嘔者宜用竹葉石膏湯治之又有陰盛格陽外浮發熱者其面色雖赤然小便必清白四肢必厥逆宜用白通湯收斂陽氣熱退自愈

補中益氣湯 方見雜泄

竹葉石膏湯 竹葉 石膏煨

人參 麥冬去心 甘草生 半夏製 粳米 引用生薑水煎服

方病後虛熱煩渴嘔皆因氣弱胃津亡竹葉石膏麥冬半夏粳米共生薑

白通湯 乾薑 附子製 蔥 水煎服 方虛熱原於陰格陽真寒假熱白通湯散寒蓋附白薑厥回熱退自然康

實熱○實熱積熱干潮熱腹脹尿紅大便難煩渴口瘡腮頰赤涼膈大柴胡通仙註小兒有餘積熱以致午後潮熱蒸蒸有汗肚腹脹滿小便赤大便難煩渴啼口舌生瘡腮頰赤赤脈洪數有力法宜清熱通利時時熱者涼膈散主之午後潮熱者大柴胡湯主之○涼膈散方見急

赤大便難煩渴啼口舌生瘡腮頰赤赤脈洪數有力法宜清熱通利時時熱者涼膈散主之午後潮熱者大柴胡湯主之○涼膈散方見急

大柴胡湯 方見傷寒

積滯門

積滯總括○小兒養生食與乳搏節失宜積滯成停乳傷食宜分晰因證調治保安寧 註夫乳與食小兒資以養生者也胃主納受脾主運化

乳貴有時食貴有節可免積滯之患若父母過愛乳食無度則宿滯不消而病成矣醫者當別其停乳傷食之異臨證斟酌而施治焉

乳滯○嬰兒乳滯睡不安多啼口熱吐驚煩肚脹腹熱便酸臭慎攻宜用消乳丸 註乳滯之兒其候睡臥不寧不時啼叫口中氣熱頻吐乳片

肚脹腹熱大便酸臭也但臟腑嬌嫩不可過攻惟宜調和脾胃為上以消乳丸消導之○消乳丸 方見傷乳吐

食滯○小兒食滯任意餐頭溫腹熱便膿酸臭惡食煩作渴大便秘氣密宜先註小兒恣意肥甘生冷不能運化則腸胃積滯矣其證頭溫

腹熱大便酸臭愛氣惡食煩不安眠口乾作渴滯輕者宜木香大安丸消導滯重便秘者宜小承氣湯攻下之

木香大安丸 木香 黃連 陳皮 白朮 枳實 山查肉 連翹 神麴 麥芽 砂仁 萊菔子 右為

細末神麴糊為丸每服一錢陳倉米湯下 ○小承氣湯 方見食痛

癖疾門

癖疾總括○癖疾過食腸胃滿濁液外溢被寒凝潮熱飲冷肌削瘦腹滿硬塊面黃青 註癖疾一證皆因飲食過節腸胃填滿濁汁外溢復感

寒氣凝結而成每生於左脇之下始如雞卵堅硬成塊漸如覆盆之形越臍則難治矣其候身體潮熱喜飲涼水肌膚削瘦面色青黃也治者

宜詳察之

癖疾潮熱○癖疾潮熱渴飲冷肚大青筋堅硬痰內服消癖木香散外貼紅花膏最靈 註癖疾之始作也午後潮熱口渴渴飲冷肚大青筋漸至

堅硬成塊不時作痛內以千金消癖丸治之外貼紅花膏內外兼治其癖自消若無熱渴者先以木香丸治之外亦以紅花膏貼之

千金消癖丸 蘆薈 阿魏 青黛 木香 厚朴 檳榔 陳皮 甘草 史君子 胡黃連 山查肉 香附 三棱 莪朮 水紅花子 神麴 麥芽 人參 白朮 茯苓 右為細末將阿魏一錢白水和鈔打糊

為丸菜豆大米飲下量兒大小服之

木香丸 木香 蓬朮 縮砂仁 青皮 硃砂 右為細末和勻飛白麴糊和丸麻子大每服二三丸乳傷乳飲下食傷以所傷

物熱湯下

紅花膏 沒藥 血竭 麝香 阿魏 當歸 赤芍 水紅花料 右為細末入膏內攪勻以膏布攤貼患處

汗證門

汗證總括○自汗屬陽有虛實或因胃熱或表虛睡中盜汗為陰弱心虛血熱隨證醫 註汗乃人之津液存於陽者為津存於陰者為液發洩

自汗○表虛自汗玉屏風甚者桂枝加附從裏實自汗用白虎便秘調胃承氣攻註表虛漉漉自汗玉屏風散主之若惡寒冷陽氣虛也桂枝湯加附子固之陽明裡實蒸蒸自汗用白虎湯清之便秘者以調胃承氣湯攻之

桂枝加附子湯 白芍藥 桂枝 甘草 附子 藥
引用葛東水煎服 歌表氣虛弱其桂枝湯最良與藥桂枝草加附病漸康

白虎湯方見前○護胃承氣湯方見前

盜汗○心虛盜汗睡多驚酸棗仁湯服即寧心火傷陰必煩熱當歸六黃湯奏功註盜汗有二虛實兩分心虛者陰氣不斂也睡則多驚以酸棗仁湯主之心熱者大傷於陰也身多煩熱以當歸六黃湯主之

酸棗仁湯
 當歸
 白芍炒
 生地
 茯苓
 酸棗仁炒
 知母炒
 黃蘗炒
 五味子
 人參
 黃耆炙
 水煎服
 方歌
 酸棗仁湯治盜汗

陽不能藏陰本虛歸于生地使苓朮知藥五味共參耆

當歸六黃湯 當歸 生地黃 熟地黃 黃芩 黃蘗 黃連 黃耆 炙 引用浮麥水煎服 方歌 當歸六黃治盜汗陽盛傷陰夜自流生

熟二地苈連藥歸者浮麥汗能收

失血門

失血總括○陰乘陽熱血妄行血犯氣分不歸經血病及脈滲瀉道傷於藏者溢出血熱犯陽絡上吐血衄熱侵陰絡下失血又有勞勞成血病

血止仍嗽勢多凶註凡失血之證陽盛乘陰則血為熱迫不能安於脈中犯於氣分妄行不能歸入經脈也若血病傷及於腑者則血參入陽

胃之濁道上行於咽而出而為吐為衄下從二便而出為便為溺也若血病傷及於藏者則溢出於胸中之清道上從喉出而為咳下從精溺

而出為弱血也夫血藏於臟內行於脈中流於軀殼之內不可得而見也非損傷不能為病而損之之因有三一曰熱傷陽絡脂病也熱傷陰

絡藏病也宜以清熱為主一曰勞傷宜以破逐為主一曰勞傷宜以理損為主若日久血止而咳嗽不休者主必死之證故勢多凶也

○衄血之候鼻乾身熱不渴苦頭痛疾表分汗麻桂枝內熱犀角瀉心湯
○衄血者鼻中出血也其候鼻中乾燥身熱不渴苦頭痛疾是

熱傷陽絡也有因傷寒失汗血者乃熱鬱於榮其身無汗宜以麻黃湯汗之身有汗者宜以桂枝湯解之設無表病因內熱而衄者宜以犀

角地黃湯清之熱盛者四物三黃湯以清瀉之外但用髮以當玄黑梳子木吹鼻其血自止

麻黃湯 麻黃 杏仁 皮尖 桂枝 甘草 芍藥 生薑 小兒用 敬傷寒失表證發身骨無汗宜行須用麻黃湯調治桂枝麻黃各