

御纂醫宗金鑑卷三十二

刪補名醫方論卷七目錄

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

更衣丸

麻仁丸

桃仁承氣湯

上湯

抵當湯丸

梔子豉湯

梔子豉加甘草湯

梔子豉加生薑湯

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

瓜蒂散

小陷胸湯

大陷胸湯丸

三物白散

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

甘草瀉心湯

生薑瀉心湯

半夏瀉心湯

旋覆代赭石湯

麻黃連軛赤小豆湯

梔子蘘皮湯

茵陳蒿湯

六
卷
上

卷
上

卷
上

卷
上

卷
上

卷
上

卷
上

卷
上

卷
上

御纂醫宗金鑑卷三十二

刪補名醫方論卷七

大承氣湯

治陽明病潮熱手足濇然汗出譫語汗出多胃
燥獨語如見鬼狀喘冒不能臥腹滿痛脈滑實
又目中不了了睛不和又少陰病初得之口燥
咽乾者自利清水色純青心下痛口燥舌乾者
六七日腹脹不大便者

大黃

四兩
酒洗

厚朴

半觔

枳實

五枚
炙

芒消

三合

右四味以水一斗先煮二物取五升內大黃
煮取二升去滓內芒消再上火微煮一二沸
分溫再服得下卽停後服

小承氣湯

大黃

四兩

厚朴

二兩
炙
去皮

枳實

三枚

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫
三服初服湯當大便秘不爾再服以利爲度得

便卽止服

集註

柯琴曰諸病皆因於氣穢物之不去由於氣

之不順也故攻積之劑必用氣分之藥因以

承氣名湯方分大小者有二義焉厚朴倍大

黃是氣藥爲君名大承氣大黃倍厚朴是氣

藥爲臣名小承氣味多性猛制大其服欲令

大泄下也因名曰大味寡性緩制小其服欲

微和胃氣也因名曰小且煎法更有妙義大

承氣用水一斗煮枳朴取五升去滓內大黃

再煮取二升內芒消何哉蓋生者氣銳而先行熟者氣純而和緩仲景欲使芒消先化燥屎大黃繼通地道而後枳朴除其痞滿若小承氣以三味同煎不分次第同一大黃而煎法不同此可見仲景微和之意也

喻昌曰金匱治瘧爲病胸滿口噤臥不着席脚攣急必齮齒可與大承氣湯乃死中求生之法也靈樞謂熱而瘧者死腰折瘕瘕齒齮也茲所云臥不着席卽腰折之變文脚攣急

卽瘕癥之變文且齟齬加以胸滿口禁上中
下三焦熱邪充斥死不旋踵矣在傷寒證腹
滿可下胸滿則不可下然投是湯者須知所
謂胸滿謂其邪尚在表故不可下此證入裏
之熱極深極重匪可比倫况陽熱深極陰血
立至消亡卽小小下之尚不足以勝其陽救
其陰故取此湯以承領其一綫之陰氣陰氣
不盡爲陽熱所劫因而得生者多矣可與二
字甚活臨證酌而用之初非定法也既有下

之重傷其陰之大戒復有下之急救其陰之
活法學者欲爲深造端在此矣

調胃承氣湯

治表解有汗裏熱不除胃因不和而不作解者

大黃

四兩
酒洗

甘草

二兩
炙

芒消

半觔

右三味以水三升先煮二味取一升去滓內

芒消微煮令沸少少溫服之

註

三承氣湯之立名而曰大者制大其服欲急

下其邪也小者制小其服欲緩下其邪也曰

調胃者則有調和承順胃氣之義非若大小

專攻下也經曰熱淫於內治以鹹寒火淫於
內治以苦寒君大黃之苦寒臣芒消之鹹寒
二味並舉攻熱瀉火之力備矣更佐甘草之
緩調停於大黃芒消之間又少少溫服之使
其力不峻則不能速下而和也

芒消

半斤

大黃

四兩

甘草

二兩

白芍

半斤

枳實

四兩

黃芩

三兩

芍藥

四兩

桂枝

三兩

師自承床也

更衣丸

治津液不足腸胃乾燥大便不通

硃砂

五錢研如飛麵

蘆薈

七錢研細生用

滴好酒少許和丸每服一錢二分好酒下

集註

柯琴曰胃爲後天之本不及固病太過亦病

然太過復有陽盛陰虛之別焉兩陽合明而

胃家實仲景製三承氣湯以下之三陽燥結

而津液亡前賢又製更衣丸以潤之古人入

廁必更衣故以此命名也硃砂以汞爲體性

寒重墜下達蘆薈以液爲質味苦膏潤下滋
兼以大寒大苦之性味能潤燥結從上導下
而胃關開矣合以爲丸兩者相須得效最宏
奏功甚捷誠匪夷所思矣

蘇頌曰胃欲食之本不交固難大散亦潤
蘇頌曰胃欲食之本不交固難大散亦潤
蘇頌曰胃欲食之本不交固難大散亦潤

蘆薈
正蘆薈
正蘆薈

蘇頌曰胃欲食之本不交固難大散亦潤
蘇頌曰胃欲食之本不交固難大散亦潤
蘇頌曰胃欲食之本不交固難大散亦潤

麻仁丸 又名脾約丸

治腸胃燥熱大便秘結小便數多

麻子 二升

芍藥 半觔

枳實 半觔

大黃 一觔 去皮

厚朴 一觔 去皮

杏仁 一升 去皮 煎熬碾脂

右六味爲末煉蜜爲丸桐子大飲服十丸日

三服漸加以利爲度

集註成無己曰約者約結之約又約束也經曰飲

入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸

於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經并
行今胃強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱
小便數而大便鞭故曰脾約麻仁甘平而
潤杏仁甘溫而潤經曰脾欲緩急食甘以緩
之本草曰潤可去燥是以麻仁爲君杏仁爲
臣枳實破結厚朴瀉滿故以爲佐芍藥調中
大黃通下故以爲使

朱震亨曰旣云脾約血枯火燔津竭理宜滋
陰降火津液自生何秘之有此方惟熱甚而

稟實者可用熱微而虛者愈致燥涸之苦矣