

女口

口口

傷寒辨證

貞

傷寒辯證

卷四

三原 陳堯道 素中著

陽信 勞鳳翔 虞廷訂其

傷寒辯證藥方

作方圓必依規矩治病證必用古方固也但古方今

病焉能脗合是以羅太<sup>白</sup>以古方治今病正如折

舊屋湊新屋其材木非一必再經匠氏之手故用方

者不貴用其當然貴明其所以然能明其所以然則

或增或減或主方或複方或以內傷方治外感或以  
外感方治內傷信手拈來頭頭是道正許學士所云  
讀仲景書用仲景之法未嘗守仲景之方乃為得仲  
景之心也若不明其所以然而徒守其方如經生家  
不能搦管作文徒記誦先輩名文以冀場屋題目之  
必中奚可哉是集諸方人所易曉者止錄其方其涉  
疑難及理趣深奧者頗采明理論醫方考等書以闡  
明之間附一得之見誠能潛心於此製方其無誤乎  
抑更有慮焉仲景曰病當汗解診其尺脉濇當與黃

者建中湯補之然後汗之先賢慎於用汗藥如此故  
用方者雖方與證合又在診脉並察兼證以詳辯其  
虛實寧過於顧護元氣不可輕用汗下之重劑也





傷寒辯證藥方目錄

麻黃湯 一

桂枝湯 二

大青龍湯 三

小柴胡湯 四

三黃石膏湯 五

雙解散 六

人參敗毒散 七

九味羌活湯 八

白虎湯 九

清暑益氣湯 十

大柴胡湯 十一

五苓散 十二

理中湯 十三

益元散 十四

藿香正氣散 十五

四逆湯 十六

黃芩湯 十七

柴苓湯 十八

葛根湯 十九

大羌活湯 二十

涼膈散 二十一

大承氣湯 二十二

小承氣湯 二十三

調胃承氣湯 二十四

升麻葛根湯 二十五

桃仁承氣湯 二十六

參胡三白湯 二十七

黃連解毒湯 二十八

六味地黃丸料 二十九

人參三白湯 三十

人參竹葉湯 三十一

參胡溫膽湯 三十二

小建中湯 三十三

通脈四逆湯 三十四

乾薑附子湯

三十

陽毒升麻湯

三十

黑參升麻湯

三十

大黃散

三十

真武湯

三十

霹靂散

四十

麻黃附子細辛湯

四十

當歸四逆湯

四十

附子湯

三十

甘草附子湯

四十

竹葉石膏湯

四十

補中益氣湯

四十

黃耆建中湯

四十

當歸六黃湯

四十

厚朴

生薑甘草湯

四十

茵陳五苓散

五十

小半夏茯苓湯

五十

葛根蔥白湯

五十



吳茱萸湯五十

八物湯四十

二陳湯五十

茯苓桂枝甘草湯五十

人參養榮湯五十

加味溫膽湯五十

普濟消毒飲五十

增損通聖消毒飲六十

大陷胸湯六十

小陷胸湯六十

枳實理中湯六十

桔梗枳殼湯四十

大黃黃連瀉心湯六十

半夏瀉心湯六十

附子瀉心湯六十

生薑瀉心湯六十

甘草瀉心湯六十

桂枝人參湯七十

犀角地黄湯七十

桂枝加芍藥湯七十

黃連湯七十

四逆湯七十

甘草湯七十

桔梗湯七十

參蘇飲七十

橘皮竹茹湯七十

小青龍湯七十

桂枝加厚朴杏仁湯八十

麻黃杏仁甘草湯八十

葛根黃芩黃連湯八十

五味子湯八十

蘇沉九寶湯八十

葛根加半夏湯八十

黃芩半夏生薑湯八十

乾薑黃芩人參湯八十

白通湯八十

白通加猪膽汁湯

九十

茯苓四逆湯

九十

梔子豉湯

九十

茯苓甘草湯

九十

炙甘草湯

九十

葛根解肌湯

九十

柴胡桂枝湯

九十

赤石脂禹餘糧湯

九十

桂枝加

附子

湯

九十

芍藥甘草湯

九十

導赤散

九十

導赤瀉心湯

一百

知母麻黃湯

一百

大建中湯

一百

桂枝白朮湯

一百

附子防風湯

一百

防風當歸散

一百

黃芩芍藥湯

一百

代抵當丸一百七

失笑散一百八

猪苓湯一百九

茵陳湯一百十

茯苓桂枝甘草湯一百十一

甘草乾薑湯一百十二

連翹赤小豆湯一百十三

白虎加人參湯一百十四

黃連犀角湯一百十五

雄黃散一百十六

十棗湯一百十七

黃龍湯一百十八

生地黄黃連湯一百十九

烏梅丸一百二十

百合地黄湯一百二十一

麥門冬湯一百二十二

西合

一百一十二

麥門冬

一百一十二

生薑

一百一十二

高麗參

一百一十二

黃連

一百一十二

黃芩

一百一十二

黃連

一百一十二

黃芩

一百一十二

黃連

一百一十二

黃芩

一百一十二

黃連

一百一十二

黃芩

一百一十二

黃連

一百一十二

黃芩

一百一十二

黃連

一百一十二

黃芩

一百一十二



傷寒辯證藥方

麻黃湯一

太陽寒傷頭痛發熱腰脊痛惡寒無汗脉浮緊者麻黃湯主之

麻黃

去節

桂枝

錢二

甘草

錢一

杏仁

去皮尖一錢八分

右用水二鍾煎至一鍾去滓熱服衣被覆取汗

足太陽經起目內眥循頭背腰膂故所過痛而不  
利寒邪外束人身之陽不得宣越故令發熱寒邪  
在表不復任寒故令惡寒寒主閉藏故令無汗人

身之陽既不得宣越於外則必壅寒於內故令作喘寒氣剛勁故令脉緊麻黃辛溫散寒故令為君佐以桂枝取其解肌佐以杏仁取其利氣入甘草者亦辛甘發散之謂抑太陽無汗麻黃之用固矣若不斟酌人品之虛實時令之寒暄則又有汗多亡陽之戒汗多者宜撲粉亡陽者宜附子湯大抵麻黃性熱惟冬時正傷寒無汗者用之若春夏不可輕用誤用麻黃後汗出不止將病人頭髮披水盆中外用炒糯米一升龍骨牡蠣藁本防風各一

兩周身撲之此良法也

# 桂枝湯二

頭痛發熱汗出惡風脉緩者太陽中風也桂枝湯主之

桂枝錢三芍藥錢三甘草錢二生薑片五大棗三枚

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫服取微汗徧身繫繫微似有汗者佳不可令如水淋漓病必不除風之傷人也頭先受之故令頭痛風為陽氣亦為陽同類相從則傷衛衛氣傷則無以固衛津液故

令汗出其惡風者衛不能衛也其脉緩者衛氣不能鼓也桂枝味辛甘辛則能解肌甘則能實表辛甘發散為陽故用之以治風然恐其走泄陰氣故用芍藥之酸以收之佐以甘草生薑大棗此發表而兼和裏之意然桂枝本為解肌若其人脉浮緊發熱汗不出者不可與也與之則表益實而汗益難出矣故申之以常須識此勿令誤也大抵桂枝性熱惟冬時正傷寒有汗者用之若春夏不可輕用酒家亦不可行桂枝湯