

閩長樂陳脩園著

傷寒醫書訣串解

十藥神書註解附後

味根齋藏板

必翻



北京中医药大学图书馆藏

傷寒醫訣串解

長樂陳修園

先生晚年所編集也惜六篇之中

尚

尚缺其一以其未成書故不及付梓

其

其門徒猶子陳道著有靈扁風

閩

閩之名醫也既能學先生之學又

能

能承先生之志日嘗手披而祕藏

臺



之復體會其遺意而敘續一篇以補
其缺合成六篇而篇帙遂成茲僑
園古矣其猶子道英亦古矣閩中林
子壽萱子壽萱專心術世於舊書肆中檢乃
脩園先生註解萬書久十藥神書
一卷購而珍存之并恐此二種沒而



不彰因細加讐校韻而錄之欲與
兩先生傳名並以傳世值余奉
命巡撫全閩因舊疾復起探知
林子精於療治常勞診視論及
閩中名醫林子以陳修園陳道其
兩先生對敬以修園先生所著南



雅堂十一種醫書見示且余本美
病人也又平熟是書久矣適林
漢以傷寒醫訣串解子錄一通
序於余，不敏每兢，官守尚恐才
不足以經世何暇論及術世然串解
實補傷寒淺註所未備不可以年



是襄集傷寒淺注凡三百九十一
七法依法條晰期於明白易曉
而又憲學者未能融會貫通
而得其要旨也不揣固陋復
為綜貫衍澤名曰傷寒醫
訣串解其於疑以細微之



靈抉剔詳辨頗費苦

脩園者矣敢謂於此道

於肱然有志之士誠能

此袖繹其端緒推尋其綱

領而不眩於似是而非未必

非活國活人之一助也



傳若再附以十藥成書註解合而
刻之庶可以作岐黃家祕本矣
今之術岐黃者果能默會精審
互相參校其裨益良不淺也姑
就林子所述其緣起為之弁數
語於簡端云尔



咸豐丙辰秋九月望後三日福建巡撫呂佺孫書



南京中医药大学图书馆藏

傷寒真方歌括目錄

閩長樂陳念祖修園著

東冶林壽萱校

卷一

太陽上篇方法

太陽中篇方法

計歌括拾壹條

計歌括玖條

太陽下篇方法

太陽救誤變症方法

計歌括叁條

計歌括拾捌條

卷二

陽明上篇方法

陽明中篇方法



計歌括拾條

計歌括肆條

陽明下篇方法

計歌括叁條

卷三

少陽上篇方法

計歌括陸條

少陽中篇方法

計歌括叁條

少陽下篇方法

計歌括壹條

卷四



北京中医药大学图书馆版权所有

為太陰全篇方法 肺胃岐黃以至仲景不日

法也後計歌括式條 用溫熱之藥峻補脾

卷五

少陰全篇方法

計歌括拾陸條

卷六

厥陰全篇方法

陰陽易差後勞復病方法

計歌括伍條

計歌括伍條

末附魏念庭先生跋語



南京中醫藥大學圖書館藏

傷寒真方歌括卷一

閩長樂陳念祖修園著方之治南林壽萱校千金方

也太陽上篇方法所長棄其所短則千金重

太陽為寒水之經主一身之膚表邪之初傷必自太陽經始論

太陽為病脉浮頭項強痛惡寒統傷寒中風而言也傷寒詳見中篇

茲請先別中風之病論云太陽病發熱汗出惡風脉浮緩或見鼻

鳴乾嘔者為中風病主以桂枝湯服湯啜粥得漿漿微似汗則愈

若服桂枝湯大汗出不解所以然者以風邪得微汗則除得大汗

反不除病不去則變浮緩之脉而為洪大仍用桂枝湯取微似汗

則愈倘若不愈則病如瘧狀日再發邪淺欲散宜桂枝二麻黃一湯撤



其餘邪則全愈矣。○前症是汗後餘邪未盡，以小劑為緩汗法。

症是過經不解，不可不汗，故制此湯以急汗之。不可大汗，故制小

劑以小汗之。人知大劑急汗之法，而不知小劑亦有急汗之法也。

○若太陽病得之八九日，頭痛項強，雖日久而未去，熱多惡少，往

來如瘧而頻發。本論云一日二三度發是邪淺而欲衰，面上反有熱色，身

必得少汗而全愈。宜桂枝麻黃各半湯主之。○桂枝症而兼喘者，

宜桂枝加厚朴杏仁湯主之。○若燒針針處核起，因驚而發奔豚

者，宜灸其核，以桂枝加桂湯主之。○若奔豚症欲作未作，其悸只

在臍下者，宜茯苓桂枝甘草大棗湯主之。○若悸在心下，又手背

心者，因發汗過多所致，宜桂枝甘草湯主之。○若誤汗遂漏不止，



惡風小便難。四肢拘急者。宜桂枝加附子湯主之。○若桂枝症下之後。胸滿者是陰邪盛于陽位。恐芍藥附和陰氣。宜桂枝去芍藥湯急散之。若兼惡寒者。恐薑桂力微。宜桂枝去芍藥加附子湯以溫散之。○若汗後陽虛。陰氣凝聚。身痛者。以桂枝新加湯行其陽氣。○又有太陽傳入本腑症。發熱六七日不解。煩渴飲水。水即吐。小便不利者。宜五苓散表裏兩解之。又有太陽裏症而表邪具在下後。心下滿。小便不利者。宜桂枝去桂加茯苓白朮湯利水。則表邪自化。此皆太陽症虛邪之方法也。

桂枝湯

發熱自汗是傷風。桂枝芍藥湯。頭痛項強。浮緩脈。必須稀粥。



合成功

芍藥桂枝生薑

各三錢

炙草三錢

大棗

四枚

水煎溫服須臾啜粥

粥溫覆取微似汗。此方最切於時用中風汗自出者用之服麻

黃湯復煩者用之下後脈仍浮者用之氣冲利不止者用之陰逆

脈浮為欲愈亦用之桂草辛甘化陽助太陽融會肌氣芍草苦

甘養陰啟少陰奠安營血薑佐桂枝行陽棗佐芍藥行陰此方本

不發汗藉熱粥之力充胃氣以達於肺令風邪從皮毛而解不傷

氣血為諸方之冠

時醫以桂枝湯麻黃湯地非北方時非冬月戒不敢用以羌獨

蒼芎荆防代之而不知此等藥更燥烈害人也桂枝湯以桂枝



為君色赤入心生血得芍藥之甘以和之為陰陽調和之劑
黃湯以麻黃為君比物輕清走表絕無辛烈之味悍濁之氣
佐之桂枝入心化痰杏仁入肺降氣甘草安內攘外不加薑之
上行爽之留中逕走肌表不傷津液觀蒼耳羌獨之類藥和
峻烈耶

桂枝五麻黃一湯

汗出不徹邪還襲如瘧頻來時翕翕桂枝湯二麻黃表後脈洪

藉此輯

桂枝一錢三分芍藥生薑各一錢○炙甘草七分麻黃七分大棗一

先煮麻黃去沫後入芍藥溫服○此是麻黃症只用桂枝湯汗不

