

婦科卷二

中風論

附中寒中暑中濕中火

中氣食厥勞役房勞傷

角弓反張

附噤口不語風痺自汗  
賊風偏枯喎飛尸厥

驚悸顛狂論

瘈瘲論

附顛振血風煩悶血風攻脾不能食

虛勞論

附瘵骨蒸熱

無熱虛勞有熱虛勞

積聚癥瘕論

金匱啟鐫

鹿江黃朝坊妙山輯著

中風論

附中寒

中暑

中濕

中火

中氣

食厥

勞役

房勞傷

虛勞傷風之中也。咸謂氣血空虛而賊風襲之。此其說未可盡憑。不知多出內傷積損頹敗而然。是風之名。非由外風。乃內自生耳。此景岳所以易中風。而以非風名之。蓋欲令人易覺。不徒以風藥貽誤耳。此病如蜂起。古人論証亦詳。有謂中腑而兼中臟者。有分臟腑血脈異中者。何爲中腑而兼中臟。如左關脈浮弦。面目青筋。左脇疼痛。筋急目瞤。手足不收。此中胆兼中肝者。用犀角散主之。左寸脈洪。面紅

汗多惡風神亂語澁舌強此中小腸兼中心者宜麻黃散之類左尺脈浮滑面黑腰痛耳鳴足痿此中膀胱兼中腎者用獨活散主之右關脈浮緩或洪大面黃多汗惡風口渴語澁身重嗜卧不仁肉動腹脹不思飲食此中胃兼中脾者宜防風散之類右寸脈浮澁而短流涕多喘短氣自汗聲嘶肢痿此中大腸而兼中肺者用五味子湯之類上諸症治雖經前人批駁而學者亦端詳悉討論庶不至見別書或載驚生奇異而特不可執以爲法耳何爲中臟九竅多滯言瘖志亂也何謂中腑言清志定偏枯不運也何謂中血脈手足拘攣而不仁也條雖分列有三無非分病之輕重而言焉是以病之重者辛小

可灌之。治以三生飲。醒後調理脾腎。若有痿氣。牙關緊閉。兩手握固。此病之稍輕者。搗生薑湯灌之。初以加減續命湯。如無痿氣。言清色活。但四肢廢弛。此病之尤輕者。宜以大秦艽湯主之。黃芪諸汁散。亦初病通治之大概也。究其本。則在氣血。氣血生旺。又在脾腎。故經脈拘急強直之狀。是肝失所養。而木從邪化。謂非水虧不能榮木乎。則六味地黃湯。大小營煎。左歸丸。主之。斷斷無疑。如氣虛不能生血。則十全大補湯。人參養榮湯。五福飲之類。何容稍緩。况脾主四肢。若手足不仁。痿涎壅盛。雖曰在腎。水不歸源。上泛痿生。而脾又何能謝其

任乎飲食不能運化。不惟飲食之精不能上騰於肺而散諸臟其制水之權已先失矣。因以痰凝而經絡塞。謂非脾虛之候乎。非薑附六君子參朮二陳湯不能治也。且火弱不能生土。附子理中。薑附六君有所必需。陽虛難以生陰。八味地黃及右歸丸地黃飲子正不可少。四肢若僅不仁。亦分氣血之異。右手足不仁。多由元氣有虧。宜六君子湯。加竹瀝薑汁鉤藤。左手足不仁。多由陰血不足。宜四物湯加鉤藤竹瀝薑汁。左右均不仁。係氣血兩虛。宜用八珍湯。加藥同上。夫病有與中風相類者。又不得不辨之。中如冬月卒中寒氣昏憤口噤肢攣拘急惡寒。其脈浮緊。宜用麻黃桂枝理中湯主之。夏月卒中暑

土生痰。痰則生熱。熱則生風。用清燥湯加竹瀝薑汁。中於火者五  
志過極。火盛水衰。熱氣拂鬱而卒仆也。用六味丸。四君子湯。獨參湯。  
主之內有怒傷肝。火上炎者。用柴胡湯之類。中於氣者。由七情過  
極。氣厥昏憤。或牙關緊閉。急用蘇合香丸。誤作風治者。斷不甦也。食  
食厥者。過於飲食。胃氣自傷。不能運化。故昏憤也。用六君子湯加木  
香。勞傷者。過於勞役。耗損元氣。脾虛不任風寒。因致風憤。宜補中  
益氣湯。房勞傷者。腎虛精耗。氣不歸元。因此昏憤。惟六味地黃丸  
最良。是病証之相似。原玉石之易混。醫能循名責寔。分別而治。則善



証治歌

手足不收卒仆僵。痿癱昏厥中風殃。有名中腑証兼臟。駭見前人謂  
渺茫。上論亦詳不重述。免人駭異亂成章。中風血脈臟和腑。瘖厥神  
昏中臟當。惟有參芪煎灌妙。薑湯莫及獨參湯。三生飲進或甦解。后  
速調扶脾腎康。仆厥言滿風中腑。徐扶可搦入中央。有痰可吐薑湯  
妙。續命湯宜加減良。手足不仁血脈中。大蔡丸湯藥是津梁。黃芪俱  
汁亦堪用。最上法治脾腎強。脾統四肢若不足。食難運化痰滋決。不  
惟津液少。騰肺諸臟無滋失所望。經絡且凝肢不舉。六君薑附可加  
嘗。或將參朮二陳妙。元氣若難生養宜。五福飲投正合病。十全大補

養陰固火。衰難。以生。扶土。薑附。四君。以攝。長。以用。理中。湯。亦。如。總。宜。  
附子以回陽。拘攣強直。肝無養。六味。地黃。是大綱。大小營煎。堪對証。  
左歸丸。好不荒唐。陽虛。難以生陰血。八味。地黃。不待商。更有。地黃。飲。  
子美。右歸丸。進亦輝煌。不仁。手足。在乎右。元氣素虛。風賊戕。湯用六。  
君。加竹瀝。鈎藤。薑汁。三般。裹。不仁。手足。偏居左。陰血有虧。氣衰傷。四。  
物。湯中。加竹瀝。鈎藤。薑汁。仍同。藏。若逢。左右。不仁者。八珍。奏。味。同上。  
行。有類。中風。當細辨。濕。同火。氣。役。勞。房。有名。食。厥。中。寒。暑。迷。一。病。方。  
宜。審。詳。冬。月。中。寒。卒。仆。厥。理。中。麻。桂。加。無。防。暑。炎。夏。月。中。昏。愢。十。味。  
香。薷。目。厥。祥。中。濕。風。因。疫。熱。盛。汁。加。清。燥。竹。和。薑。食。傷。難。運。致。昏。愢。



湯進六君加木香。火盛水衰。因中火。四君六味丸獨參將。內因怒動肝經火。湯用柴胡解激昂。中氣七情因過極。丸名蘇合香遺芳。氣緣勞役耗傷厥。惟有補中益氣臧。房勞精竭神亂散。地黃六味起膏肓。病方畧敘。須當記。何致証臨無主張。

月底

左關脈浮弦。風中肝胆之中。右寸脈洪大。風中大腸肺臟。左尺浮滑。膀胱合腎之間。右關浮或洪大。在脾與胃之際。右寸浮澁或來短大。腸與肺之經。左關浮緊或沉細而緊。皆屬風邪。左關細弱或浮緩均係裡寒。浮洪帶數。風寒夾熱。洪數帶滑。寒熱兼夾。寸脈獨弱者。陽氣不足。尺脈獨弱者。陰氣不足。此其大略也。

者爲中寒。脈洪數者爲中暑。脈弦滑者爲中濕。脈浮洪者爲中火。中氣者。肝脈弦長。食厥者。脾脈沉伏。過勞之傷。脾脈必弱。房勞傷者。腎脈必虛。

# 方

三生飲 治中風。卒昏憤。痰涎壅盛。語言蹇澁等症。

生南星

一兩

生川烏

去尖

生附子

去皮各五

右每服一兩。加人參一兩煎。

加減小續命湯 治中風不省人事。精神憤亂。半身不遂。筋急拘攣。

口眼喎邪語言蹇澁風濕腰痛痰火併多六經風中及剛柔二

防風

小三

杏仁

去皮尖炒研

桂枝

麻黃

川芎

酒洗

人參

白芍

酒炒

炙草

黃芩

酒炒

防已

各五分

附子

四分

右每服三錢加薑棗煎筋急語遲脈弦者倍人參加苡仁當歸去

芍藥以避中寒煩燥不大便去桂附倍芍藥加竹瀝日久不大

便胸中不快加大黃枳殼臍寒下利去黃芩防已倍附子加白

朮嘔逆加半夏若語言蹇澁手足戰掉加石菖蒲竹瀝身痛發

摘加羌活口渴加麥冬花粉煩渴多驚加犀角羚羊角汗多去

麻黃杏仁加白朮舌強去桂附加石膏有汗去麻黃加附子無

大秦朮湯 治中風手足不能運動舌強不能言語風邪散見不拘

一經者。

秦朮

石羔各三兩

當歸洗酒

白芍炒酒

炙草

羌活

生地洗酒

川芎

熟地

白朮炒土

茯苓

黃芩炒酒

防風

獨活各一兩 白芷

細辛五小

右每服一兩。兩濕加生薑。春夏加知母。心下痞加枳壳。

黃芪諸汁散 治心與胃虛不能致其氣於氣海而宗氣散失分布

不周經脈則四肢廢。

黃芪二人 當歸 白芍各一兩 防風 桂枝 勾藤各五

竹瀝 薑汁 荊汁 葛汁 梨汁 乳汁

石水煎諸藥去滓。后將諸汁各一鍾。對分四服。

大營煎 治真陰精血虧損。及婦人經遲血少。腰膝筋骨疼痛。或氣

血虛寒。心腹疼痛等症。

當歸三五 熟地三五 枸杞二 杜仲二 炙草一二 牛膝半

肉桂二三

石水煎。食遠溫服。

小營煎 治血少陰虛。此性味平和之劑也。

右水煎食遠溫服。

五福飲 治五臟氣血虧損。

熟地五七 當歸二三

白朮土炒三

炙草小

人參

右加生薑水煎服。

地黃飲子 治中風舌瘡不能言。足痿不能行。此少陰氣厥不至名。

曰風痲急當溫之。

熟地 上桂 巴戟去心

山茱萸 肉蓯蓉酒浸

附子炮

石斛 茯苓 石菖蒲 遠志 麥冬

五味子各等分



右每服五錢入卜荷少許薑棗煎服。

理中湯 治自利不渴。寒多而嘔。腹痛瀉瀉。或結胸吐蛇。及感寒霍

亂。

白朮

土炒  
二兩

人參

炮薑

炙草

各一兩

右每服四錢水煎服。

十味香薷散

治暑熱內傷。頭重吐利。身倦神昏。

香薷

三兩

厚朴

姜水炒  
半兩

扁豆

炒  
半兩

茯苓

二兩

甘草

半兩

木瓜

半兩

人參

二兩

黃芪

三兩

白朮

二兩

陳皮

半兩

右水煎冷服。

體重身痛肢倦口渴便秘。

黃芪

炙一  
小半

蒼朮

小一

白朮

土炒  
一小

陳皮

茯苓

澤瀉

各五  
小

人參

升麻

各五  
分

當歸

酒洗

生地

麥冬

去心

炙草

神麴

炒

黃柏

酒炒

猪苓

各二  
小

柴胡

黃連

各一  
小

五味

粒九

右每服五錢。水煎服。

柴胡湯

治怒動肝火。懣冒不語。

柴胡

三  
小

肉蓯蓉

酒浸  
二小

麥冬

去心  
小半

熟地

三  
小

白朮

二  
小

甘草

小

白芍

酒炒  
二小

川芎

小半

大棗

五  
枚

生薑

三  
片

水煎服

蘇合香丸

治傳屍骨蒸。癰疽肺痿。疰忤鬼擊。心痛霍亂。吐利時氣。

鬼魅瘡瘡。赤白暴痢。瘀血月閉。疰癰。丁腫驚癇。鬼忤中人。小兒

吐乳。大人狐狸等病。

白朮

青木香

烏犀角

屑香附炒去毛

沉香

硃砂

飛研水

安息香

另研無灰酒一升熬膏

丁香

華撥

射香

研阿梨勒

慢取皮肉

白檀香

各二兩

龍腦

研

蘇合香油

入安息香膏內各一兩

薰陸香

別研一兩

右爲細末。入研葯和勻。

用安息膏煉白蜜和丸。如梧子大。早晨取

井花水溫令任意化服。

四丸。小兒老人化服。一丸。酒服亦可。要

空心服之。用蜡紙裹一丸。如彈子大。入絹袋當心帶之。凡一切