

景岳全書卷之六十四春集

外科鈴古方

會稽

張介賓

會卿著

魯稽

魯超

謙菴訂

外科

仙方活命飲一治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰

此止痛消毒之聖藥也

川山甲

蛇粉炒黃

白芷

防風

天花粉

赤芍藥

歸尾

乳香

沒藥

貝母

皂刺

甘草

各錢

金銀花

陳皮

各三錢

酒一碗煎數沸溫服

托裏消毒散

治瘡疽元氣虛弱或行攻伐不能潰散服之

未成即消已成即潰腐肉即去新肉即生若腐肉既潰而新

肉不能收斂屬氣虛者四君子湯為主屬血虛者四物湯為

主氣血俱虛者十全大補湯為主並忌寒涼消毒之劑

人參

隨證增減

黃芪

鹽水拌炒

當歸

川芎

芍藥

炒

白朮

炒

茯苓

各一錢

金銀花

白芷 各七分

甘草

連翹 各五分

右水煎服○陳氏托裏消毒散內多陳皮方在痘瘡○

秘方托裏散 三

治一切瘡毒始終常服不致內陷

瓜蒌 大者一個

當歸 酒拌

黃芪 鹽水炒

白芍藥

甘草 各一兩半

熟地

天花粉

金銀花

皂刺 炒各一兩

右每用藥五兩以無灰酒五茶鍾入磁器內厚紙封口再用油紙重封置湯鍋內蓋煮至藥香取出分服直至瘡愈○立齋曰此方藥品平易消毒之功甚大且不動臟腑不傷血氣

不問陰陽腫潰屢用屢效真仙方也常治發背腦疽勢盛者
更用隔蒜灸之若脉沉實大小便秘者先用疎通而後用此
其功甚捷若火毒已退不作膿或不潰者更宜托裏潰而不
飲及膿清者用暖補

神功托裏散

四

一名金銀花散○治癰疽發背腸癰乳癰及

一切腫毒或癰痛憎寒壯熱

金銀花

黃芪

當歸

甘草

等分

右用酒水各一鍾煎至一鍾分病上下食前食後服之少頃
再服一劑相敷患處不問老少虛實皆可服若爲末酒調服

尤妙

參芪托裏散 五

治瘡瘍氣血俱虛不能起發或腐潰不能收

歛及惡寒發熱者

人參

氣虛多用之

黃芪

炒

白朮

炒

當歸

熟地

芍藥

酒炒

茯苓

陳皮

各一錢

右水煎服

參芪內托散 六

方在痘疹七

治癰疽膿毒不化及潰後作痛

托裏養營湯 七

治癰癤流注及一切癰疽不足之證不作膿

或不潰或潰後發熱或惡寒肌肉消瘦飲食不思睡臥不寧
盜汗不止

人參

黃芪 炙

當歸 酒拌

川芎

芍藥 炒

白朮 炒各一錢

熟地 二錢

五味子 炒研

麥冬

甘草 各五分

水二鍾薑三片棗一枚煎七分食遠服

托裏黃芪湯 八

治癰疽氣虛作渴甚效

黃芪 蜜炒六錢

甘草

天花粉 各一錢

水二鍾煎八分頻服之○加人參一錢亦可○若氣血俱虛

膿血大泄而作渴或兼發熱者宜用托裏養營湯

內補黃芪湯九

治癰毒內虛毒不起化久潰後諸虛迭見

黃芪炙

麥冬各一兩

人參

熟地

茯苓

甘草炙各七分

白芍藥

當歸

川芎

遠志

官桂各五分

右每服一兩薑棗水煎服

托裏當歸湯

治潰瘍氣血俱虛或癰熱內熱寒熱往來或

婦人諸瘡經候不調小便頻數大便不實等證但瘡瘍氣血

虛而發熱者皆宜服之久服亦收斂瘡口

人參

黃芪

當歸

熟地

川芎

芍藥 各一錢

柴胡

甘草 各五分

右水煎服

托裏健中湯 十一

治瘡瘍元氣素虛或因涼藥傷胃飲食少

思或作嘔瀉等證

人參

白朮

茯苓 各二錢

半夏

炮薑

各一錢

黃芪 半錢

炙甘草 五分

肉桂 三分

右薑棗水煎服

托裏溫中湯 十二

治瘡瘍膿潰元氣虛寒或因剋伐胃氣脫

陷腸鳴腹痛大便澹泄神思昏憤此寒變內陷緩則不治

附子炮去皮乾薑炒三錢

益志 丁香

羌活 沉香 木香 茴香

陳皮各一錢 炙甘草一錢

右薑水煎服

托裏益中湯十三 治中氣虛弱飲食少思或澹不消散或潰

一而不歎

人參 白朮 茯苓 炮薑

陳皮 半夏各一錢 木香 炙甘草各五分

右薑棗水煎服

托裏溫經湯 十四

治瘡瘍寒覆皮毛鬱遏經絡不得伸越熱

伏營中聚結赤腫作痛惡寒發熱或痛引肢體若頭面腫痛
燉甚仍宜發之

麻黃

升麻

防風

乾葛

白芷

人參

當歸

芍藥

甘草

蒼朮

各一錢

右水二鍾煎一鍾服臥煖處得汗乃散○或加柴胡

并裏益黃湯 十五

治脾土虛寒水反侮土以致飲食少思或

嘔吐泄瀉等證

人參

白朮

茯苓

陳皮

半夏

各一錢

炮薑

丁香

炙甘草

各五分

右薑棗水煎服

托裏清中湯

十六

治脾胃虛弱痰氣不清飲食少思等證

人參

白朮

茯苓

陳皮

各一錢

半夏

八分

桔梗

七分

甘草

五分

右薑棗水煎服

托裏抑青湯

十七

治肝木侮脾脾土虛弱以致飲食少思或

胸膈不利等證

人參

白朮

茯苓

半夏

陳皮

錢各一

芍藥

柴胡

甘草

分各五

右薑棗水煎服

托裏營衛湯十八

治瘡瘍外無焮腫內便調和乃邪在經絡

也宜用此藥

人參

黃芪

當歸

甘草

炙

紅花

柴胡

連翹

蒼朮

米泔浸炒

羌活

防風

黃芩

錢各一

桂枝

七分

右酒水煎服

托裏越鞠湯 十九

治大鬱所傷脾胃虛弱飲食少思等證

人參

白朮

錢各二

陳皮

半夏

錢各一

山梔

川芎

香附

蒼朮

分各七

炙甘草

五分

右薑棗水煎服

定痛托裏散

二十

治瘡瘍血虛疼痛之聖藥也

朮散

去帶炒
錢

當歸

酒拌

白芍藥

炒

川芎

錢各一
半

乳香

沒藥

肉桂

錢各一

右薑棗水煎服

內托復煎散 二二

治瘡瘍膿腫在外其脉多浮邪勝必侵於

內宜用此托之

人參

白朮炒

當歸

黃芪鹽水炒

芍藥炒

茯苓

甘草炙

地骨皮

肉桂

防己酒炒

黃芩各一錢

防風二錢

右先以蒼朮一升水五升煎去朮人藥再煎至二升終日飲

之

內托羌活湯 二二

治臂癱堅硬腫痛而人脉緊無力

羌活

黃柏

各一錢

防風

當歸尾

藁本

肉桂

各一錢

連翹

蒼朮

米泔浸炒

陳皮

各五分

黃芪

鹽水炒一錢半

右水酒各一鍾煎八分食前服

內塞散

二三

治陰虛陽邪湊襲患腫或潰而不斂或風寒襲

於患處血氣不能運行久不能愈遂成漏證

附子

童便浸炮

肉桂

各一錢

赤小豆

炙甘草

黃芪

鹽水炒

當歸

酒拌

茯苓

白芷

桔梗

炒

川芎

人參

遠志

去骨

厚樸

制各一兩

防風

四錢

右為末每服一錢空心溫酒下或酒糊丸鹽湯下或煉蜜為

丸亦可

冲和湯 二四

治瘡屬半陰半陽似潰非潰似腫非腫此因元

氣虛弱失於補托所致

人參

陳皮

各二錢

黃芪

白朮

當歸

白芷

各一錢半

茯苓

川芎

皂角刺

炒

乳香

沒藥

金銀花

甘草節

各一錢

右水酒各半煎服

神效酒煎散 二五

治一切瘡瘍能托毒散毒其效如神

人參

沒藥 另研

當歸尾 各一兩 甘草 三錢

括蘂 一個半
生半炒

右以酒三碗煎二碗分四服○或以爲末酒糊丸桐子大每

服五十丸用酒下善消毒活血

人參黃芪湯 二六

治潰瘍飲食少思無睡發熱

人參

白朮

蒼朮

麥冬

陳皮

當歸

升麻 各五分

黃芪 一錢