


白胎舌總論

長洲張 登誕先彙纂

傷寒邪在皮毛。初則舌有白沫。次則白涎白滑。再次白屑白疱。有舌中舌尖舌根之不同。是寒邪入經之微甚也。舌乃心之苗。心屬南方火。當赤色。今反見白色者。是火不能制金也。初則寒鬱皮膚。毛竅不得疏通。熱氣不得外泄。故惡寒發熱。在太陽經。則頭痛身熱。項背強。腰脊疼等證。傳至陽明經。則有白屑滿舌。雖證有煩躁。如脈浮緊者。猶當汗之。在少陽經者。則白胎白滑。用小柴胡湯和之。腎虛者。理中湯溫之。如白色少變黃者。大柴胡。大小承氣。分輕重下之。白舌亦有死證。不可忽視也。



自序

嘗讀仲景書。止言舌白胎滑。並無黃黑刺裂。至金鏡錄。始集三十六圖。逮後觀舌心法。廣至一百三十有七。何後世證變之多若此。寧知傷寒自表傳裏。舌胎必由白滑而變他色。不似伏邪瘟疫等。熱毒自內達外之一病。便見黃黑諸胎也。觀仲景論中。一見舌白胎滑。卽言難治。安有失治而致變者乎。所以仲景止言白胎已見一斑。不煩瑣屑。後人無先聖治未病之能。勢不得不反覆辨論。以啟蒙昧。蓋邪氣入裏。其虛實寒熱之機。必現于舌。非若脈法之隱而不顯也。況陰盛格陽。與邪熱鬱伏。多有假證假脈。惟驗舌上胎色之滑燥厚薄。昭若冰鑑。無所遁形。由是取觀舌心法。正其錯誤。削其繁蕪。汰其無預于傷寒者。而參入家大人治按所紀。及已所親歷。共得百二十圖。命曰傷寒舌鑑。授之剞劂。以公同志臨證之一助云。

康熙戊申如月誕先張登書于雋永堂

傷寒舌鑑目錄

白胎舌 二十九圖

黃胎舌 一十七圖

黑胎舌 一十四圖

灰色舌 一十一圖

紅色舌 二十六圖

紫色舌 一十二圖

蠟醬色胎舌 三圖

藍色胎紋舌 二圖

妊娠傷寒舌 六圖

傷寒舌鑑
目錄



白胎舌總論

傷寒邪在皮毛。初則舌有白沫。次則白涎白滑。再次白屑白泡。有舌中舌尖舌根之不同。是寒邪入經之微甚也。舌乃心之苗。心屬南方火。當赤色。今反見白色者。是火不能制金也。初則寒鬱皮膚。毛竅不得疏通。熱氣不得外泄。故惡寒發熱。在太陽經。則頭痛身熱。項背強。腰脊疼等證。傳至陽明經。則有白屑滿舌。雖證有煩躁。如脈浮緊者。猶當汗之。在少陽經者。則白胎白滑。用小柴胡湯和之。腎虛者。理中湯溫之。如白色少變黃者。大柴胡。大小承氣。分輕重下之。白舌亦有死證。不可忽視也。

長洲張 登誕先彙纂



舌胎滑白薄

薄白

紅深

舌胎滑白微

微白

紅淡

此太陽裏證舌也。二三日未會汗。故邪入丹田漸深。急宜汗之。或太陽與少陽合病。有此舌者。柴胡桂枝湯主之。

寒邪初入太陽。頭疼身熱。惡寒。舌色微白。有津。香蘇散。羌活湯之類發散之。



南京中醫藥大學
南京中醫藥大學圖書館藏
版權所有

乾厚白胎舌

厚白滑胎舌

乾厚白

厚白



病四五日。未經發汗。邪熱漸深。少有微渴。過飲
生冷。停積胸中。營熱胃冷。故令發熱煩躁。四肢
逆冷。而胎白乾厚。滿口白屑。宜四逆散加乾薑。

病三四日。其邪只在太陽。故胎純白而厚。却
不乾燥。其證頭疼發熱。脈浮而緊。解表自愈。



白胎黃邊舌

白胎黃心舌



舌中見白胎。外有微黃者。必作泄。宜用解毒湯。惡寒者五苓散。


此太陽經初傳陽明府病舌也。若微黃而潤。宜再汗。待胎燥裏證具。則下之。若煩躁嘔吐。大柴胡湯加減。亦有下淡黃水沫。無稀糞者。大承氣下之。



身
寒
舌
監

白滑胎尖灰刺舌

乾白胎黑心舌




此陽明府兼少陽舌也。三四日自利脈長者生。弦數者死。如有宿食。用大承氣下之。十可全五。


此陽明府兼太陽舌。其胎邊白。中心乾黑者。因汗不徹。傳至陽明所致。必微汗出。不惡寒。脈沉者可下之。如二三日未曾汗。有此舌必死。

南京中医药大学图书馆版权所有

白滑胎黑心舌



白胎滿黑刺舌乾




白胎中黑。為表邪入裏之候。大熱譫語。承氣
等下之。倘食復而發熱。或利不止者難治。

白胎中生滿黑芒刺。乃少陽之
裏證也。其證不惡寒反惡熱者。大
柴胡加芒硝急下之。然亦危證也。



藏結白滑舌

半邊白滑舌





或左或右。半邊白胎。半邊或黑或老黃者。寒邪結在藏也。黃連湯加附子。結在咽者。不能語言。宜生脈散合四逆湯。可救十中一二。

白胎見於一邊。無論左右。皆屬半表半裏。並宜小柴胡湯。左加葛根。右加茯苓。有欬嗽引脇下痛。而見此舌。小青龍湯。夏月多汗自利。人參白虎湯。



白胎燥裂舌

白胎黑斑舌



傷寒胸中有寒。丹田有熱。所以舌上白胎。因過汗傷營。舌上無津。所以燥裂。內無實熱。故不黃黑。宜小柴胡加芒硝微利之。

白胎中有黑小斑點亂生者。乃水來尅火。如無惡候。以涼膈散承氣湯下之。十中可救一二。

舌根黃尖白

舌根黑胎白

黃

白

黑


白

邪雖入裏。而尖白末黃。不可用承氣。宜大柴胡湯加減。下後無他證。安臥神清可生。倘再有變證多凶。


舌胎白而根黑。火被水尅之象。雖下亦難見功也。



白胎雙黑舌



白胎雙黃舌





白胎中見黑色兩條。乃太陽少陽之邪入於胃。因土氣衰絕。故手足厥冷。胸中結痛也。理中湯瀉心湯選用。如邪結在舌根咽。而不能言者。死證也。

此陽明裏證舌也。黃乃土之色。因邪熱上攻。致令舌有雙黃。如脈長。惡熱轉失。氣煩躁者。大柴胡調胃承氣下之。



白尖中紅黑根舌

白胎雙灰色舌




舌尖白而根灰黑。少陽邪熱傳府。熱極而傷冷飲也。如水停津液固結而渴者。五苓散。自汗而渴者。白虎湯。下利而渴者。解毒湯。如黑根多。白尖少。中不甚紅者。難治。


此夾冷食舌也。七八日後。見此舌而有津者可治。理中四逆選用。無津者不治。如乾厚見裏證則下之。得湯次日灰色去者安。



白胎中紅舌



白胎尖紅舌



此太陽初傳經之舌也。無汗者發汗。有汗者解肌。亦有少陽經者。小柴胡湯加減。


此太陽初傳經之舌也。無汗者發汗。有汗者解肌。亦有少陽經者。小柴胡湯加減。

滿舌白滑而尖却鮮紅者。乃熱邪內盛。而復感客寒入少陽經也。小柴胡湯加減。


舌尖白而胎黑少。屬寒熱相雜。



白 尖 紅 根 舌



白 胎 變 黃 舌



舌尖胎白。邪在半表半裏也。其證寒熱
耳聾。口苦。脇痛。脈弦。小柴胡湯和解之。

少陽證罷。初見陽明裏證。故胎變
黃色。兼失氣者。大柴胡湯下之。



南京中醫藥大學圖書館藏書

舌黑俱根尖胎白

舌黃根灰尖胎白

黑
白
黑

黃
白
灰

舌根尖俱黑而中白。乃金水太過。火
土氣絕於內。雖無凶證。亦必死也。

此太陽濕熱併於陽明也。如根黃色
潤。目黃小便黃者。茵陳蒿湯加減。

