

仲景傷寒補亡論卷第十五

河 南 郭 綰 訳 六

瘀血園血便血證十一條  
衄血吐血證十條

傷寒狐惑蠶病十條

傷寒百合病十四條

傷寒勞復三十二條

傷寒陰陽易病六條

瘀血園血便血證十一條

仲景曰太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下



者愈其外不解者尙未可攻當先解其外屬桂枝湯  
外解已血未下但少腹急結者乃可攻之宜桃核承  
氣湯雍曰小便不利不可攻也

又曰太陽病六七日表症仍在脈微而沉反不結胸  
其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿而小便自利  
者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也  
宜下之以抵當湯主之

又曰太陽病身黃脈沉結小腹鞭滿小便不利者爲  
無血也小便自利其人如狂者血症諦也抵當湯主

之常氏云小便不利無血者與五苓散

又曰傷寒有熱小腹滿應小便不利今反利者爲有血也當下之不可餘藥宜抵當丸

又曰陽明症其人喜忘者必有蓄血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑者宜抵當湯下之

又曰病人無表裏症發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已下脈數不解合熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血宜抵當湯脈經云若脈數不解而

下不止必協熱而便膿血也

又曰少陰病八九日一身手足盡熱者此熱在膀胱必便血也常氏曰宜用桃核承氣湯芍藥地黃湯雍曰宜先犀角地黃湯

又曰傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便利色白者此熱除也欲得食其病可愈若厥而嘔胸脇煩滿者其後必便血常氏云便血者可黃芩湯雍曰熱已除者畏黃芩

又曰淋家不可發汗發汗必便血常氏云可藥皮湯

又曰太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必圊血也

雍曰凡病各有輕重治病用藥亦有輕重且如瘀血一症用抵當湯依法如此不可易也若其血症輕或治之早者亦不須用只服犀角地黃湯血症稍重及治之差遲者則用桃核承氣湯其重及治之遲者方用抵當湯丸抵當湯丸是十分之藥輕病不宜用也用他藥倣此

衄血吐血十條

仲景曰太陽病脈浮緊發熱身無汗自効者愈

又曰傷寒脈浮緊不發汗因致効者麻黃湯主之

曰麻黃湯發其汗則熱越而出其効必輕

怡雲子云  
若依時發

汗則不効矣  
脉浮緊當用  
麻黃湯  
發汗非致効後用也  
効則愈矣

又曰太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解

表症仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑

劇者必効効乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主

之

又曰傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其

小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必劙宜桂枝湯常氏云疑字悞也設須發汗當用麻黃湯不然用桂枝麻黃各半湯取其小汗出而已。連曰此症不言有汗無汗故後人用藥有疑然反覆詳讀似無可疑者劙家固當用麻黃湯仲景以病仍在表雖當發汗而裏症不大便六七日旣不敢用承氣攻裏亦不敢用麻黃大發汗故止用桂枝逐表邪表解若見裏症待其可下復用承氣攻之也此不用麻黃之意若頭痛必劙六字是此症中一小變症仲景



不言治効法蓋此症其初裏症似重故仲景初欲與  
承氣湯後言仍在表者是表症亦輕也表輕則効効  
則表當解不必用藥雖桂枝亦不當服當移宜桂枝  
湯四字於當須發汗之下看則意亦明矣

又曰陽明病口鼻燥但欲漱水不欲嚥者此必効常  
氏云宜黃芩芍藥湯

又曰脉浮發熱口乾鼻燥能食者則効常氏曰可黃

芩湯

又曰動氣在右不可發汗發汗則効而渴心苦煩飲

則吐水雍曰此有効渴吐水三症故龐氏先五苓散  
以止渴次用竹葉湯以止煩煩止則効退矣

問曰仲景言効家不可發汗亡血家不可發汗此皆  
用麻黃湯何也雍曰王仲弓言久効之家旣已亡血  
故不可汗今緣失發其汗致効當分其津液乃愈此  
論固已當又龐氏之言爲甚明其言曰脉浮緊無汗  
服湯未中病其人發煩目瞑劇者必効小効而脉尙  
浮者宜麻黃湯効已脉微者不可再行也此分有汗  
無汗麻黃桂枝脉浮脉微最爲當理以是論之則小

効者有發汗分津液之理大効者病必自解當聽之  
惟慮其効不肯止則依活人書以藥止之若小効發  
汗無汗則反成大効也

仲景曰少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知  
從何道出或從口鼻或從目出者是名下厥上竭爲  
難治雍曰常氏用芍藥地黃湯以治上竭而不治下  
厥雍謂下不厥則上不竭必先以當歸四逆湯治下  
厥仍灸太谿穴三陰交湧泉穴以止少陰之厥或三  
陰交難取則太谿湧泉尤奇

又曰咽喉閉塞不可發汗發汗則吐血氣微絕手足厥冷欲得蹠卧不能自溫龐氏曰乾薑甘草湯主之

常氏曰咽中閉塞可小柴胡湯發汗吐衄者柏葉艾葉湯氣微厥逆蹠卧者當歸四逆湯雍曰亦宜灸三陰交湧泉穴以止厥逆蹠卧切勿服小柴胡湯

### 狐惑并蟹病十條

金匱要略曰狐惑之爲病狀如傷寒王叔和曰其氣如傷寒活人書曰名狐惑傷寒默默欲眠目不得閉卧起不安蝕於喉爲惑蝕於陰爲狐不欲飲食惡聞

食臭其面目乍赤乍白乍黑千金同病源曰或因傷寒而變成此疾

又曰蝕於上部則聲喝

一作喫  
匱作聲嘔  
金

甘草瀉心湯主之

千金

又曰蝕於下部則咽乾苦參湯淹洗之千金又

曰此由溫毒氣所爲也

病源作濕毒  
者所爲悞

又曰蝕於肛者雄黃散熏之

千金

外熏法宜用千金

也

又曰其人脈數無熱微煩默默但欲卧汗出初得之三四日目赤如鳩眼七八日目四眴黑叔和曰黃黑

若能食者膿已成也赤小豆當歸散主之千金云治  
狐惑當用黃連薰草湯叔和曰病人或從呼吸上蝕  
其咽或從下焦蝕其肛陰蝕上爲惑蝕下爲狐惑  
並用猪苓散主之

千金曰此由濕毒氣濕當作溫然濕所爲者狐惑正病也  
又曰傷寒不發汗變成狐惑狐惑者此自傷寒氣而  
變也

又曰霍病與狐惑百合濕溫之病鬼魅皆相似宜精  
察節氣其新故二氣相搏成此病也

活人書曰狐惑傷寒與濕蠶皆蟲證初得狀如傷寒或因傷寒成此疾雍曰狐惑與蠶雖是兩疾治法不相遠矣

又曰大抵傷寒病腹內熱入食少腸胃空虛三蟲行作求食蝕人五臟及下部爲蠶病其候齒無色舌上盡白甚者唇黑有瘡四肢沉重忽忽喜眠蟲蝕其肛爛見五臟則死當數看其上下唇上唇有瘡蟲蝕其藏下唇有瘡蟲食其肛也殺人甚多因下利而得治  
蠆桃仁湯黃連犀角湯雄黃銳散主之雍曰常見有

舌上齶成瘡不止唇而已病源作上唇內下唇內爲當

雍曰狐惑之蠶病亦多有之因醫者旣汗又吐或又下或利小便亡津液太過熱毒內攻藏府枯焦蟲不得安故上下求食亦有不發汗內熱焦枯而死者凡人之喉及陰肛常有是皆比其他肌肉最津潤處故蟲緣津潤而食之蠶病又不止因傷寒而成多自下感之因居濕地下利不止日久者必得依朱氏服湯用銳散若在肛外可見用蘆薈龍胆塗之尤妙然必

先湯內攻而後淋洗外塗也夏秋之交小兒因下利  
感此疾尤多當須淋洗肛外頻視之見細紅點初有  
十數卽急治之稍遲則增多經夕卽十數倍如倉卒  
不能辨只先以蘆薈加小豆以塗之他藥能殺蟲而  
不能毒人者亦可用醫工不識悞小兒甚多若夫湯  
淹法屢驗

百合病十四條

千金論曰百合病者謂無經絡百脉一宗悉致病也  
皆因傷寒病虛勞大病已後不平復變成斯疾其狀

惡寒而嘔者病在上焦也二十三日當愈其狀腹滿  
微喘大便堅三四日一大便時復小溏者病在中焦  
也六十三日當愈其狀小便淋漓難者病在下焦也  
三十三日當愈各隨其症以治之雍曰孫氏著論皆  
見於古書獨此論中分三焦症古無所見豈其書亡  
乎果分三焦則各有所在諸藥可治不應仲景曰諸  
藥不能治乃時用諸百合湯也千金百合病餘論則  
皆見於金匱矣惟此一論有異

金匱要略論曰百合病者百脈一宗悉致其病也意