

全川邑孱生洪金鼎王友氏纂男謙 洛參訂

眩暈門

眩暈不覺尋常樣。恍如人立舟車上。恰似中風非是風。兩目昏昏或耳聾。肥人多是痰生病。痰之昏昏不一症。頭眩眼花。作嘔清痰祛眩湯立蘇。勞神過度眩暈多屬怔忡心不甯。歸脾半夏與天麻。一服前來心自停。色慾過度腎氣虛。氣虛而目眩暈。無寒無熱身無主。八味真武志可除。勞力饑寒得眩暈。速宜氣血與補中。天麻半夏砂藿用。醫家用藥甚從俗。傷食停痰得眩暈。莫作虛痰一樣同。香砂平胃尋常藥。一服前來眩自鬆。真陽不足眩暈症。四肢厥冷見病根。速煎附子理中湯。徐徐吃下自然痊。

眩暈諸方備考

清暈化痰湯 治眩之總司也 陳皮 半夏 白苓 黃芩酒炒各錢半 枳實 川芎 白芷各一北 細辛分 防風 製南星

羌活 甘草各八分

清痰祛眩湯 製南星 法半夏 天麻 煨蒼木錢 枳實 川芎 陳皮 茯苓 桔梗錢 枳壳 烏藥 黃芩酒炒 羌活

甘草各八分

歸脾湯加減 黃芪煨 白木煨 人參 當歸錢 茯苓 神龍 棗仁各八分 志肉 骨木 香為 甘草 半夏 天麻 煨姜汁 引。

八味地黃湯 熟地黃錢 棗皮 山藥錢 一丹皮 澤瀉 白苓各八分 熟附子 肉桂錢 一姜棗 引。

真武湯 附子錢 白木煨 白芍錢 茯苓 甘草各一錢

加減補中益氣湯 黃芪煨 人參 白木煨 當歸錢 一

柴胡煨 升麻煨 甘草各七 陳皮 半夏 天麻 藿香 砂仁炒 各味八分


香砂平胃散 四肢冷加黑姜 蒼木 陳皮 厚朴煨 水甘草錢 二藿香 砂仁各一 煨姜引。

附子理中湯 乾姜 白木 人參 甘草 附子各錢 姜棗 引。

加減人參養營湯 治虛痰虛火心虛眩暈等症

當歸 熟地 白芍 白苓各一 人參 甘草各七 冬冬心 五味 椒陳皮 半夏 棗仁 志肉煨 各一錢 水 肉桂

附子 製南星 天麻 煨各八分



四物二陳湯 治血虛。痰暈。當歸 川芎 白芍 生地黃 陳皮 半夏 白苓 甘草 姜棗為引

癩症論

癩症與中風相似。發時昏不知人。卒然撲地。目上視。口眼歪斜。手足抽掣。或吐涎沫。醒復後又發。有連日發者。有一日三發者。俗云猪圈風是也。治法不外丹溪先生痰與熱二者而已。予每見用桂附者。必成癩狂。慎之。

癩症治法

牛馬猪羊雞五癩。治先尋火與尋痰。脉滑沫出痰為病。脉散腿紅大熱肝。治法充分痰與火。識破樞機總不難。脉滑沫出痰為病。白朮姜蠱天麻兼。南星半夏石菖蒲。茯神細辛與人參。廣皮牙皂同甘草。竹瀝姜汁草噴噴。脉散腿紅大熱肝。清痰降火始能安。瓜蒌黃芩黃連柴胡白。胆草川貝鬱金當。細辛桔梗石菖蒲。廣皮胆草竹瀝浮。橘紅年。夏陳枳實。要愈還加廣木香。痰迷心竅不顛狂。語言不出不須荒。三兩明礬拜魁鬱金散。作丸吞服自然康。

癩症古方備考

導痰湯 主方五癩初起。輕者服之即安。 陳皮 茯神 桔梗 北細辛 石菖蒲 瓜蒌仁 瀉去 薄荷 牛胆

飢躄黃苓 天麻 雄黃 川鬱金 川貝母 甘草各七分 竹瀝姜汁引

硃砂丸 龔廷賢方 治五癩神效。 硃砂一錢 水 全蝎二錢 去頭尾 胆草二兩 製南星二兩 巴豆仁五錢 石反一碗 砂紅入仁在內 反

油紙並去 右為末 麩糊為丸 善湯下

又單方 治五癩 黃丹兩 白礬兩 二味銀罐中煨紅為末 入芽茶一兩 不落水 猪心血為丸 棗豆大 硃砂為衣

四七湯 治癩症因憂鬱而起者 本方加木香南星

茯苓 半夏 甘草 厚朴 一方無厚

六味丸 加鹿角膠 治癩症陰虛夜發者 熟地 棗皮 山藥 茯苓 丹皮 澤瀉 鹿角膠 姜棗引

清神湯 治癩發心熱痰迷心竅者 黃連 研茯苓 棗仁 研石菖蒲 柏子仁 枳殼 甘草 錘姜汁 竹瀝為引

瀉心丸 治肝經實熱癩發腮紅咬牙者 當歸 川芎

涼膈散 治熱痰結胸發癩面赤口渴煩燥者 以此下之

大黃錢三 芒硝 甘草 黑枝仁 炒連翹 黃苓各二錢 薄荷引

醫癩無雙丸 製南星 法半夏 當歸身 生地黄 石羔酪一 天麻錢 姜虫 荆芥穗 獨活 犀角引



白苓 志肉 麥冬 棗仁 辰砂 人參 白朮 陳皮 川連 各五白附 牛黃 珍珠 川芎
 黃苓 甘草 各三金箔 三十 右藥共為末 煉蜜為丸

予治一人。每發癩時。面白口吐涎沫。此脾虛風痰上湧。予用白朮白苓半夏南星陳皮各錢。天麻姜虫細辛葛蒲各錢。即醒後用六君子湯加天麻十劑。以收全功。

予治一婦人。每發癩時。脉散腮紅。諸醫以脉散為虛。用桂附六君子湯。轉至咬牙手足抽掣。月信每月在前。五日行經。前三日發癩。更甚。予用洗肝散數劑。行經對月。懷孕而安。

洗肝散 薄荷當歸川活枝仁熟大黃木通甘草 各一錢 外加黃芩香附 各一錢 二十餘劑全愈。

發黃疸症分五名。總為濕熱在脾。脉經大垂危微細吉。治濕利水發汗平。濕在上焦先發散。羌活防風北細辛。柴胡川芎兼白芷。獨活紫蘇赤茯苓。蒼朮葛根吳神曲。生姜甘草不須驚。發表之後用羌苓。白朮茯苓澤瀉。俾肉桂用之多與少。為君還是用茵陳。

陰疸症而黃帶黑色脉細無力神力不足

女勞陰疸另有方。勸君切莫用寒涼。四物四君茵陳入。少加桂附自平康。不愈速投八味丸。管教陰疸見奇方。

四物四君 當歸川芎白芍熟地白朮白苓甘草人參各一錢

八味丸 熟地棗皮淮山澤瀉丹皮白朮肉桂附子
 又治黃疸方 用小螺蛳廿生搗爛放水酒吃即安用大田螺亦可
 又方治黃疸無腫依方法製五倍子半斤炒青礬四兩炒白神麩半斤醋三味共為末姜汁一盞紅棗子去核取肉半斤同藥

搗為丸 忌食生冷一方 針砂炒紅醋 忌食鹽

痢症三忌 一忌發汗 一忌大下 一忌利小便
 一初起要逐行氣不可驟補補則毒留
 一行滯解毒後要和血和氣半消半補
 一痢漸愈要補血補氣度免腫痢寒厥



東風散 痢症主方。隨時加減百發百中。蒼朮地榆當歸赤芍黃芩甘草丹皮紅花枳殼檳榔山查厚朴青皮各一

艾葉引

一血止腹痛本方去當歸地榆加烏藥香附。錢一
一白多紅少氣虛微痛本方吳萸乾姜各味五分

一理急後重痛不可忍本方加青木香桃仁各一錢

痢症總論 東方散主方

東風倉朮地榆歸尾赤芍黃芩甘草施丹皮紅花陳枳殼檳榔查肉厚朴青皮血止歸尾榆紅去烏藥香附換為葛蘆急後重
苦難當加入青木香桃仁泥白多微痛氣虛寒吳萸乾姜不待遲有執略加北朮胡蘆痢兼行瘧後醫
久痢氣虛雖和血當歸白芍川芎生地吸故止小茴香附米烏藥甘草真可遇以葉為引不痛加粟壳
氣虛足痛恐為缺古用補中益氣湯此是痢中王道藥故止還加廣木香方載本門後

噤口痢

噤口痢症有驗方。砂糖少許與煨姜。食鹽火煨二三分。陳倉米炒一撮共煎湯。若還初起為火盛。木香黃連丸不須慌。吃後胃
開能入藥。倉朮陳皮川朴良砂仁當歸同白芍。藿香煨胃共煎膏。外方用田螺搗爛數臍立效。

懷胎痢症

懷胎痢症苦難言。好把三奇湯連煎。黃芪三錢防風八分。加土陳枳殼一錢。舌上黑胎無口渴。三分增入好川連。若還破氣煎
行血忽然胎下是誰短。

臨產下痢

臨產下痢不須慌。只用三物膠艾湯。阿膠艾葉石榴皮。徐徐吞下自然康。加荊芥一錢當歸川芎各一錢。尤妙痛加玄胡一錢。

痢症古方備考

養臟湯 治痢便膿血如魚腦髓後重脫肛臍腹痞痛。

人參

白朮各一肉桂 訶子取厚木香 肉寇 枳殼 粟壳 密炒 黑棗 煨姜 為引。

溫脾湯

治久積熱痢下赤白 熟大黃 四錢 人參 甘草 炮姜 二錢 附子 一錢

厚朴湯

治二三年熱痢不止 厚朴 乾姜 阿膠 蒲黃 炒 黃連 吳萸 水炒 各 石榴皮 艾葉 各五分

椒艾丸

治久痢完穀不化肌肉消瘦 川椒 烏梅肉 艾茸 乾姜 赤石脂 飛過 醋糊為丸



南京中醫藥大學 圖書出版權所有

知母錢草菓一個煨甘草分生薑紅菓引。

一度瘧壯熱讒語狂悶宜服涼膈散 大黃三錢芒硝錢連翹去心黃芩錢黑枝仁錢淡竹葉錢甘草分燈心為引。

一暑天發瘧但熱不寒口渴宜服白虎湯。

石羔三錢知母二錢甘草一錢糯米一撮。

一秋涼後發瘧或傷食飽悶寒熱嘔吐宜服清脾飲。

柴胡五錢半夏黃芩各八草菓煨去殼取甘草白朮各七青皮川厚朴各錢半。

一寒多熱少者且服柴胡桂姜湯 柴胡錢半夏錢參錢黃芩錢甘草分肉桂錢乾姜五分。

一瘧發於午前初起是陽分受邪易愈宜柴胡湯加桂枝白芍 柴胡錢半半夏一錢黃芩七分甘草七分。

桂枝錢半白芍一錢生薑為引。

一瘧發於午後是陰分受病必用升發其邪宜補中益氣湯加桂枝錢半白朮一錢黃芪一錢當歸錢半。

人參五分升麻陳皮各五柴胡八分姜引。

一瘧夜發名鬼瘧此邪入血分宜升散血脉之邪當服內補建中湯加升麻首烏 肉桂錢當歸錢白芍二錢甘草一錢。

升麻首烏一錢姜菓引。

一山嵐瘴疔瘧用祛除疫之藥宜服七寶飲 常山炒一錢檳榔二錢菓去殼青皮七分甘草七分川朴七分姜引。

常山檳榔青皮各錢二川山甲炒錢五分甘草當歸二錢生薑烏豆引。

一三陰瘧發微寒微熱脈虛無力不煩不渴宜服八味地黃湯。

熟地黃二錢棗皮一錢澤瀉八分淮山藥一錢白茯苓八分肉桂一錢熟附子一錢。

一古方鬼哭丹斬鬼丹鼈甲丸瘧母丸之類准善用者始見奇功否則恐無益而有損矣慎之慎之。

泄瀉門

脈傷於風則浮傷於寒則沉細傷於暑則沉微傷於濕則沉緩微小者生數大者死凡泄瀉有濕有大有寒有氣虛有食積有

脾泄有腎泄有痰泄各種不同分例而治之庶無誤矣 一瀉水而腹不痛者濕泄也宜服胃苓湯。

蒼朮炒川厚朴姜水茯苓白朮炒澤瀉白茯苓白芍酒炒各甘草五分肉桂五分。



一瀉水而腹不痛。兼外感頭痛。風濕也。宜服升陽降濕湯。

蒼朮漂炒陳皮 羌活 防風 柴胡 羌活 澤瀉 麥芽炒神曲炒甘草 藿香各等分燈心煨姜為引。

一瀉瀉飲食入胃完穀不化者。虛寒也。宜服香砂六君子湯。

藿香梗 砂仁炒各 白朮炒陳皮 白苓 法半夏 甘草各二錢人參五分煨姜引。

如服前方不應。是臟寒也。又服建脾理中湯。

人參 白朮土炒 白苓 白芍酒炒各陳皮 蒼朮 炮姜 升麻 甘草 肉豆蔻煨去訶子煨去紅棗引。

一泄一陣痛一陣。火泄也。宜服黃芩芍藥湯。

黃芩酒炒 白芍酒炒 甘草生用各等分燈心為引。

如服前方不應。又服加四苓散。

白朮 白苓 茯苓 澤瀉 木通 黃芩 白芍 熟生黃 黑枝仁炒甘草

一瀉瀉或多或少。或時瀉時止者。痰泄也。宜服加味二陳湯。

陳皮 半夏 白苓 白朮 蒼朮 川厚朴 砂仁 車前 木通 淮山藥 甘草各等分燈心為引。

一泄時腹痛甚。泄後痛減者。食積也。宜服保和丸消導之。

蒼朮 陳皮 白朮 白苓 半夏 砂仁 香附 神曲 白芍 川厚朴 甘草各等分燈心為引。

一泄瀉四肢厥冷。肚腹微痛者。寒泄也。宜服加味理中湯。

白朮炒 乾姜炒 人參 白苓 砂仁 煨用朴 蒼朮 熟附子 甘草各等分姜棗引。

一泄日夜無度。腸胃虛寒不禁。宜服八柱散以溫之。

人參 白朮炒 肉蔻煨去 乾姜 甘草 粟壳醋炒 軀子煨去核 熟附子各等分姜棗為引。

一泄暑氣過於外。陰冷伏其中。宜服連理湯以和之。

乾姜 人參 白朮 甘草各一錢赤苓 川連酒炒五分燈心為引。

一五更泄瀉。腎虛也。宜服六味合四神丸。

熟地 二錢 棗皮 淮山 澤瀉 白苓 丹皮 故紙各一錢 肉豆蔻煨去油

一泄瀉經年不止者。屬寒積也。宜服簡急丸神效。

巴豆仁 去淨油一錢 乾姜炒黑五錢 熟庄黃五錢 陳蜜為丸。

一大瀉如傾。元氣漸脫。手足冷至節。宜速用回陽飲以救之。



南京中醫藥大學圖書館版權所有

人參一錢熟附子三錢黑姜三錢肉桂三錢

一久瀉穀道不入或脫肛乃元氣下陷大腸不行皮合而然宜服加味補中益氣湯黃芪蜜炙二錢人參一錢白朮炒

當歸土炒升麻酒炒陳皮各六分訶子一個去核肉豆蔻一個去油五倍子烏梅肉錢炒糯米半盞炙甘草一錢

一年老泄瀉多氣虛更宜風藥以勝之當服加味補中益氣湯黃芪人參白朮白芍當歸各味二錢升麻六分

羌活防風各五分小茴故芷各一錢

一老人消運不及膨脹作泄宜服丸味資生丸人參白朮白苓各二錢炙甘草錢半橘紅八分山查肉醋炒神曲醋炒

七分豆蔻一錢川連酒炒三分加木香三分

又集賢方備考

一食下即响响即瀉諸藥不效以生红柿核紙包水濕煨熟食三四個即止柿餅內者亦可

一方用雞子一個開一小孔入胡椒七粒紅紙封口微火煨熟用好酒送下連椒一齊吃下即止

一方暴泄初起用車前子甘草煎湯服即止

一方泄瀉腹痛甚生薑豆豉胡椒煎湯熱服立止

一方久泄不止用糯米炒熟一升磨粉每日調吃一二盞即愈

一方治間泄瀉久而不止用公豬肚一個炒糯米半升入豬肚肉紋熟取出晒乾為末打糊和六味地黃丸全料加肉豆蔻一

兩吳萸五錢故芷一兩北五味一兩為末煉蜜和為丸每日早晚服一兩服完即安

一方治吐瀉不止用棉紗一兩煎水吃效

一方漿水散治夏天酷暑暴瀉如水周身疼痛汗出脈弱少氣甚者如吐此名緊急症熟附子一錢乾姜一錢

甘草八分良姜七分肉桂一錢半夏一錢漿水煎服

二神丸補骨脂鹽水炒一兩肉豆蔻煨去油一兩

四神丸補骨脂一兩肉豆蔻一兩吳萸五錢木香五錢體虛之人去木香以五味子代之

大便閉

經云脉多沉伏而結陽結脉多沉實而數陰結脉多伏而遲老人虛人便閉脉雀啄者死夫陰陽二氣貴乎不偏然後津液流通則傳送如經矣調養乖張遂感閉結之患



一大臟實熱精神壯旺大便閉結者用大黃湯。

生大黃 芒硝 牙皂各等分水煎一服立通。

輕則用小承氣湯。生大黃加川厚朴。生用陳枳實各二錢燈心為引。

一大便閉結上下氣不相接及老年血枯宜服潤腸湯。

當歸 潤腸者生地 熟地各三錢大麻仁 搗碎二錢桃仁 去皮去核 紅花 牡丹 麻 蘇 熟 生 黃 三 錢 甘 草 一 錢 生 白 蜜 為 引。

一便閉脾虛不能運化倦怠懶於言動宜服補中益氣湯。

黃芪 蜜炒 白朮 杜當歸 各二人參 北柴胡 升麻 陳皮 甘草 各一錢生白蜜麻油煎熟為引。

又方 同上治 熟地黃 肉苁蓉 酒洗當歸 黃芪 蜜炒 各人參 炮桃仁 去皮去核 大麻仁 用蜂蜜為引。

一氣閉飽脹用導氣丸 廣木香 另磨汁 檳榔 枳殼 火麻仁 各三錢。

一傷食便閉用導滯散 蒼朮 陳皮 枳殼 川厚朴 山查肉 神曲 香附 黃苓 各二錢。

古方蜜酒法 用蜜煉熟熬如指長二三寸蘸皂角末少許納入穀道中良久糞自出。又方用姜針蘸蜜插入穀道中糞自出。

又方 用甘遂五分 麩粉裏火煨熟取出為末入射香三厘以飯搗為丸淡姜湯下立通。

小便閉

經云 三焦者決瀆之官水道出焉。膀胱者州都之官津液藏焉。氣化則能出矣。仲景曰。氣行則小便宜通。又曰。脾病則

九竅不通。丹溪云。以吐法通小便。上竅通而下竅之水出焉。然并提止可施于渴。滴不通者。若淋漓短少者。非所宜也。東垣云。小便不通。分在氣在血。而治之。以渴與渴而不辨之。渴而小便不利。熱在上焦。氣分不渴而小便不通者。熱在下焦。血分

各分治例於後。

一膀胱有熱小便不通宜服八正湯。車前子 熟大黃 瞿麥 扁蓄 木通 山查肉 甘草梢 滑石末 各等分。

禹功散 治同上 陳皮 法半夏 赤茯苓 山枝仁 炒黑 各一錢 澤瀉 白朮 炒 各條 黃苓 一錢 升麻。

甘草梢 各五分

導水散 治同上 當歸 瞿麥 車前子 滑石末 赤茯苓 澤瀉 朱苓 石連子 去壳 山枝仁 知母。

黃連 酒炒 甘草 各等分

一小便不通用寒涼藥不效是元氣虛而不能輸化補中益氣湯。黃芪 白朮 當歸 各二錢 人參 升麻 柴胡。



北京中醫藥大學圖書藏版權所有

陳皮 甘草 澤瀉各七分 蚯蚓五條為引。
如不應又服七味地黃丸。熟地黃二錢 棗皮二錢 山藥一錢 澤瀉 白苓 丹皮 肉桂各七分 燈心為引。

草方備考

一方 用朴硝為細末。每服二錢。太尚煎酒吃即效。又方用猪胆汁對熱酒中服之立效。又方用蚯蚓屎研冷米泔湯服之效。又方用葱一把剉爛炒熟布包熨臍即通。又方用紫蘇煎湯入火盆內令病人坐上薰蒸外用炒鹽熨臍即通。

洪氏經驗新方

一人患小便不通淋漓作痛服藥通利皆不應。予用黃荊子苦瓜楊芽茶通草煎吃小便即出。
一人患小便不通痛不可忍服涼藥補劑皆不應。予用六味地黃湯每劑用通草五錢蚯蚓十數條。凡炙乾煎湯飲水而愈。
二十餘劑全愈後生二子。
一人患小便不通則如米泔。予用朱苓澤瀉赤苓生地黃蒼朮木通木瓜甘草梢燈心為引即效。
一人患小便不通兼頭痛。予用六味地黃湯加車前子川牛夕蚯蚓五條引火下行小便通頭痛亦止。
一人患小便不通小腹痛。予用小便一磁碗放玉莖八小便內小便即出。取同氣相求之義也。即效真奇方也。
一人患小便不通久而不愈。自用燈透入即通。授予梓以傳人亦奇方也。

嘔吐

得食即嘔。知為火。停久而吐。却是寒。久疾胃虛。食不下。吐來完穀。更難醫。嘔酸與苦為胃熱。清水不渴。胃虛寒。嘔穢有聲無物。出清水虧分見喘。若遠塵水成益吐。脾敗。任是仙丹命不長。

一嘔吐因外感風寒內傷飲食頭痛腹痛宜藿香正氣散。紫蘇梗 大伏皮 陳皮 川厚朴各二錢 桔梗 茯苓 半夏 白芷各錢半 藿香一錢 甘草一錢 腹痛加山查白芍熱加柴胡。

一嘔吐有痰有大宜清熱導痰湯。橘紅皮 法半夏 白茯苓 山枝仁炒黑 黃芪 飲酒炒 竹如燈心為引。

一嘔吐有實火。口渴腹痛宜服黃連石美湯。川黃連 酒炒 煨石羔 三錢 竹如燈心為引。

一嘔吐胃虛不渴宜服香砂六君湯。人參 白朮 白芍 乾姜炒二錢 廣皮 半夏 藿香 砂仁 煨姜引。

一胃寒嘔吐小腹痛宜服丁香和胃飲。乾姜 吳萸 公丁香 人參各五分 大棗引。



南京中醫藥大學圖書藏書

一嘔吐神倦。胃口不納。食四肢無力。宜服胃關煎。熟附子 黑乾姜 上肉桂 川花椒 去壳藿香 砂仁 各一錢

小腹微痛。加吳更三分為引。
一嘔吐有聲無物。腎虛也。宜服七味地黃湯。熟地黃二錢 淮山藥 淨棗皮 上肉桂 各一錢 澤瀉 八分 丹皮 八分

白茯苓 八分 川花椒 為引。
鼻方治嘔吐如神。食鹽煨三分 蜜糖三錢 煨姜三錢 炒米一撮 煎服。

一嘔吐即出蛔虫。吐虫活者。即是火易治。虫腐爛者。不治。脾胃敗絕也。烏梅肉二錢 川花椒一錢 檳榔一錢 白礬 各半錢

藿香 砂仁 各六分 乾姜 炒黑七分。
又單方治虫區。用老葱 腦煎水吃。以虫能化葱為水也。

燒針丸。治腦膈嘔吐不止。黃丹 硃砂 白礬 煨過 各等分 為末。以黑棗肉為丸。如黃豆大。每用三四丸。臨用時。以針尖於燈

火土燒過。研爛。米泔水調下。
一腹脹經久。忽瀉數升。晝夜不止。服藥不驗。乃為氣脫。用並智仁 濃煎湯。服立效。

一嘔吐泄瀉。外治方。雄黃一兩 研爛 枯礬五錢 葱腦五個 五倍子一兩 肉桂一錢 財香一分 同搗爛作餅。敷臍上。熨一支烟

香久即安。
又丹方。治嘔吐不止。用綿紗一團。煎水吃。即效。

一嘔吐黃水。吞酸氣痛。用加味逍遙散。當歸二錢 白朮 白芍 各二錢 白芍 柴胡 薄荷 荷枝 仁香 附青皮 各一錢

又方。治同上。用炒鹽一撮 豆豉一撮 炒米半盞 吳更五分 煎吃效。
霍亂症。神霍變亂也。其症心腹卒痛。嘔吐泄瀉。

脉大者。生脉微弱而遲者。死。脉大者。氣少不語。舌捲囊縮者。皆不治。霍亂須分濕與乾。吐空泄盡始能安。霍香正氣是總司。
香砂平胃亦良方。甚則轉筋。仍厥逆。理中姜桂用祛寒。一冒四時不正之氣。吐瀉暴作。宜服霍香正氣散。
藿香 紫蘇 陳皮 厚朴 煨水半夏 白苓 白芷 桔梗 伏毛 甘草 各等分 煨姜引。
一霍亂轉筋。加木瓜。一霍亂飲食不化。如山查神曲。一霍亂腹痛。加白芍 香附。一霍亂小腹冷痛。加肉桂 乾姜。
一霍亂寒熱。加柴胡 全胡。一霍亂冒暑。加香如扁豆。一霍亂上吐下泄。手足厥冷。轉筋。乃陰虛也。宜服理中湯。
人參 白朮 乾姜 甘草



洪氏經驗新方

一人患霍亂水藥不能入手足冷至節舉家惶然無措請予往治予用燒針丸二顆研為末水調以茶匙挑入鼻中隨下喉中少頃又挑入鼻中三次後即以理中湯灌下即不吐又用八味地黃湯二劑手足即暖次日吐瀉皆止但腹絞擾不寧其

名其狀自謂必死予曰無得此症乃吐空泄盡虫無養而發遂用安蛇理中湯二劑全愈

燒針丸用黃丹硃砂白礬枯三味共為末以黑棗肉槌為丸每用時放針尖上入焰火上燒過研爛滾米泔水調吃

理中湯用附子甘姜人參白朮甘草

八味地黃湯用附子肉桂熟地棗皮山茱丹皮白芍澤瀉

安蛇理中湯花椒烏梅乾姜人參白朮附子砂仁炒米

一人患吐瀉霍亂用開水一盞并水一盞對服稍安又用花椒食鹽吳萸同煎吃即安

一人患霍亂上不得嘔下不得泄冷汗如水予用炒鹽半盞入童便一碗溫服少頃得吐即安

一人患霍亂轉筋用皂角末吹鼻得嚏稍愈又用生姜一兩搗爛煎水吃即安

一人患霍亂吐瀉如傾予用樟樹皮熱水溫服效

關格此症與霍亂相似欲嘔不得嘔欲泄不得泄

此症陰陽皆易位名為關格病難按水漿不入知為格不通小水為塞關欲嘔不嘔二便澀生死亡分明反掌間惟有剝臍探吐法起死回生也不難用炒鹽布包臍臍中得小便即解

又方用牙皂煎湯浴小腹及陰囊極效如不愈又服水藥方陳皮半斤茯苓甘草木通枳殼當歸各錢半煨姜引

又方用茯苓半斤白朮乾姜附子朱砂澤瀉肉桂各一錢

又單方用皂角細辛巴豆共為末綿裹納鼻中得嚏即效

呃逆

呃逆須當辨虛實虛或二三實六七脉浮而緩為易治兩關弦緊醫費力使閉聲粗知是火聲低呃緩為虛極膈熱還須竹如湯胃虛柿蒂丁香覓再有單方堪取用隨時加減真有益



南京中醫藥大學圖書館

丹方 用紙條插鼻孔得嚏即止。

又方 治連呃二三十聲用生姜汁令蜜糖煎服即止。

又方 治病後久虛發呃用半夏五錢生薑五錢煎服效。

又方 治體虛常呃但二三聲用公丁香三十七粒家連子去心二十七個二味同煎一碗去渣煨姜一片糯米半升煮粥去

姜噉粥呃即止。

洪氏經驗新方

一婦人產後七日內患呃逆門外即聞其聲連呃不止手足抽掣諸醫用桂附丁香柿蒂等藥皆不效予用半夏五錢生白

五錢先吃隨用當歸二兩川芎一兩荆芥穗炒黑三錢勾藤勾一錢柿蒂二個肉桂六分黑棗六分即安。

一男子常患呃逆聲低懶言請予治之朝用補中益氣湯加沉香為引并清降濁暮用六味地黃湯加北五味鈉氣歸元各數

劑而愈可知醫不執方惟合宜而用。

翻胃此症得之少年者多可治得之老年者十難治一二

反胃多因腎氣虛脈沉定多不足俎得食即嘔知為火停久而吐胃多虧脈數有力為痰火清痰降火可施為脈孔因為血

隔活血急需鶴血靈血氣未枯隨症治法多羊蕪藥休施。

一隔噎反胃初起用五隔寬中飲青皮 陳皮 丁香 厚朴 甘草 香附砂仁白朮木香各等分。

又方 治反胃初起或因吐血後隔食 當歸 桃仁 陳皮 厚朴 紅花各錢半伏毛 川連 煨半夏

黑枝仁 甘草各七分

又方 治實熱隔食 陳皮 半夏 茯苓 連翹 神曲 炒山查 各一川連 姜汁炒 竹瀝為引。

一脾虛反胃朝食暮吐暮食朝吐 用藿香 橘紅皮 丁香 人參 甘草 煨乾姜 各一錢。

古單方備考

一方 用虎猪酥炙為末每服二錢人參淡姜湯下。

一方 用楮朮一具炙脆為末每服二錢加射香五厘酒下。

一方 取田螺一斗水浸取泥晒乾為末燒酒調吃。



洪氏經驗新方

一人患反胃四五月每食下胸膈微痛。作血醒氣。停一二時食物復吐出。諸醫罔效。請予調治。診得關脈浮乳。因詢致病根由。乃曰為暴怒吐血數口。以致此病。予曰脈乳必有瘀血得于胃口。遂用生鵝血一盞食下。忍之再三。勿令即吐。後片時。除痰血半碗。是夜少寐。稀粥竟不吐出。漸次多食。半月後方許食飯。再服八味丸。凡一料全愈。其家疑予有異術。不過以生鵝血八味丸能治是病。予曰非也。常效藥性。鵝性最涼。利五臟。血能涌吐。胃中痰結。開血膈。吐噎。此以血引血。同氣相求之義也。因以獲效。何術之異耶。

一人患反胃。熱涎口渴。予用蜈蚣轉土丸一個。淡姜湯調吃一次。又用田螺壳燒酒調吃一次。稍進稀粥。又進水藥石。

真川連三錢 麝皮 橘紅 半夏各一錢 竹瀝姜汁為引

一婦人反胃。夜食朝吐。他醫以暖胃藥罔效。一日讀東垣書。謂反胃有三。氣積寒也。上焦吐者。從于氣。中焦吐者。從于積。下焦吐者。從于寒。此婦脈沉而遲。暮食朝吐。小水利。大便秘。為下焦吐也。法當通其秘。溫其寒。復以中焦藥和之。遂以吳小尚丁香肉桂半夏二十餘劑而安。

張石頑治楊伯乾子。年及三旬。患反胃。吐出原物。全不穢腐。大便艱澀。小便時白。時黃。屢用六君子理中湯。六味丸皆罔效。此腎臟真陽太虧。不能溫養脾土之故。遂用八味地黃丸一料而愈。

鄰叟友治秦伯源患鬱膈。先用啄木鳥入射香一錢。熬膏。以小罐收貯。時時嗅鼻。以通其結。內服加味道遙散。當歸白朮白芍各一錢。柴胡丹皮黑枝仁薄荷各七分。霍香砂仁各六分。不數劑而安。

腫症

腫症多般。莫亂為。說與醫人仔細。醫風腫皮膚多麻閉。只消發散。莫狐疑。氣腫時消時又復。香平散服最為宜。食積腫水肚腹。痛消食行氣以治之。陽水腫兮小便澀。五皮八正任君施。陰水身涼。脾胃損。實脾全。墮二方奇。更有血腫。從何辨。皮膚亦脈亂。如絲散。血清涼行小水。商陸湯煎。冥可醫。

看腫症法

一上腫下消。皮膚麻閉。當發汗。宜服越脾湯。一腫症以手指陷起遲者。水腫也。當服五皮飲。體虛二便皆清。宜服全墮腎氣湯。一腫症以手指陷隨起者。氣腫也。宜服不香流氣飲。一腫症下腫上消。乃元氣下陷。當升提。宜服補中益氣湯。一因食積腫症。腹痛宜消導。當服消香平散。



諸方考

越脾湯 治風腫感冒初起。體實者得汗自消。

升麻 去節三錢 石膏煨八錢 甘草一錢 生姜引。

越脾湯加白朮 治面目浮腫小便利。

麻黃 碎水炮 石羔煨 白朮 甘草 姜皮引。

五皮飲 姜皮 茯苓皮 桑白皮 大茯苓皮 五加皮。

八正散 車前子 瞿麥 扁蓄各二錢 滑石末 枝仁炒 大黃酒木通 甘草 姜皮引。

香平散 香附炒為末 牽牛炒為末 三稜 莪朮 醋炒 蒼朮 陳皮 厚朴 甘草各等分。

羌活桂枝湯 治發熱汗出四肢浮腫。

桂枝 白芍各三錢 黃芪 蜜炒 水煎服。

禹功散 治發汗後腫不消 牽牛炒四兩 小茴 廣木香各一兩 共為末 姜皮湯下。

牛黃散 治水腫體實者。

牽牛 生大黃各三兩 陳米飯炒枯一兩 神曲打糊為丸。

防已黃芪湯 治身腫汗出怕風。

防已 錢半 黃芪 蜜炒 錢半 白朮一錢 土炒 甘草八分 姜皮為引。

防已茯苓湯 治身腫水氣在皮膚 防已 黃芪 蜜炒 肉桂各三錢 赤茯苓六錢 甘草一錢 共為末。

補中益氣湯 治體虛冒風發腫并清降濁 黃芪當歸各三錢 白朮 廣陳皮 川升麻各八分 人參 柴胡。

甘草各六分 桂枝 防風 木通 木瓜 姜皮引。

復元丹 治脾腎兩虛發腫怕風 附子二錢 白朮土炒 肉桂 吳萸 關水 川花椒 小茴 廣木香 肉豆蔻 蝦去 木瓜 澤瀉 白苓各。

錢 姜皮引。

實脾丸 治脾虛發腫 白朮 附子 乾姜 白苓 木瓜 廣木香 草薢仁 川厚朴 檳榔各等分 共為丸。

瀘川丸 治水腫腹脹體實脉旺者 甘遂 麩裏煨 芒硝三錢 郁里仁一錢 牽牛 大黃各三錢 共為丸。

舟車丸 治同上 牽牛炒二兩 甘遂 麩裏煨 芫花 醋炒 紅芽 大戟 醋炒各一兩 青皮 檳榔 陳皮 木香 各五錢。



輕粉一錢 水糊為丸

金匱腎氣丸 治腎虛腫症 熟地黃四兩 白苓三兩 牛夕肉桂澤瀉車前萊皮山藥丹皮各一兩 附子五錢 煉蜜為丸

丹方 治水腫 用胡蘆壳煎水吃效 加牽牛猶妙

又方 用蠶貼土紙培乾為末 酒調吃二分效 虛腫禁用

又方 用鯉魚入蒜滿腹 煮食大小便齊通 後用健脾丸

又方 伏龍肝燒紅 以好酒淋之 澄清服效

治驗

一人患水腫 脈虛無力 日久不消 予用補中益氣湯 加桂枝防風 防已 生薑引 先服二帖 又用補中益氣湯 加桂枝防風 加

木通 木瓜 香薷 五條為引 四帖全愈

一人患腫 症脾腎兩虛 下腫上消 腎囊如碗 大小便短少 諸醫朝用補中益氣湯 暮用金匱腎氣湯 皆不應 請予治之 予曰 當

服補中益氣湯 兼進腎氣丸 彼曰 前已服過 予曰 陽分當陰受 陰分當陽受 遂令朝服金匱腎氣湯 加蚯蚓為引 暮用補中

益氣湯 加花椒 木瓜 通木香 各四劑而愈

一婦人年十八 患兩足浮腫 皮下紅絲亂紋 發熱 每日放濕地下 退火三四次 稍得安坐 諸醫皆用利水和脾之藥 皆不應 請

予往診 予曰 此症名為膚血脹 非腫症比也 遂用紅商陸一兩 丹皮生地黃紅花木通赤芍木瓜牛夕歸尾各五錢 黃柏桑

皮甘草各三錢 共為末 每服四錢 而安

一人患黃腫 三年不愈 予用小田螺二十餘個 打碎 煑水酒吃 二三次 全愈

一人患氣腫 腹硬 利水和脾皆不應 予用蒼麥粉 每日煑稀粥 吃幾次 氣下行 即愈

一人患氣腫 腹痛 用消腫藥不應 予用三消飲 枳榔三錢 香附牽牛各三錢 廣木香錢半 共為末 每服二錢 服完 氣急稍愈 胃口不開 大便艱

澀 又用熱大黃牽牛 枳榔各三錢 廣木香公丁香白豆蔻川花椒北芥子吳神曲各二錢 水酒為丸 每日吃三次

又服水藥 一日一帖 生黃芪三錢 防已錢半 桂枝赤茯苓防風木瓜桑皮 加皮大伏皮 姜皮茯苓各一錢 漸愈

外用葱白生薑桂枝蒼朮各一兩 煎水洗脚 以開腠理

又用復元丹 以收全功 白茯苓錢半 肉桂一錢 川椒廣木香白豆蔻丁香吳萸各六分 澤瀉木瓜牛夕各一錢 姜皮

引服十劑

引服十劑



天用金匱腎氣丸腫不復發必履如常

吐血門

吐血之脈宜微弱最忌弦長與洪數若還初起兼外因加減參蘇飲的確醫人皆知先降火不知發散為對酌藥速止吐血
留戀生寒氣難投摸不能慎始成勞瘵反言吐血無妙藥又有腹滿胸膈痛甚血嘔來其塊落吐則傾盆或數碗則減者
要藥咯血咳血不同看此是腎虛陰火灼我嘗隨症有驗方依方取用無差錯誤聽庸工雜藥投不如不藥猶可保其
全口訣見效方知是光覺

吐血三宜 一宜行血不宜止血行則不止自止止則血凝不歸經絡變生寒熱病日危矣 一宜養肝不宜攻肝

有所歸伐肝則肝虛不能藏血血愈不能止矣 一宜降氣不宜降火氣降則火降降火則傷脾不能統血矣

吐血三禁 一禁驟用寒藥童便阿膠菲汁草藥之類恐敗血未盡過之自不再吐必致發寒發熱為害非輕 一禁多用

芬黃連黃柏知母之類傷脾胃泄為害深矣 一禁專用人參黃芪肺氣虛補肺必致咳嗽不已慎之

吐血一症人知氣逆血溢升火火泛不知血在臟府另有隔膜隔定極薄極脆一有所傷則破破則血溢于上矣傷處有瘀血
凝結血來則緩若陰火驟冲血來而潮之上湧須乘此時瘀血蕩盡緩緩清理不可驟補亦不可用耗散之藥治血有本矣

吐血不治諸症 一肉脫熱甚者死 一咳血上喘下泄者死 一嗽而左不得眠肝脹者死 一有不得眠肺脹者死 一頸上左右筋跳者

死 一鼻竅痛動氣粗者死

吐血用藥大概論

氣有餘便是火血隨氣上補水則火自降順氣則血不逆阿膠牛夕丹皮補水之藥蘇子橘紅沉香順氣之藥童便者引血歸

下竅兼有行瘀之能藕汁者逢血使無滯而有止瀉之力脈來沉實腹中滿痛或吐血塊或為蓄血當歸桃仁赤芍玄胡義木

大黃之屬怒傷肝木則血逆于上沉香木香青皮赤芍丹皮之屬勞心失血蓮肉棗仁山藥伏神紫蘇柏子仁丹參房

勞吐血熱地枸杞牛夕杜仲人參鹿茸之屬血熱地骨皮丹皮犀角血寒桂心附子血熱不止山枝灰黃連灰血廢髮灰大

黃灰山膝灰血寒乾姜灰血滑棕灰蓮房灰血氣地黃灰 三七鬱金行血中之氣側柏葉涼血中之熱大劑小劑行血中之

滯茅根導之使下行也

一吐血初起吐而不止帶紫黑者宜柏葉湯主之

吐血