

明·薛鎧撰 崇禎沈猶龍閩中刊本

保嬰全書
(三)

新文豐出版公司印行

景自中央圖書館珍藏善本書籍

明薛鎧撰 崇禎沈猶龍閩中刊本

保
嬰
全
書
(三)

新文豐出版公司 印行



保嬰全書卷之十一



明太醫院院使薛己編集

腫瘍一

腫瘍者以瘡瘍未潰而言也經云形傷痛氣傷腫又云榮氣不從逆於肉裡乃生癰腫皆因稟受胎毒或乳母膏粱厚味七情陰火或兒食炙煇甘美積毒氣血不和所致當分其經絡所屬五臟相勝與元稟虧損預為審用

攻補調和之劑速令散潰尤當審其勢之腫
漫色之赤白與痛有微甚毒有表裏若腫高
焮痛便利調和邪在表也宜表散之腫硬痛
深大便秘澀邪在內也宜下之外無拘急內
則便利調和者邪在經絡也宜調榮衛腫焮
大痛或麻木不痛邪氣凝滯也用隔蒜灸及
活命飲若煩躁飲冷赤痛發熱二便不通者
火熱內熾也用清涼飲活命飲加大黃尤善

若微腫微痛或不痛陽氣虛弱也用參芪托
裡散微黯微赤或不赤陽氣虛寒也用加味
托裡散若惡寒而不作膿或膿熟而不潰者
陽氣虛也用加味托裡散如此則未成者自
能消散已成者自能潰腐尤當別其屬陰屬
陽或半陰半陽而治之若泥於腫瘍禁用辛
熱之說不分受症之因無症之經槩行敗毒
泛擾諸經誅伐無過以致不能起發或不能

腐潰收斂變症莫能枚舉癰疽論云腫瘍內
外皆壅宜以托裡表散為主但見腫痛參之
脉症虛弱便與滋補氣血無虧可保終吉嬰
兒有疾兼調其母若腫瘍之際治失其法必
致潰瘍之變症此推內經之微旨而生平之
徵驗者尤當觸類而長思奚庸贅

潰瘍二

潰瘍者以瘡瘍膿潰而言也膿潰而腫消痛

止者為順若膿潰腫痛或發寒熱者氣血虛
也用十全大補湯膿潰欲嘔少食脾胃虛弱
也用六君炮薑手足並冷者脾氣虛寒也用
六君薑桂如不應急加附子膿潰而仍痛或
二便秘滯者熱毒未解也用清熱消毒散熱
退而渴不退津液不足也用八珍加黃芪麥
門山茱萸熱止而小便頻數腎虛也用加減
八味丸料若熱不止或腫痛反甚虛熱內

也用人參黃芪湯或熱退而肌肉不生者
血俱虛也用十全大補湯瘡色天白或陷下
不斂寒氣所襲也用五味異功散佐以豆豉
餅膿血過多煩躁不安乃亡陽也急用獨參
湯尤當審其腫之軟硬飲食冷熱與膿之稀
稠多少肉之赤色微甚青黯及瘡口之收斂
遲速而投托裡消毒調補之劑庶無變症癰
疽論云潰瘍內外皆虛宜以托裡補接為主

蓋潰瘍之變症因由於臍瘍之際治失其宜
虧損元氣之所致治者誠能謹之於始則無
後變之患矣

胎毒發丹三

胎毒發丹者因胎毒內伏或頻浴熱湯或著
烘衣或乳母飲食七情內熱助邪為患發於
頭面四肢延及胸腹色赤遊走不定古人云
從四肢起入腹囊者皆不治當急令人隨患

處遍吮毒血各聚一處吮出之急服活命飲
惟百日内忌斂以其肌肉難任也若發散過
劑表虛熱而赤不退者用補中益氣湯加防
風白芷寒涼過劑胃氣受傷而熱赤不退者
用異功散加柴胡升麻或兼發搐等症用四
君升麻當歸釣藤鈎若復行攻毒必致不起
頭額間患者當卧鑷砭之史少叅孫二歲丙
申正月陰囊赤腫余作胎毒治瘡後患發熱

痰盛等症診其母有鬱火血熱用解鬱涼血
之藥子母俱服而愈至六月初患吐瀉兩眼
睜動或投參朮之類不應以為慢驚欲用附
子藥請余議視其寅卯開脉赤此屬風熱傷
脾用柴胡清肝散加釣藤鈎木賊草一劑即
愈丁酉正月初旬頸患熱毒膿出貼藥忽暴
風啓戶即時發熱翌日頭面黯腫如斗兩耳
厚寸許此風邪上攻血得熱而沸騰也急砭

兩額出黑血三盞許隨用清熱化毒湯黥腫
十退七八翌日復砭則血不甚黑矣仍以前
藥去牛蒡子加熟地黃而愈此症若不行砭
法或作破傷風治必死

一小兒四肢患之外熱雖輕內則大便秘結
此患在臟也服大連翹飲敷神散而瘥

一小兒患之赤暈走徹遍身難以悉砭令人
吮四肢胸背數處使毒血各凝聚而砭之先

用活命飲水酒調二服又以金銀花甘草節
為末用人乳汁調服漸愈月餘後兩足皆腫
仍咬之服前藥而痊數日後兩足復赤或用
犀角解毒丸之類致乳食不進肚腹膨脹此
復傷脾胃而然也敷神功散服補中益氣湯
加茯苓而痊

一小兒腿如霞片遊走不定先以麻油塗患
處咬出惡血其毒即散用九味解毒散而安

一小兒臂患之砭出毒血而愈惑於人言服
護心散以杜後患服之吐瀉腹脹患處復赤
手足並冷余謂此脾胃虛弱前藥復傷用六
君子湯一劑頓愈又以異功散加升麻柴胡
而痊

一小兒患此砭之而愈但作嘔不食流涎面
黃余謂此脾氣虛弱用異功散加升麻治之
吐止食進又用補中益氣湯涎收而安

一小兒患此砭之而愈翌日發搐作嘔手足
並冷此胃氣虛而肝木侮之用異功散加藿
香木香諸症頓止又用異功散加升麻柴胡
而痊

一小兒患此砭之而愈但面赤作嘔飲冷余
謂胃經熱毒未解先用仙方活命飲又用清
熱消毒散各一劑而愈

一小兒腿上患之神思如故乳食如常余謂

毒發於肌表令急砭出毒血自愈不信外敷
寒涼內服峻劑腹脹不乳而死一小兒遍身
皆赤砭之投以解毒藥而愈

一小兒患此二便不利陰囊肚腹俱脹急用
砭法隨以活命飲加漏蘆木通大黃為末時
用熱酒調服至兩許二便俱通諸症頓退却
去三味仍前時服而愈

一小兒患此二便不利腹脹咳嗽用活命飲

加漏蘆朮通麻黃為末時時熱酒調服二便
隨通遍身出汗諸症頓退鼻息似絕無氣以
動時或似躁此邪氣去而元氣虛也急用當
歸補血湯而愈

砭法治丹毒赤色遊走不定令口吮毒血各
聚一處用細磁器擊碎取有鋒芒者以筋頭
劈開夾之用線縛定兩指輕撮筋頭稍令磁
芒對聚血處再用筋一根頻擊刺出毒血輕