

名醫類案
卯

痢

瀉

癰
疽

噎
膈

吐
嘔

吞
酸
吐
酸

欬
逆

腫
脹

痞
滿



名醫類案卷第四

新都篁南江權集後學

仁余集蓉裳
錢塘魏之琇玉橫
仁和沈煥敦曾

重校

琇按謂其病狀揮霍悶亂為邪正交爭之病
夏秋多有

癰亂

江篁南治從叔於七月間得癰亂証吐瀉轉筋足冷多汗囊

縮一醫以傷寒治之增劇江診之左右寸關皆伏不應吐瀉

脈伏尺部極微口渴欲飲冷水是冷囊縮似屬厥陰口渴

無凝之曰直中陰經無有上吐轉筋乃以五苓散與之覺稍

多汗症若少陰頭有汗則死矣
定向午猶渴以五苓加麥冬五味子滑石投之足冷囊縮
似宜急溫

然口渴飲冷又當清既非傷寒更以黃連香薷飲冷進一

服次早脉稍出按之無根人脫形且吃忒手足厥冷

飲食不入入則吐大便稍不禁爲灸丹田八九壯囊縮稍

舒手足稍溫繼以理中湯二三服渴猶甚咽疼熱不解時

或昏沉乃以竹葉石膏湯投之而愈

用藥圓轉當熟玩之所謂見病治病

江應宿治一婦人六月中旬病瘧亂吐瀉轉筋一醫投藿香

正氣散加煩躁面赤揭衣臥地予診視脉虛無力身熱引

飲此得之傷暑宜辛甘大寒之劑瀉其火熱以五苓散加

滑石石膏吐瀉定再與桂苓甘露飲而愈

凡治霍亂俱要辛熱寒涼並用

一僕夫燕京人縱酒飲食無節病瘧亂吐瀉轉筋煩渴幾殆

時六七月淋雨晝夜飲簷溜水數升而愈千金方云輕者水瘥此偶合古方予目擊其事後路途中及六合縣見一人服新汲井花水飲之良愈

一人病癰亂欲吐不吐欲瀉不瀉心腹絞痛脉之沉伏如無此乾癰亂也急令鹽湯探吐宿食痰涎碗許遂瀉非吐瀉則死並

針刺手足脣心出血爲度與六和湯而愈

瀉

琇按內傷外感俱能作瀉惟虛寒者可溫補餘則隨症施治不可執一

東垣治一人一日大便三四次澹而不多胃瀉有時作瀉腹中

鳴小便黃以黃芪柴胡歸身益智陳皮各三分升麻六分

炙甘草二錢。先生得手處在此紅花少許。紅花少用入心養血作補火以生土引經妙

一服名曰黃芪補胃湯。水二盞煎一盞稍熱食前服之。

一人五更初曉時必澹泄一次。此名腎泄。以五味子二兩。

黃半兩。即二神丸用細粒綠色者二味炒香熟爲度。細末之。每

服二錢。陳米飲下。數服而愈。內經曰。腎者胃之關也。關門

不利。故聚水而生病也。

東垣云。予病脾胃久衰。視聽半失。此陰盛。乘陽加之氣短。精

神不足。此由弦脉令虛。多言之過。陽氣衰弱。不能舒伸。伏

匿於陰中耳。又值淫雨陰寒。時人多病泄利。此溼多成五

泄故也。一日體重。肢痛。大便泄并下者三。而小便秘。瀯思

其治法按經云大小便不利無問標本先分利之又云治
溼不利小便非其治也皆當利其小便必用淡味滲泄之
劑利之是其法也噫聖人之法雖布在方冊其不盡者可
以意求耳今客邪寒溼之淫從外而入裏以暴加之若從
已上法度用淡滲之劑病雖卽已是降之又降是益其陰
而重竭其陽則陽氣愈削而精神愈短矣是陰重強陽重
衰反助其邪也故必用升陽風藥以羌活獨活柴胡升麻
各一錢防風根半錢炙甘草半錢煎稍熱服大法云寒
溼之勝助風以平之又曰下者舉之得陽氣升騰而去矣
又云客者除之是因曲而爲之直也夫聖人之法可以類

推舉一而知百也。若不達升降浮沉之理而概施治其愈

者幸也。

爲後學廣開方便之門

子和治一人瀉利不止如傾衆以爲寒治近二十載

非虛寒可知

脉之兩寸皆滑。子和不以爲寒所以寒者水也。以茶調散

湧寒水五七升。又以無憂散瀉水數十行。

當有所去下乃愈

次以

淡劑利水道後愈。此通因通用法也。

一僧藏腑不調。三年不愈。此洞瀉也。以謀慮不決而致肝主

謀慮甚則乘脾。脾溼下行。乃上涌痰半盆。又以舟車丸瀉

川散下數行。仍使澡浴出汗。自是日勝一口。又常以胃風

湯。白朮散調之。

郝允治夏英公病泄太醫皆爲中虛郝曰風客於胃則泄言

殆藁本湯證也夏駭曰吾服金石等藥無數泄不止其敢

飲藁本乎郝強進之泄止邵氏間見錄

丹溪治一老人右手風攣多年積痰見症九月內患泄瀉百藥不

效右手脉浮大洪數此太陰經有積痰肺氣壅遏不能下


降大腸虛而作瀉當治上焦治上用焦妙用蘿蔔子搗和漿水蜜

探之而吐大塊膠痰碗許隨安

一富兒面黃善啖易飢非肉不食泄瀉一月脉大以爲溼熱

當脾困而食少今反形健而多食不渴此必疳蟲也驗其

大便果有蛭令其治蟲而愈至次年夏初復瀉不痛而口



乾朱曰。昔治蟲而不治疳。故也。以去疳熱之藥白朮湯下。三日而愈。後用白朮爲君。芍藥爲臣。川芎陳皮黃連胡黃連入蘆薈爲丸。白朮湯下。禁肉與甜瓜。防其再舉。

一老人味厚傷脾。常脾泄。芍藥酒炒一兩。白朮炒二兩。神曲一兩。山查一兩五錢。黃芩五錢炒。半夏一兩。湯泡爲末。荷葉飯丸。

一老人稟厚形瘦。夏末患泄瀉。至秋深治不愈。神不悴。溺澁。

少不赤。脉澁頗弦。膈微悶。食減。前案因手風攣見浮大洪數之脉以吐而愈。瀉此案

脉澁頗弦因膈微悶而用吐可見不憑在脉因悟曰。必多年沉積。滯在腸胃。詢

之嗜鯉魚。三年無一日缺。朱曰。此痰積在肺。肺爲大腸之

藏宜大腸之不固也。當澄其源而流自清。以茱萸、陳皮、青
葱、薤白根生薑濃煎。和砂糖飲。一碗探吐痰。半升如膠。利
減。半次早又飲之。又吐半升。利止。與平胃散加白朮、黃連。
調服。旬日而安。

一人性狡躁。素患下疳瘡。或作或止。夏初患自利。膈微悶。醫
與理中湯。悶厥而甦。脉瀼。重取畧弦。而數。朱曰。此下疳之
深重者。與當歸龍會丸去麝。四貼而利減。又與小柴胡去
半夏加黃連、白芍、川芎、生薑數貼而愈。
脉與前案同瀼弦
僅多數耳。外症膈
微悶亦同而治法
各別宜細玩之。

一人暴氣脫而虛頓。渴不知人。口眼俱閉。呼吸甚微。殆欲死。

急灸氣海。飲人參膏十餘觔而愈。疑悞入此

呂滄洲治一人病下利完穀。衆醫咸謂洞泄。寒中日服四逆

理中等。彌劇。診其脉兩尺寸俱弦長。右關浮於左關一倍。脾

逆肝其目外皆如草滋。脉浮色青蓋知肝風傳脾。因成殭泄。

非藏寒所致。飲以小續命湯減麻黃加白朮三五升。痢止。

續命非止痢藥。飲不終劑而痢止者。以從本治故也。

一夫人病飧泄。彌年醫以休息利治之。苦堅辛燥之劑弗效。

時秋半。脉雙弦而浮。浮弦爲風曰夫人之病。蓋病驚風。非飲食

勞倦所致也。肝主驚。故虛風自甚。因乘脾而成泄。今金氣

正隆。尚爾至明春。病將益加法。當平木之太過。扶土之不

及而泄自止。夫人曰：儂寓南閩時，平章燕公以銅符密授，因失心懼，由是疾作。公言信然，以黃犢牛肝和以攻風健脾之劑服之，踰月泄止。

滑伯仁治一人，暑月患中滿泄瀉，小便赤，四肢疲困，不欲舉，自汗微熱，口渴，且素羸瘠。衆醫以虛勞將峻補之。伯仁診視六脉虛微，曰：此東垣所謂夏月中暑飲食勞倦法宜服清暑益氣湯，投三劑而病如失。

項彥章治南臺治書郭公，久患泄瀉，惡寒，見風輒仆，日臥密室，以氈蒙其首，熾炭助之，出語呶呶如嬰兒。諸醫作沉寒痼冷治，屢進丹附，不時驗。項診其脉，告曰：此脾伏火邪，溼

熱下流非寒也。法當升陽散火以逐其溼熱。乃煮升麻澤瀉柴胡羌活等劑而繼以神芎丸。郭曰：子苦久泄，今復利之，恐非治也。項曰：公之六脉浮濡而弱，且微數。濡者溼也，數者脾有伏火也。病由溼熱而且加之以熱劑，非苦寒逐之不可。法曰：通因通用。吾有所試矣。頃之利如木屑者三四出，卽去礬及炭，病旋已。

黃子厚治一富翁，病泄瀉彌年，禮致子厚診療，浹旬不效。子厚曰：子未得其說，求歸。一日讀易至乾卦天行健，朱子有曰：天之氣運行不息，故閣得地在中間。如人弄碗珠，只運動不住，故在空中不墜。少有息，則墜矣。因悟向者富翁之

病乃氣不能舉爲下脫也。又作字持水滴吸水。初以大指按滴上竅。則水滿筒。放之。則水下溜無餘。乃豁然悟曰。吾能治翁症矣。卽往。至則爲治。灸百會穴。腎脉末三四壯而泄瀉止矣。妙法

虞恒德治一人泄瀉。日夜無度。諸藥不效。偶得一方。用針沙地龍。猪苓三味。共爲細末。生葱搗汁調方。七貼臍上。小便長而瀉止。

一人吐瀉三日。垂死。爲灸天樞。胃氣海二穴立止。

石山治一人於幼時誤服毒藥。泄痢後復傷食。腹痛大泄不止。今雖能飲食。不作肌膚。每至六七月遇服毒之時。痛泄

復作善飢多食胸膈似冷夜間發熱嗜臥懶語聞淫慾言盜汗陽舉心動驚悸喉中有痰小便不利大便或結或澹過食則嘔吐瀉泄脉皆濡弱而緩右脉畧大尤覺弱次白左脉三五不調或一二至緩三五至駛右脉如舊緩弱左脉不調者此必淫欲動其精也右脉尤弱者由於毒藥損其脾也理宜固腎養脾遂以人參錢半白朮茯苓藥黃芪麥冬各一錢歸身澤瀉各八分黃栢知母山查各七分煎服旬餘而安

博按此案舊刻微悞

一人年五十餘形色蒼白五月間與人爭辨冒雨勞役受飢且有內事夜半忽病發熱惡食上吐下瀉昏悶煩躁頭身

俱痛

此症頭身俱痛症之不可恃也如是夫

因自發汗汗遂不止遣書云脉

皆洪數汪曰脉果洪數乃危症矣蓋吐瀉內虛汗多表虛

兼之脉不爲汗衰亦不爲瀉減在法不治但古人云治而

不活者有矣未有不治而活者令用人參五錢以救裏黃

芪五錢以救表白朮三錢乾薑七分甘草五分以和中安

胃白茯苓一錢陳皮七分以清神理氣用理中湯水煎不時溫

服一酒杯看其病勢如何服至六七貼則見紅斑吐瀉之後見斑

而四肢尤甚面赤身及四肢脹悶告急於汪汪曰斑症自

吐瀉者多吉謂邪從上下出也但傷寒發斑胃熱所致今

此發斑由胃虛而無根失守之火遊行於外也可補而不

可瀉可溫而不可涼妙斷宜詳味之若用化斑湯升麻元參之類

則死生反掌矣。仍令守前方。服十餘貼。諸症悉減。斑則成瘡。肢腫亦消而愈。博按此案舊刻脫悞

一孩孟秋泄瀉。晝夜十數度。醫用五苓散。香薷飲。胃苓湯。加肉蔻。罔效。汪曰。此兒形色嬌嫩。外邪易入。且精神倦怠。明是胃氣不足。而爲暑熱所中。胃虛挾暑。安能分別水穀。今專治暑而不補胃。則胃愈虛。邪亦著而不出。經曰。壯者氣行則愈。怯者著而成病是也。令濃煎人參湯飲之。初服三四匙。精神稍回。再服半盞。泄瀉稍減。由是繼服數次。乳進而病愈。

虞雍公并甫紹興間。自渠州守召至行在。憇北郭外接待院。因道中冒暑得泄痢連月。重九夢至一處。類神仙居。一人