

醫統正脈全書

三四



類證活人書卷十四

無求子著

嘔吐噦門

吐症主方

半夏

三錢

陳皮

一錢五分

茯苓

厚朴

薑汁炒

廣藿香

各一錢

甘草

三分

生薑

三分

水煎不拘時服

二陳加薑和中治吐順氣消痰所必用厚朴溫中下

氣而兼消水穀藿香辛溫辛能散寒溫能治吐外

感寒邪兼有寒痰宿食者以表散為主加防風二錢

蘇葉羌活各一錢五分去茯苓服蘇合丸 內傷生

冷飲食外兼寒邪者以溫消理氣為主加麥芽二錢

神曲一錢五分蘇防各一錢去茯苓服木香荳蔻丸

蘇合丸

見中寒門寒中太陰條

木香豆蔻丸

脾胃久弱中氣虛寒則寒痰冷飲壅滯

胸中以致否結不舒快快欲嘔及吞酸倒飽噯腐不

思飲食者宜之

白蔻仁

三兩另末

良薑

各八錢

丁香

官桂

丁香

木香

檀香

藿香

三稜

蓬朮

三柰 各五錢

甘草 炙黃四兩

陳皮

山查

香附 薑製各兩五錢

甘松 三錢

自良薑至甘松共為細末另以豆蔻

末為母水疊九午前午後薑湯吞服二三錢

嘔症主方

半夏 三錢

茯苓

橘紅 各二錢五分

廣藿香 一錢

厚朴

枳實 各五分

甘草 二分

生薑 三片

水煎不拘時服

二陳加薑治嘔之聖藥藿朴溫中下氣枳實破滯消食如兼寒熱往來脉見浮弦而滑者熱症也加柴胡

一錢五分炒黃芩一錢乾葛一錢去藿香無食並去
朴實有則仍用 如無寒熱脉弦滑者痰症也加炒
白朮一錢補脾胃之營氣以去痰之本增枳實五分
以行痰之標而去藿朴服橘半枳朮丸 如食積疑
痰作酸而嘔脉見弦滑而數者加山查三錢神曲一
錢五分薑製黃連一錢消食清火去藿朴不用服芩
連橘半枳朮丸或和中順氣丸 六脉沉濡軟滑素
多濕痰鬱氣者加炒白朮一錢五分炒蒼朮一錢去
枳實 六脉沉微細滑本于胃氣虛弱中寒作嘔者



加炒白朮二錢人參一錢炒砂仁五分減半夏之半

去藿朴枳實服香砂健脾丸

橘半枳朮丸

見痰飲門
五飲條

苓連橘半枳朮丸

見鬱門
痰鬱條

和中順氣丸

見內傷門
食物內傷條

香砂健脾丸

蓋脾之本性喜溫惡寒喜燥惡濕喜香

惡臭喜通惡滯若或虛寒不能營運濕痰食積稽留

則致飲食不思而難進雖進而難消於是嘔惡吞酸

倒飽噯腐腸鳴泄瀉浮黃腫脹諸症悉起是藥甘溫

香燥從其性而啓發營氣脾胃易於容納使脾速于
運化凡男婦小兒中氣不和三腕否悶不舒肢體消
瘦無力者皆宜常服

白朮

炒黃
四兩

陳皮

香附

薑製各
二兩

陳黃米

炒二
合

神曲

炒

麥芽粉

各
兩

木香

砂仁

炒各
五錢

荷葉湯疊丸空心白滾湯吞服二三錢

噦症主方

半夏

二錢

茯苓

橘紅

各一錢
五分

黃連

薑炒

枳實

各一錢

甘草

二分

生薑

三片

水煎不拘時服

胃中痰氣火併結爲病以二陳豁痰利氣枳實破結
滯黃連清鬱火服香連枳朮丸 若陽明邪熱不清
身熱煩渴脉有力者加柴胡一錢炒黑山梔竹茹各
一錢

胃虛氣弱脉必無力加炒白朮一錢人參五分減黃
連五分去枳實不用 若陰虛火盛冲逆而噦脈必
微弱虛數無力加人參二錢炒白芍一錢五分竹茹
一錢減黃連五分去枳實不用 服香連丸

香連枳朮丸 或濕熱之氣鬱于胃腑陽明熱毒久服



不清以致否滿嘈雜吞酸吐酸惡心嘔吐

白朮

四兩

枳實

麸炒二兩

廣橘紅

半夏

麥芽粉

神曲

各一兩

陳黃米

各二兩

木香

五錢

川連

薑炒五錢

荷葉湯疊丸食前空心百滾湯吞服二錢

香連丸 傷寒餘熱及痢後虛火鬱滯胃中不清而乾

噦者宜之

川黃連

五兩

吳茱萸

去枝二兩五錢

木香

另爲細末聽用一兩二錢

先將黃連茱萸二味用水同煮至汁乾去茱萸用連切
片炒至紫黃色爲細末約有淨末四兩加木香末一

兩以少醋入濃米飲和丸如桐子大每服二三十丸

薑橘淡烏梅湯吞服虛用人參湯下

胃虛惡心惡食主方

白朮

三錢

人參

茯苓

各二錢五分

陳皮

半夏

各一錢

黃耆

炒

藿香

白蔻仁

砂仁

各五分

炙甘草

三分

生薑

煨焦一片

水煎早晚空心服

脾胃受病氣必鬱滯滯則否滿雖欲補益元氣必假

芳香之藥醒發胃氣使之進食前方甘溫健脾芳香

開胃不惟從其性而且益其氣也脾不能消胃不能

納而惡心否滿者服香砂健脾丸不思飲食及見食惡心者服胃愛丸心脾營氣不足精血不充無病而

病者服冲和資生丸

香砂健脾丸

見本門嘔條

胃愛丸

見氣門脾胃營氣條

冲和資生丸

見氣門脾胃營氣條



番胃門

番胃脉症 胃有三腕近咽者爲上腕近小腸者爲下腕中爲中腕得食卽吐者病在上腕此胃家自虛自病而不納隨氣逆火炎而吐吐出之物猶未變也停久而吐病在中腕乃脾虛不能營運腎虛不能腐熟隨氣逆火炎而吐吐出之物將腐而未熟者也朝食暮吐病在下腕係小腸不能受盛隨氣逆火炎而吐吐出之物已腐熟而變化者也初起之脉兩關滑數有神至數清爽者可治若六脉沉濇而細數或弦



急而空大至數短促無和緩之象形神雖好亦非壽
相此正所謂無胃者死

番胃治法 得食卽吐胃不能納兼之氣逆火炎所致
當以調養開胃爲主順氣清火兼之 停久而吐當
佐脾運導消化水穀爲主而順氣清火兼之 朝食
暮吐者病屬小腸宜順氣降火墜下之藥主治初起
雖由脾肺腎三經元氣虧損失其升降上下之節而
致必先有痰氣火結滯于腸胃阻塞氣道而成故先
宜開鬱順氣清火消痰治其標久則兼補兼清遠則



調和氣血滋潤腸胃若辛香燥烈之劑暫圖開胃暗耗血液者始終忌之

番胃主方

山查肉

三錢

貝母

二錢

橘紅

一錢五分

白朮

蜜水炒黃

白芍

酒炒各一錢

人參

黃連

酒炒紫黃色

枳實

麩炒各五分

水煎黎明空心徐徐逐口呷下不宜驟進使其嘔

惡

番胃之初必由氣虛氣鬱火鬱生痰三者併結於腕中而成故以參朮益氣使脾肺復其營運施布之本

海人書
卷一四
七
查肉踈肝開鬱消積清胃佐枳實以順氣連芍清肝
胃之火橘貝消三腕之痰是爲和中清利之劑 初
病飲食仍進或吐或不吐元氣未大虧者前方加枳
實五分黃連五分川石斛一錢五分量減參朮 如
元氣久虛加人參一錢白朮川石斛各一錢五分量
減黃連枳實 曰遠氣血兩虛大便秘結加人參二
錢枸杞牛膝各一錢五分去黃連枳實之寒燥減山
查之半 精神元氣虛極腸胃枯塞不通已成上格
下關者用童便浸人參三五錢枸杞二錢牛膝一錢

五分松子泥五錢去查肉枳實如虛寒無火喜煖飲
熱者並去黃連加洗淨焙乾肉蓯蓉三錢

暫服止吐主方

黑鉛

二兩

山查肉

三錢

川貝母

二錢

川石斛

二錢五分

白芍

一錢

川黃連

五分

水濃煎四五沸入陳年鐵

鏹細末一錢再煎至六七分去渣隔湯頓熱徐徐

而服勿使嘔惡如虛加人參一錢五分 右藥五

種不出順氣清火消痰平胃為主加鉛與鐵者取

金能制木引肝腎之氣下達以殺炎逆之勢

開關散

番胃初起不拘三腕遲速吐逆及噎膈之症以此探吐凝痰積飲使氣道通而能納倉廩空而能容也吐後進食無碍當責之脾腎大小腸以前方量虛實加減佐其腐熟受盛傳導之用耳

升麻

取綠色堅實者酒拌周時俟潤透晒乾炒黑色用八錢

台烏

鹽水拌透炒黃色用八錢

蒼朮

米泔水潤透炙至白烟起碗覆存性用一錢

右藥用水二碗煎一碗膈湯頓熱勿令病者仰卧正枕以洗淨新羊毛筆蘸藥使病人吮之欲吐