



仁和雲洲皇甫中編輯

長洲念山邵從舉校訂  
子繩山邵達參補

○頭痛症一眉殺痛附

〔論〕頭痛先須辨厥真。濕痰風火挾邪侵。氣虛血少兼寒濕。識者尤當審六經。更有眉眶頸作痛。風痰風熱客於核。如太陽頭痛者。惡風寒。脈浮緊。痛在額項兩額角。少陽頭痛者。往來寒熱。脈弦痛連耳根。陽明頭痛者。發熱自汗。脈浮長大。痛連目背頰齒。太陰頭痛者。必有痰體重。或腹痛。脈沈。頭重少陰頭痛者。足寒氣逆。為寒厥。脈沈細。厥陰頭痛者。吐痰沫厥冷。脈浮緩。痛引目系。此六經頭痛多挾外邪也。血虛頭痛者。自魚尾上攻頭痛也。氣虛頭痛者。耳鳴九竅不利。腸胃之所生濕熱頭痛者。心煩重痛。病在膈中。過在手太陽少陰。寒濕頭痛者。氣上而不下。頭痛巔疾。下虛上逆。過在手少陰巨陽。甚則入腎。偏頭痛者。頭半寒痛。先取手少陽陽明。後取足少陽陽明。厥頭痛者。所犯大寒至骨髓。髓以腦為主。腦逆故頭痛。齒亦痛。真頭痛者。痛甚入連于腦。手足寒至節。旦發夕死。夕發旦死也。丹溪云。頭痛多主于痰。甚者火多。有可吐者。有可下者。又若眉眶痛者。屬風熱與痰。有肝虛而痛者。繞見光明。則眶痛甚。有眉稜骨痛者。眼不可開。晝夜劇痛。凡此之類。種種不同。視其所挾。究其所因。定其經絡。參以脈理。而施以補瀉宣通汗利之法。斯無一偏之弊也。

六經痛

太陽。川芎羌活。藁本。麻黃。少陽。小柴胡湯。陽明。升麻葛根湯。加石膏白芷蔥白。太陰。蒼朮半夏南星。川芎蔓荊子。少陰。麻黃附子細辛湯。厥陰。吳茱萸湯。加柴胡。

小柴胡湯 方見瘧疾條下

升麻葛根湯 治陽明經頭痛。○升麻五錢 葛根五錢 白芍藥錢 甘草錢 煎服。

麻黃附子細辛湯 治少陰頭痛。○麻黃二錢 細辛錢 附子錢 水二盞煎溫服。

吳茱萸湯 治厥陰頭痛。或痰涎厥冷。脈浮而緩。○麻黃五錢 羌活五錢 吳茱萸四分 藁本三分 升麻三分 黃芪

分三 黃芩錢 當歸酒洗一錢 黃蘗錢一 川芎錢一 蔓荊子分三 細辛分三 柴胡分三 黃連分三 半夏分三

血虛痛

血虛痛。芎歸湯。或四物加酒。芩羌活柴胡蔓荊子。氣虛痛。四君子湯。氣血兩虛。調中益氣湯。加川芎蔓荊子細辛。巔頂痛。必用藥本柴胡防風。

芎歸湯

治血虛頭痛。一名芎藭湯。○川芎錢三 當歸酒洗三錢。○水二盞。煎八分。食遠熱服。四物湯。方見血症條下。四君子湯。方見脾胃條下。調中益氣湯。方見內傷條下。

風溼寒熱痛

風熱與溼上壅。清膏。風熱甚者。微清膏。瘦人頭痛是火。酒芩為主。加引上藥。風熱上攻頭痛者。防風通聖散。或芩芷散。大寒犯腦。令人頭痛齒亦痛。羌活黑附湯。風熱感者。酒芩天麻川芎防風薄荷。或茶調散。

清室膏

治偏正頭疼。及風溼熱上壅作痛。○細梗子黃芩三兩。一兩。防風一兩。羌活一兩。甘草五錢。末之。每服三錢。湯調膏下。

微清膏

治風熱上攻頭痛。○蔓荊子錢一 細辛錢一 薄荷分三 川芎分三 甘草分三 藥本錢一。末之。茶調下。錢。

防風通聖散

方見中風條下。芎芷散。治風邪入於頭腦作疼痛。○白芷錢一 石菖蒲錢一 陳皮分八 蒼朮錢一 羌活分八 細辛分八 厚朴姜炒七分 半夏湯分七 紫蘇分八 甘草分六 木通分八 肉桂分八 川芎錢一。○右剉一剉。水二鍾。加姜三片。葱白二枚。煎八分。服。

羌活黑附湯

治冬月大寒犯腦。令人頭痛齒亦痛。○麻黃分三 附子分三 羌活分三 黃蘗分三 黑附子分三 羌活分三。末之。每服三錢。湯調膏下。

茶調散

治諸風上攻頭痛。目昏鼻塞。及偏頭疼。○薄荷葉分二 川芎錢一 羌活錢一 甘草錢一 荆芥穗一。末之。每服二錢。食後茶湯調下。

白芷錢

細辛一錢 防風錢一。○右為細末。每服二錢。食後茶湯調下。必痰痛。

痰飲頭痛。二陳湯加蒼朮蔓荊子南星防風。肥人頭痛是溼痰。半夏蒼朮為主。加引經導藥。痰厥頭痛。痰唾稠粘。頭旋眼黑。頭苦痛如裂者。半夏白朮天麻湯。風痰上攻頭痛。白芷芽茶川芎防風南星半夏細辛。或青州白丸子。風痰上感。三生散。

二陳湯 方見痰症條

半夏白朮天麻湯 治眼黑頭旋。頭苦疼痛。吐逆。○白朮錢炒一神曲錢炒一陳皮錢五分。半夏錢五分。麥芽錢五分。白茯苓錢五分。

天麻錢五分。黃芪錢五分。人參錢五分。蒼朮錢五分。澤瀉錢五分。乾姜錢五分。黃蘗錢三分。○右剉一劑。水二鍾。煎至八分。空心熱服。

青州白丸子 治風痰壅盛。癱瘓驚風。嘔痰涎沫。○白附子錢二兩。半夏錢二兩。南星錢二兩。川烏錢二兩。去皮臍半。○右搗為末。以生絹

袋盛之。于井花水中攪出。藥末更以手捏令出。以粗渣再搗。仍入絹袋。搗盡為度。貯磁器中。日曬夜露。每日一換新水。

攪而復澄。春五日。夏三日。秋七日。冬十日。去水晒乾。再研以糯米粉糊丸。如菉豆大。常服二十九。生姜泡湯送下。

三生散 治風上攻頭腦。痰滯不行。以致偏正苦疼。○烏頭錢一。白附子錢二。南星錢二。姜三片。水煎服。

必眉眶痛

肝虛羞明。眉眶痛者。熟地黃丸。風熱感。眉眶痛。選奇羌防散。或苓芷散。風痰攻上。眉棱痛者。導痰湯。寒濕上攻。眉棱

痛者。芎辛散。風痰風熱感。二烏散。

熟地黃丸 治肝血虛少。眉眶疼痛。羞明畏日之症。○生地黃錢一。熟地黃錢一。玄參錢一。金釵石斛錢一。○右末之。蜜丸。梧桐

子大。每服三錢。空心白湯送下。

選奇羌防散 治風熱上壅。肩棱疼痛。不可忍之症。○羌活錢二。防風錢二。甘草錢二。黃芩錢二。酒炒。煎服。

苓芷散 治風熱上感。眉眶疼痛。目不能視物者。○黃芩錢一。白芷錢一。○末之。每服二錢。茶清調下。

導痰湯 方見痰症條

芎辛散 治頭痛因寒濕上攻。或眉棱作痛。並治之。○烏頭錢一。附子錢一。天南星錢一。乾姜錢一。甘草錢一。川芎錢一。酒炒。

細辛錢一。兩。每服四錢。姜棗煎。

二烏散 治風熱。二氣攻於太陽等經。頭腦作痛。○川烏錢一。草烏錢一。細辛錢一。羌活錢一。黃芩錢一。甘草錢一。酒炒。

錢三 ○右末之。每服二錢。食後茶清調下。

○頭風症二

歌頭風素有熱寒。痰。忽冒風寒。腦髓間。何故。女人多病此。為無中憤。禦風寒。

論天頭風。即首風也。孫思邈云。新沐浴竟。取風為首風。經云。首風之狀。頭面多汗。惡寒。當先風一日。則病甚。頭痛不可出內。至其風日。則病稍愈。又云。頭風者。本于風寒入于腦髓也。蓋頭為諸陽之會。其人素有痰火。風寒客之。則熱鬱而悶痛。故婦人多患此者。無中憤以禦風寒故也。但有偏有正耳。丹溪云。頭風屬痰者多。有熱有風有血虛。在左屬風與血虛。在右屬痰與熱。善治者。究此病情。全在活法。出入加減。無不奏效也。

必風與血虛

頭風在左。屬風與血虛。風者。荊芥。薄荷。之類。風熱者。消風散。茶調散。血虛者。芎歸湯。或四物湯。加荊芥。防風。白芷。酒。荊芥。薄荷。蔓荊子。之類。以上諸方俱見頭痛症下

必痰

頭風在右者。屬痰。蒼朮。半夏。之類。濕痰。頭風。用酒。荊芥。三錢。蒼朮。四錢。川芎。細辛。各二錢。甘草。一錢。末之。姜茶。搗勻。調服。或二陳湯。方見痰症加酒。荊芥。薄荷。川芎。細辛。或導痰湯。方見痰症加酒。荊芥。蒼朮。

必火

頭風屬火者。酒。荊芥。為主。或二陳湯。加酒。荊芥。薄荷。川芎。細辛。方見痰症或防風通聖散。方見頭痛症或消風百解散。凡用荊芥。連須用酒炒。以其上行頭角故也。

消風百解散。治半邊頭風。作痛。因火熱上沖之症。○荊芥。錢。白芷。錢。陳皮。八分。麻黃。錢。蒼朮。三錢。米泔水。浸。冬。七日。夏。五日。曬乾。炒。燥。

甘草。八分。右。剉。一。劑。水。二。盞。煎。八。分。食。後。服。

附方。治偏頭疼。至妙之藥。○羌活。一錢。獨活。一錢。川芎。錢。白芷。錢。細辛。一錢。蒼朮。一錢。防風。一錢。黃芩。一錢。酒炒。○右。剉。一。劑。水。二。盞。煎。八。分。食。後。服。

又方。治半邊頭痛。極效。○香白芷。錢。天南星。錢。川烏。八分。半夏。八分。○右。為。末。每。服。一。錢。水。調。服。婦。人。加。甘。草。錢。

○頭眩症三

歌痰火令人頭轉旋氣虛血失每頭眩風寒暑濕乘虛致識得其机可望痊

論眩者目花黑暗旋倒也其狀頭眩目閉身轉耳聾如立舟車之上起則欲倒虛極乘寒得之故風則有汗寒則掣痛暑則懊悶溼則重滯此四氣乘虛而眩暈也或七情鬱而生痰動火隨氣上厥此七情致虛而眩暈也酒色過度腎虛不能納氣歸元使氣逆奔而上氣虛而眩暈也吐血崩漏或產後失血脾虛不能收攝營氣使諸血失道妄行此血虛眩暈也丹溪云頭眩多挾痰氣虛併火及溼痰火痰蓋無痰不能作眩痰因火動也凡此之症要參以脈症治之隨機應變不可以一途而取軌也謹按經曰諸風掉眩皆屬肝木肝木為風所撼必鼓動其肺肺金不能制木風捲痰而上升故目無定視上下反覆甚則嘔吐飲食罕御大法平其風降其痰而已婦人患崩淋頭眩以血虛治為少血不能養肝肝木根虛不能不動搖故眩治崩淋則眩自止所以培其根也

脈風寒暑溼氣鬱生涎下虛上寔皆頭眩暈風浮寒墜溼細暑虛痰則滑弦痰花而濕數火邪虛火久極先理氣痰次隨脈

○外感眩暈

風熱虛眩川芎茶調散方見頭痛症風寒上厥眩暈芎朮除眩散暑火眩暈二陳湯方見頭痛症加人參白朮山梔黃連川芎

溼腎着湯方見腰痛症

芎朮除眩散治風寒上厥眩暈○附子生半兩白朮兩半川芎兩半桂半錢甘草錢半○每服三錢姜三片水二盞煎一服

○虛眩

氣虛眩暈因相火盛治痰為先半夏白朮天麻湯方見頭痛症或用香橘飲氣虛眩暈四君子湯方見脾胃加天麻防風血虛

眩暈芎歸湯方見頭痛症失血眩暈四物湯方見血症加焦姜產後血虛眩暈清魂散方見女科

香橘飲治氣虛眩暈如治血虛者加芎歸肉桂○木香七錢白朮炒一錢半夏曲錢橘皮錢茯苓錢砂仁分七丁香十四粒

甘草分八○右剉一貼生姜三片水二盞煎一盞食遠熱服

○痰火眩暈

溼痰眩暈二陳湯加酒芩白朮南星天麻蒼朮方見頭痛症或青州白丸子方見頭痛症或白朮半夏天麻湯方見頭痛症火動其痰者二

陳湯加黃芩黃連蒼朮羌活方見火盛者酒炒大黃末調下

一方用大黃酒浸九蒸九晒為末水丸如菜豆大每服百丸食後臨卧清茶送下神效。一方用半夏白茯苓川芎甘草羌活白芷枳實南星防風細辛酒黃芩氣虛加參朮血虛加芎歸熱加黃連各等分姜三片水煎服以此作丸每

日下二三錢極效

○心痛症四

歌心痛當分久與新。暴嬰寒氣必須溫。若還稍久多成鬱。積鬱因而作熱蒸。大寔痛時難以按。按之痛定作虛論。虵虫

痛止偏能食。脈澀須知死血因。真痛在心無藥療。厥疼胃脘正當心。

論夫心痛者有真有厥。真者邪中心。手足青至節即死。非藥可療。厥者邪客于心胞絡胃脘之間。當心之分。非真心

受病。故可治也。又有寒厥熱厥之分。大寔大虛之別。古人又有九種之名。曰飲曰食曰風曰冷曰熱曰悸曰蟲曰疰

曰去來痛。若此者皆可究其因而施治也。其如陳無擇云有五臟及諸經諸府心痛。雖言之詳。而無治例。反使後學

有惑于心。故不具載。蓋亦不過寒熱表裏虛寔之候也。丹溪云。心脾痛須分新久。若明知身受寒氣口食寒物。于初

病之時。當以溫散溫利之劑。若使稍久而成鬱。鬱則蒸熱。熱久必生火。若欲行溫劑。寧無助火添病乎。故古方多以

山梔為熱藥嚮導。則邪易伏。病易退。又審平昔喜食熱物。以致死血留於胃脘。或因痰氣食積。鬱滯于胃作痛者。如

此等例。皆前人之所未發。後學當遵而行之。斯活法也。

謹按世人患真心痛者極少。真心痛者。平素有痰。卒然大痛如割。入于無聲。汗出不休。舌強無言。手足厥冷。此疾一

作。死在旦夕。針灸之所不施。藥力之所未及。患之者十無一生。蓋寒邪直中心經。君火不能抗敵故也。今之患心痛

者。乃胃脘與心胞絡耳。若痛極如咬。時吐清水。面青白。少光彩者。為虫頭上攻。痛時如有物阻碍。壅塞不得下。為胃

脘停食。痛時嘈雜不寧。如飢如飽。怏怏欲吐。吐即稍寬。為痰飲停積。痛時隱隱悶結。胸膈相引。得暖覺寬。為憂鬱而

致痛。時欲近煖處。飲熱酒即解。為寒客心胞絡。痛時自上而下。自聞唧唧有聲。按之則消。為火所熾。不可認以為虫

而投以虫劑也。

脈心痛微急。痛甚伏入。陽微陰弦。或短又數。緊寔便難。滑寔痰積。心痛引背。脈微而大。寸沈而遲。關緊抓無措。眠坐不

穩。心下如刮。上連胸臆。乃積血不數錢。

虛痛

虛弱人心痛。錢氏云。心虛痛者。炒鹽補之。以物按之其痛止者。挾虛也。二陳湯加炮姜末和之。方見若久病元氣虛弱。肢體怯薄。脈虛。手欲按者。六君子湯加砂仁香附。方見脾胃

寒痛

因氣怒而飲食。卒痛便閉。心胸高起。手不可按者。大寒痛也。煮黃丸。後服藥本湯去其餘邪。胃脘溼熱痛。小胃丹。方見

症

煮黃丸

治大寒心痛。○雄黃一兩 巴豆五錢去皮細研 入白麴二兩。研勻。水丸。梧子大。每用水下數丸。如得利不可再服。宜

服藥本湯以去餘邪。

藥本湯

治心痛後服。○藥本兩 蒼朮一兩半 作一帖煎服。

熱厥心痛

熱厥心痛者。其人必縱酒蓄熱在胃。偶遇寒鬱而發。故身熱足冷。痛甚則煩躁而吐。額上有汗。脈洪大。當灸大谿。崑崙。表裏俱瀉之內服金鈴子散。痛止。服枳朮丸。方見以去餘邪。初痛以鹽湯探吐。得吐就發散。心脾痛日久。則非寒也。縱有寒亦鬱而為熱。二陳湯加山梔炒黑。川芎香附。痛甚者加炮姜反佐之。方見或以山梔一味入姜汁煎服。大便不通。大承氣大陷胸之類下之。方見

金鈴子散。○金鈴子兩 玄胡索兩 末二錢。溫酒下。

寒厥心痛

寒厥心痛者。手足厥逆。遍身冷汗。甚則手足甲青黑。下便清白不渴。氣微力薄。脈沈細微。未附湯。大寒厥暴痛。非久痛者。若久則非寒也。丹溪云。明知身受寒氣。口食寒物。初病當以溫散溫利之藥。

未附湯

治寒厥。○白朮二錢 甘草一錢 黑附子炮一錢半 草豆蔻丸。大便閉結不通者。元戎厚朴丸。○右三味。剉作一帖。姜

三片。棗二枚。水二鍾煎溫服。

草豆蔻丸 治寒厥心痛。○草豆蔻一分益智仁八分陳皮八分人參八分黃芪八分吳茱萸八分洗去生僵蚕八分當歸六分

青皮六分神麴四分姜黃四分柴胡四分半夏一分澤瀉一分去毛一錢桃仁七錢去皮一錢麥芽一錢甘草三分○右為細末湯浸蒸

餅丸如梧桐子大每服三十丸

元戎厚朴丸 ○厚朴三兩黃連二兩吳茱萸湯泡七次乾姜二兩巴豆一兩研人參一兩川烏一兩○末之入豆霜勻蜜和

丸桐子大每三丸以利為度

痰積食積心痛 痰飲積滯于胃脫當心而痛。墙上陳螺蛳殼煨存性炒蒼朮海石山梔香附南星各二兩枳殼青皮木香半夏砂仁

各半兩糊丸姜湯送下食積保和丸方見

血痛 平昔喜食熱物致死血留於胃口作痛者脈沈而芤澀在上者四物湯加桃仁紅花丹皮枳殼玄胡索方見韭

汁桔梗開之重者桃仁承氣湯下之方見

蟲痛症痛 就虫攻入心膈作痛者痛定便能食面上有白斑唇紅治以苦練錫灰或烏梅丸或集效丸就虫攻噉心痛惡心而

吐川椒湯下烏梅丸症心痛者十症病皆心痛化虫丸方見辣蓼草煎湯飲之

烏梅丸方見上攻痛烏梅五十個細辛一兩附子一兩人參一兩黃柏一兩桂枝一兩乾姜一兩黃連四兩川椒五錢當歸五錢

末之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸爛搗成膏少加蜜和丸如梧桐子大每十九加至二十九食前服

集效丸 治就厥心痛○木香二錢鶴虱二錢乾姜二錢訶子二錢蕪荑二錢附子二錢檳榔二錢大黃一兩半

烏梅肉二兩○末之蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心時陳皮湯送下

化蟲丸方見化蟲水○胡粉五錢鶴虱三錢白礬五錢檳榔五錢苦練根五錢○右為細末糊丸梧桐子大每服五十丸溫漿水入

芝蔴油一二點打勻下之米飲亦可不拘時候其虫小者化為水大者自下

腹痛症五

歌寒痛綿綿無減增時疼時止熱為根血瘀痛處無移動食積便通便見輕寔者不能將手近痛時能按作虛論濕痰痛者澁便秘體認其形見病情

論天寒痛者常痛而無增減也成無已云陰寒為邪則腹痛而吐利熱痛者時作時止原病式云熱鬱于內而腹滿堅結痛勿以為寒死血痛者每痛不移其處成無已云邪氣聚于下焦津液不得通氣血不得行或溺或血惡滯于下是生脹鞭小便不利也食積痛者利後即痛減澀痰痛者凡痛大小便俱不利丹溪云清痰多作腹痛脈滑痰因氣滯而聚凝其道路不得通故也腸癰痛者身甲錯小便如淋腹皮急按之濡如腫狀脈洪數也積聚腹中痛者腹中原有積左右上下當積而痛也寒疝入腹痛者少腹痛引翠丸陰毒痛者四肢厥逆痛甚咽喉不利或心下脹滿結燥虛汗狂言面色俱青陰積于下陽消於上痛者腹堅不可按虛痛者雖痛不脹滿手可按若此霄壤不侔可一約而盡之乎

○謹按腹痛為脾家受病蓋脾或受有形而痛者或受無形而痛者若暴傷飲食則胃脘先痛而後入腹暴觸怒氣則兩脇先痛而後入腹血積上焦脾火薰蒸則痛從腹而上于胸臆血積下部胃氣下行則痛從腹而入于少腹傷于寒者寒必痛得熱則緩傷于飢者飢即痛得食即止吞酸腹痛為痰鬱中焦復傷飲食而黃腹痛為宿食不消蚘虫攻咬氣虛腹痛腹必虛豁呼吸短淺血虛腹痛者痛如芒刺牽引不寧醫者當審其因以處治大要以甘溫為上惟傷酒作痛者方可涼劑而必佐之以甘溫也

脈沈弦細動皆是痛症心痛在寸腹痛在關下部在尺脈象顯然

熱痛

胸中有熱胃中有邪腹痛欲嘔黃連湯腹痛脈洪熱也黃芩芍藥湯寒邪變熱傳裏腹痛便秘而厥四逆散腹滿時

痛桂枝加大黃湯腹痛便秘脈寔大者大承氣湯

傷食方見

黃連湯治熱邪腹痛○黃連三錢甘草三錢乾姜三錢桂枝三錢人參二錢半夏二錢○每服七錢棗煎服

黃芩芍藥湯○黃芩二錢芍藥二錢甘草一錢○煎服

四逆散治陽邪傳裏腹痛○甘草一錢枳殼一錢芍藥一錢柴胡一兩○末之每服二錢白湯調下

桂枝加大黃湯治太陰脹滿時痛○桂枝三錢芍藥三錢甘草二錢大黃二錢○姜棗煎入飴一合微煖服

必寒痛

傷寒下利腹痛。四逆湯。方見中寒腹痛厥冷欲死者。霹靂散。腹痛下利。四肢沈重。真武湯。或理中湯。方見中寒

霹靂散 治中寒腹痛。○附子一枚入真臘茶一大盞。同研勻。更分二劑。水二鍾煎八分。入熟白蜜一匙。涼服。

真武湯 治少陰腹痛。○茯苓五分芍藥五分生薑一片附子一枚。○水二大盞煎至一盞。冷服。

必痰痛食積痛

清痰多作腹痛。台芎蒼朮木香白芷香附末之。姜湯調服。肥人腹痛。乃氣虛溼痰也。二朮半夏陳皮芍藥之類。飲食

過傷腹痛。保和丸。木香檳榔丸。方見傷食虛人飲食傷腹時痛。六君子湯加麴藥。方見脾胃

必虛痛

素弱人全不思食。腹冷痛。養胃湯加肉桂茱萸木香。或小建中湯。方見脾胃或理中湯。方見中寒腹痛欲以手按。按之痛止

者。屬虛。參朮姜桂之類。血虛腹痛。須用白芍之酸補以和之。或四物湯加焦炒乾姜炒芍藥倍用。方見血症

必寔痛

凡痛脹滿者。不可按。太寔也。大承氣湯。方見傷食初得腹痛。元氣未虛。宜推蕩之。此通因通用。痛隨利減也。桂枝加大黃

湯。方見前熱或木香檳榔丸。方見傷食

必血痛

因跌撲瘀血腹痛。脈芤。桃仁承氣湯加蘇木紅花。方見血症女人經閉。血積滯。腹中痛。玉燭散。方見大承氣湯合四物湯二

或失笑散。方見七科或通經散。

通經散 活血定痛。○陳皮兩甘遂兩當歸尾五錢川芎兩紅花酒洗桃仁去皮尖。○右剉。每服七錢。水二鍾。酒一

鍾煎至八分。空心服。

必積聚痛 腹中上下左右有積聚。當積而痛。三聖膏。或木香檳榔丸。保和丸。方見傷食丁香脾積丸。食積痞塊作痛。河魏丸。

三聖膏 未化石灰半斤。為細末。瓦器中炒。令淡紅色。提出火。候熱稍減。次下大黃末一兩。微炒。又提出候溫。下桂心

末半兩。略炒。入陳米醋熬攪。成黑膏。厚紙攤貼患處。其痛自減。塊漸消矣。

丁香脾積丸。○丁香半兩。木香半兩。巴豆去心膜。良姜醋煎。蓬莪朮三棱。而皂莢三條去皮。子青皮一兩。○末之。入百草霜三

錢。糊丸。麻子大。每服十丸。空心時白沸湯下。

阿魏丸。治肉積腹痛。○連翹半兩。山查一兩。阿魏一兩。黃連六錢。末之。用阿魏醋煮作糊。丸如梧桐子大。每服五六十九。

清晨白滾湯送下。

### 腸癰痛

腸癰痛者。腹大痛。身甲錯。小便加淋。脈孔。或攢脇有瘡。積冷。以附子溫之。積熱。以大黃下之。膿大出。以參芪補之。

### 陰毒痛

陰毒厥逆腹痛。陰寒欲絕。脈沈。爪申。手指唇面青黑者。回陽丹。或真武湯。方見前。寒腹痛急。關元氣海。各五七十壯。

回陽丹。治陰毒厥冷腹痛。○牡蠣燒。良姜炒。一。不灰木錢。一。川烏錢。一。白芍錢。一。芍藥錢。一。射香錢。一。末之。每用一錢。男用女

津調塗外腎。女用男津調塗兩乳。

### 痧症痛

忽然腹中大痛。嘔吐脈沈。痧症也。正氣散加香附砂仁。方見前。手足厥冷。舉體轉筋。理中湯。方見前。寒少腹引。舉九痛。疝氣

入腹中痛。脈沈弦。補腎湯。餘詳疝症本條。

補腎湯。治疝氣入腹痛。○人參錢。白茯苓錢。黃芪錢。附子炮。白朮錢。一。沈香錢。二。木瓜錢。二。羌活錢。八。川芎

分。紫蘇分。甘草分。○右剉一劑。姜三片。棗二枚。水二盞。煎八分。空心服。

### 脇痛症六

脇肋肋疼時統屬肝。或虛或寔或因痰。脈沈氣鬱。須開導。孔澀原來死血干。食積一條常梗起。肝虛痛在脇梢間。若然

痛甚肝經火乾。脇之疼痛最難。

論足厥陰之絡。令人脇痛。皆肝胆經之所主也。丹溪云。木氣寔。肝火盛。死血痰飲。氣滯食積。溼熱。皆入人脇痛。亦有肝

虛血少而痛者。有因酒色勞損太過。脇下一點痛不止。名乾脇痛。甚危。當大補氣血。尚難為也。若此虛寔之不同也。

必以脈症參之。斯得其受感之情。而用藥無差忒也。

○謹按左脇痛者。肝經受邪也。右脇痛者。肝邪入肺也。左右脇俱痛者。肝火盛而木氣寔也。兩脇走注痛而有聲者。痰飲也。左脇下有塊作痛不移者。死血也。右脇下有塊作痛飽悶者。食積也。咳嗽氣急發熱者。痰結痛也。久而不治。則成肺癰。勞傷身熱脇痛者。脈必虛也。宜詳究之。

脈兩脇疼痛。脈必双弦。緊細弦者。多怒氣偏。沈澀而急。痰瘀之征。

肝火盛

脇痛甚者。肝火太旺也。當歸龍薈丸。輕者小柴胡湯加黃連龍胆草白芍藥醋炒青皮。方見火盛者。宜伐火。左金丸。當歸龍薈丸。○膽草一兩當歸一兩山梔子一兩炒黃連一兩黃芩一兩黃蘗一兩炒大黃一兩蘆薈一兩木香一錢射香一錢為丸。淡姜湯下。

左金丸 治肝火太盛。○黃連六兩吳茱萸湯泡末之為丸。白湯下。

木氣寔

脇痛脈弦數。木氣寔也。醋炒青皮蒼朮川芎當歸白芍柴胡。或用小柴胡湯加醋炒青皮川芎胆草。方見或抑青丸。抑青丸。治肝火○黃連不拘多少。姜汁炒為丸。每百丸。白湯下。

死血痛

脇痛日輕夜重。或午後發熱。脈花而澀。瘀血也。四物湯加柴胡青皮桃仁紅花。行氣藥中加破血藥。

食積痛

脇下一條扛起作痛者。食積也。保和丸。方見或吳茱萸炒黃連神曲麥芽山查蓬朮青皮。或當歸龍薈丸。方見前肝

濕熱

濕熱盛而兩脇痛者。先以琥珀膏貼痛處。後以生姜湯吞當歸龍薈丸。方見或小柴胡湯加蒼朮青皮黃連。方見痰積

痰積

痰積脇下作痛。控涎丹。或十棗湯。或二陳湯加南星蒼朮川芎柴胡白芥子炒山梔仁醋炒青皮。方見痰

控涎丹 治兩脇痰痛。乾遂錢一大戟錢一製白芥子半斤炒各錢一右末丸如梧子大每五七丸漸加至十丸姜湯下。

氣滯

氣滯脇下作痛。推氣散。或復元通氣散。控涎丹。方見前痰積治一身氣痛。氣鬱者詳醫症條內。  
推氣散 治右脇疼痛。枳殼錢五桂心錢五片子姜黃錢五甘草錢五之每服二錢姜棗湯調下。  
復元通氣散。木香兩半茴香兩半青皮兩半穿山甲大七陳皮兩半白芷兩半甘草兩半每服五錢水二鍾煎八分空心服。或作末每服二錢空心酒調下。

虛痛

肝血不足。悠悠痛不止者。四物湯加柴胡稍。方見血症若脇下一點痛不止。此因酒色太過所致。名乾脇痛難治。肥白人脇痛。參芪入小柴胡湯。方見虛症

枳芎散 治左脇痛。枳實錢五川芎錢五粉草錢一右為細末。每服二錢姜棗湯。或酒調下。

木香調氣散 治氣怒傷于肝。兩脇大痛難忍。丁香兩二檀香兩二白豆蔻仁兩二藿香葉兩二甘草兩一砂仁兩三右末之。每服二錢入鹽少許沸湯調服。

腰痛症七

腰痛多由腎氣虛。衝風鬱熱總因之。天陰痛作知歸濕。寒濕痰時見熱陰。閃挫板疼難使仰。日輕夜重血多瘀。或因腎着并勞役。水積仍兼氣不舒。

論夫腰者腎之府。身之大關節也。血氣不行。風寒暑濕之氣相干。則沈痛不能轉側。然老人腎虛多腰痛。亦有寒濕者。挫閃者。氣滯者。瘀血者。腎着者。衝風蓄熱者。水積者。勞傷者。之不同也。

脈腰痛之脈。必沈而弦。沈微氣滯。弦損腎元。或浮而緊。風寒所纏。濕傷濡細。寔挫閃然。濕必瘀血。滑痰火煎。或引背痛。沈滑易痊。

腎虛腰痛

腰痛悠悠不已。腎虛也。青娥丸。或摩腰膏。獨活寄生湯。丹溪補陰丸。安腎丸。立安丸。選而用之。

青娥丸 治腎虛腰痛。○杜仲姜炒一片破故紙炒半斤胡桃肉二十斤○末之大蒜四兩搗為膏。和丸如梧桐子大。每三十九。空心溫酒送下。或用酒糊為丸。

摩腰膏 治腰痛虛寒症。○附子火二錢烏頭二錢天南星二錢硃砂一錢乾姜一錢雄黃一錢樟腦一錢丁香一錢射香一錢末之姜汁調烘熱摩腰上。

獨活寄生湯 ○獨活錢桑寄生錢杜仲鹽水炒去細辛半錢牛膝去秦艽去白茯苓去桂心六分川芎八分防風八分

白芍藥酒炒八分甘草炙七分人參二錢當歸酒洗半錢熟地黃酒洗二錢○右剉一劑。水二鍾煎至八分。空心熱服。

丹溪補陰丸 ○黃藥酒炒四兩龜版酥炙四兩知母酒炒四兩熟地黃酒洗六兩○右末之。蜜為丸。如梧桐子大。空心淡鹽湯下。

安腎丸 治腎虛腰痛。○茴香炒三兩川練子炒三兩破故紙炒三兩續斷三兩胡蘆巴三兩桃仁二兩杏仁二兩乾山藥二兩白茯苓二兩○末之。蜜丸。桐子大。鹽湯下。

立安丸 補腎止腰疼。○牛膝去杜仲鹽炒四兩破故紙炒四兩黃柏二兩大茴香二兩○末之。蜜丸。淡鹽湯送下。

腎着腰痛 腎着者。腰冷重痛。如帶五千錢者。其飲食如故是也。宜流其濕熱。腎着湯。不已。服牛膝酒最妙。

三因腎着湯 ○白茯苓四兩白朮四兩乾姜二兩甘草二兩○每剉四錢。水二盞。空心煎服。

牛膝酒 治腎着腰痛。○地骨皮兩五加皮薏苡仁兩川芎兩甘草兩生地黃兩海桐皮兩川牛膝兩羌活兩右剉一大劑。浸酒。日飲三次。

寒濕腰痛 寒濕腰痛者。遇陰寒即作。或久雨陰濕所得。晴暖即減。五積散加吳茱萸杜仲。方見中寒

濕熱腰痛 濕熱腰痛。板疼不能俯仰。小便赤。大便泄。或走注痛。二妙丸。或健步丸。

二妙丸 治濕熱腰痛。○川黃柏酒炒四兩蒼朮米泔浸四兩○末之。酒調下。或為丸。白湯送下。二三錢。

濕熱腰痛 濕熱腰痛。板疼不能俯仰。小便赤。大便泄。或走注痛。二妙丸。或健步丸。

二妙丸 治濕熱腰痛。○川黃柏酒炒四兩蒼朮米泔浸四兩○末之。酒調下。或為丸。白湯送下。二三錢。

二妙丸 治濕熱腰痛。○川黃柏酒炒四兩蒼朮米泔浸四兩○末之。酒調下。或為丸。白湯送下。二三錢。

二妙丸 治濕熱腰痛。○川黃柏酒炒四兩蒼朮米泔浸四兩○末之。酒調下。或為丸。白湯送下。二三錢。

健步丸 治濕熱腰痛。○羌活半兩 柴胡半兩 滑石半兩 甘草炙半兩 瓜蒌根半兩 防風去芦三錢 澤瀉去毛三錢 防己酒洗一兩 川烏三錢

苦參酒洗五錢 肉桂錢一 末之。酒糊丸如桐子大。每七十九煎。愈風湯吞下。

○閃挫腰痛

閃挫腰痛者。板疼。復元通氣散。方見 或五積散。加牽牛頭末。桃仁。方見 或濟生菴蘭丸。

濟生菴蘭丸。○菴蘭子半兩 沒藥五錢 乳香二錢 補骨脂五錢 藏靈仙半兩 杜仲半兩 當歸酒洗 末之。酒糊丸如梧子大。每七十九。空心淡鹽湯下。

○勞役腰痛

腰痛由勞役而得者。獨活寄生湯。方見 瘀血腰痛。四物湯加桃仁紅花蘇木。方見

○風熱腰痛

因風腰痛者。小續命湯。方見 或獨活寄生湯。方見 風濕腰痛。牛膝酒。方見

○氣滯腰痛

氣滯腰痛。木香調氣散。見脇痛症下 因鬱怒憂思。氣不舒而痛。枳殼湯。或小七香丸。

枳殼湯 順氣鮮薑止痛。○枳殼五兩 甘草二兩 末之。葱白湯下。

小七香丸 氣滿腰痛。○丁香二錢 香附兩 甘草兩 蓬義木二錢 砂仁二錢 甘松八錢 益智仁六錢 末之。蒸餅糊丸。如菜豆大。每二三十丸米飲下。

○症症八

寒水瀰血氣。狐筋。先哲空留七疝名。蓋是肝經原有熱。外邊却被淫寒侵。或因死血并痰飲。鬱在囊中氣不行。控引畢丸生腫痛。或如瓜瓠。或蛙聲。要將標本分寒熱。感受仍評重與輕。勿指膀胱心腎氣。當知正屬厥陰經。

論古有七疝之名。不按七疝而治。概用局方辛熱燥劑。是泥標而忘本也。或指為小腸氣。腎與膀胱氣。皆非也。殊不知厥陰之脈。循陰器。然其地位皆肝經所主。與小腸膀胱腎子無相干。至戴人始辨之詳也。丹溪云。疝痛甚者。畢丸連少腹急痛也。或有形。或無形。或有聲。或無聲。自素問以下。皆以為寒。蓋經絡得寒則收引不行。所以作痛。世有得寒

而無症者內無熱也。予屢踏水徒涉。不曾病此。以予素無熱故也。若醉飽勞役。房室大怒。發動五志之火。鬱久濕氣便感。濁液凝聚。并入血隧。流于厥陰肝經。木性急速。火性又暴。為寒所束。宜其痛甚而暴也。此濕熱被寒鬱而痛。明矣。若只作寒治。恐為未備。又云。痰飲食積。死血鬱結為病。及因水氣為腫。腫多為濕。癰亦有挾虛者。其脈沈緊而豁。大當以參朮為君。佐以疏導。若概行決裂之法。禍不旋踵。此前人所未及。學者引而伸之。今將七疝形狀。開具于後。

寒疝

經云。足厥陰肝經筋中寒。以寒則筋攣卵縮。此寒鬱于外也。原病式云。癰疝少腹脰卵。腫急絞痛。寒主拘縮。寒極則土化制之。或腫滿。則知其為寒者。是外受寒邪也。而內寔非寒。丹溪所謂標寒本熱明矣。寒疝手足逆冷。不仁。疝脹痛及身痛。烏頭桂枝湯。寒疝入腹痛。少腹引辜丸痛。泄利胸滿。補腎湯。或腎虛寒疝偏大者。茱萸內消丸。

烏頭桂枝湯。烏頭五分白蜜一斤煎減半去滓。○每用桂枝湯五錢入蜜半兩水煎。每服二合。得吐為中病。桂枝湯方見寒症

補腎湯。治寒疝入腹痛。○人參一兩白茯苓一兩黃芪一兩附子一兩白朮一兩沈香四錢木瓜五錢羌活半兩甘草二錢

錢二錢紫蘇錢三。○右剉每服五錢。姜三片。棗二枚。水二盞。煎八分服。

茱萸內消丸。○山茱萸六兩吳茱萸四兩馬蘭花四兩陳皮四兩肉桂四兩乾山藥六兩川練子四兩青皮四兩茴香四兩木香四兩

右末之。酒丸。溫酒送下。

木腎

心火下降。則腎水不患其不溫。真陽下行。則腎氣不患其不和。溫而且和。安有所謂木強者哉。蓋腎本不可純用燥藥。當行溫和散利。以逐其邪。則邪自消。榮衛流轉。則愈。枸杞子丸。又方用楮樹葉雄者。暴乾為細末。酒糊丸。如梧

桐子大。每服五十丸。空心鹽酒吞下。楮樹不結子者。雄也。

枸杞子丸。○枸杞子四兩南星二兩半夏二兩黃柏四兩蒼朮三兩山查三兩白芷二兩神曲二兩滑石三兩昆布四兩吳茱萸四兩

末之。酒糊丸。如梧桐子大。每七十丸。空心鹽湯下。

食積濕痰死血