

卯 14
743

第四卷

治各種痧症癰癧中寒中暑等症
急救解毒附

第五卷

治外科各症並跌打損傷

醫方易簡新編

症疫癘中寒中暑等症急救解毒附

黑痧

陰陽絞腸痧

烏痧脹

痧症垂危尿屎已出

中暑

中寒

中風試生死

又方

纏腰痧

痧脹諸忌

一切傷暑

暑月渴死

伏暑發熱

太陽中暯

黃疸痧

陽黃痧症

陰黃痧症

傷寒表邪黃疸痧

膽黃疸痧

穀疸

黃汗

黃痘

勞疸

脾瘍黃疸

血症黃腫

食瘀黃病

黃病

熟黃便結

婦疾黃疽

內熱黃疸

黑疸尿赤

腹脹黃腫

裏水黃疸

傷寒瘟疫

食茶葉面黃

黃疸變黑

黑疸危症

卒暴諸病

陽毒發狂

癰病頭痛

時氣欲死

天行時疫

時氣煩悶

天行發斑

避疫癆法

天行熱病

邪惡不染

時行熱毒

蝦蟆瘧

大頭瘧

黃胖病

瘧疫傷寒時症

狂走傷寒瘧症

霧露瘴氣

預辟瘴癟

山嵐瘴氣

辟瘧丹

除瘧救苦丹

痧症起生丸

痧疫瘴癟苦提丸

烏痧脹又方

陰陽痧症

痧脹

弔筋弔腳痧

避弔痧預服可免

絞腸痧痛難忍

呂祖治疫方

大頭蝦蟆瘧

辟禳瘧疫

除疫救苦丹

辟瘧燒丹

又方

辟疫傳染

時行不染

時疫大行

入病家不染疫

解瘧丹

六合定中丸

痧脹第一方

白痧藥秘方

頭目痧脹點藥

又痧藥方

中暑不省

暑風入臟

解暑

消暑止渴

中暑

盛夏熱症

熟死

絞腸痧心腹痛

冬月中暑

絞腸痧刺法

霍亂吐瀉轉筋

霍亂吐瀉垂危

暑月脹滿欲作霍亂

霍亂轉筋

霍亂吐瀉

轉筋垂危

乾霍亂又方

霍亂神效方

反筋腹瀉

絞腸霍亂

斑痧

風寒痧症

陰暑

瘡疾仙方

斷瘡第一良方

止瘡方

斷瘡神方

一兩金

熱瘡不寒

瘡疾渴甚

老瘡勞瘧

瘡疾不止

三陰瘡

中風尸厥

治瘡奇方

八珍湯

口眼歪斜方

中風不省人事

中風口喎

中風口噤

急中風口閉涎壅

中風失音

中風仆地

七味無價仙方

省風湯

導痰湯

癇症

癇病神方

風痰癇病

子兒瘋

傷寒諸症

發散傷寒

傷寒結胸停食

傷寒狂走陰症傷寒

時疫傷寒狂瘲

喉管傷寒

吐法

吐除痰積

發汗方

罨傷寒結胸法

薑熨法

傷寒

感冒

神白散

天中藥茶

解毒辟瘟丹

菩提萬應丸

寸金丹

太乙紫金錠

救苦丹

疫病初起

天行時氣

時行瘟疫瘴氣

休薦飲

寒熱怪症

瘡後怪症

散瘧

陰毒傷寒

傷寒壞疽

一切傷寒

瘧疾不已

天行發斑

灰色傷暑

傷寒夾食

傷寒初起

傷寒妙方

傷寒漏底

灰色傷寒

夾食傷寒

傷寒發狂

傷寒發黃

風寒溼痛

急救解毒附

救縊死法

又方

官桂湯方

通關散方

救溺死法

又方

又方

又法

又方

又方

又方

又方

又方

又方

救夜臥斃死

救卒中邪斃

救烟火薰死

救服砒毒

救中水銀毒

救蠱毒及金蠱毒

又方

救誤吞鐵釘

又方

救誤吞銅器

又方

救中巴豆毒

救誤服一切草

毒笑草毒

磨菰諸草藥

閉口椒毒

斷腸草毒

救誤吞竹木及芒刺

救鐵針入喉

救誤吞金銀

又方

救誤吞鐵骨等物

救誤服木鱉子

救中雄黃毒

救誤服木鱉子

救誤服木鱉子

救誤服木鱉子

救誤服木鱉子

救誤服木鱉子

救中諸藥毒

救中飲食毒

救中六畜肉毒

救中野草靈芝毒

救中各肉自死毒

救中各肉自死毒

救中各肉自死毒

救中各肉自死毒

救中牛馬肉毒

救中六畜肉毒

救中野草靈芝毒

救中各肉自死毒

救中各肉自死毒

救中各肉自死毒

救中各肉自死毒

救中各肉自死毒

救中鱠魚毒

救中魚鱉毒

救中圍魚毒

救中諸魚毒

救中仙鶴血毒

救誤食馬蝗

救食鷄蛋悶絕

救中蟹毒

救中蠍毒

救中諸藥毒

救中魚鱉毒

救中圍魚毒

救中諸魚毒

救中仙鶴血毒

救食鷄蛋悶絕

救食鳴蛋不消

救服斑蝥毒

救自服諸毒

救中酒毒

救中燒酒醉死

又方

救中生鴉片毒

救中白菓毒

劣馬咬傷方

獨狗咬傷

壁鏡毒人方

蜈蚣咬毒

蝎刺蟄人

活蠶入腹

蜈蚣銅釵

諸物刺喉

雜物入肉

解中百毒

解中蠶毒

中蠶吐血

中蠶下血

中百藥毒

中丹藥毒

中諸藥毒

誤中瓜毒

中野菌毒

中柑毒

中梨毒

中馬肉毒

中馬肝毒

中狗肉毒

中豬肉毒

中鴨肉毒

解砒石毒

誤食桐油

中飛絲毒

中邪氣

惡症腹痛

生漆惹人

戶疰中惡

暗風猝倒

水溺猝死

墮水凍死

中挑生毒

飲酒醉死

燒酒醉死

解硫磺毒

解煤炭毒

解食沙蟲水毒

解瘡癟毒

解百蟲毒
過食雞蛋停滯

鐵針入肉

治虎咬傷

狼虎熊傷

諸蛇咬傷

拔蛇牙方

毒蛇咬傷

蛇入人口

獸蛇咬傷

鼠咬

多腳蟲傷

壁虎咬

蜞蜘蛛叮

從高墮死

銃子傷肉

蛇入七孔

蛇纏人足

人口咬傷

射工傷人

蠅蠍傷人

野芋頭毒

治中水毒

十種丹毒

蜈蚣咬又方

蚯蚓咬傷

烏黃蜂咬

飲蠶水毒

解諸爪毒

山嵐瘴氣

誤吞水蛭

即蠅蠍
誤吞田螺

泡哥魚毒

烟管傷喉

蠅入咽喉

毒狗咬

救湯火

狗咬傷

蛇入人口

誤吞螞蝗生子

蚯蚓毒

蜘蛛毒

誤食碗絲

卷之三
通鑑卷之三
通鑑卷之三

通鑑卷之三

治各種痧症疫

黑痧

大凡痧症各有不同而脉之細軟沉遲與虛損脉象相同庸醫不察痧脈誤認爲氣血兩虧大用補劑無不垂死殊堪痛憫特別痧症瘟疫時氣一門以示誤認爲虛損者之一助云爾

凡立時昏倒微覺肚痛面色黑脹不呼不叫過兩三時不救又曰滿痧急用蕎麥培乾研碎去皮爲末溫酒調服三錢重者再服自愈忌茶

陰陽絞腸痧

凡腹痛手足冷身有紅點名曰陰絞腸痧以燈草蘸油點火淬其紅點用明礬末三錢開水調服

凡腸腹俱痛手足俱暖名曰陽絞腸痧宜針刺其手指爪甲一分半處出血亦服明礬取吐卽愈切不可進穀食若吃粥與米湯卽死難救矣

湯卽死難救矣

烏痧脹

眞麻油一鍾溫服取吐卽安

痧症垂危尿

頂髮數十根白礬研二錢陰陽水一碗調服取吐

屎已出

芋艿二個搗爛放病人口內咽下卽醒醒後再喫數片又將鹽

置刀頭燒紅淬入水中乘熱灌下死者亦活或用生芋艿二

搗爛灌下置病人於地以熱尿澆肚臍眼亦可

中暑

凡盛暑之時忽然昏暈跌倒氣欲絕者名曰中暑急取道路熱土一塊大蔴四五個剝淨衣皮共搗爛以新汲井水和勻去渣

灌之即愈

或用皂莢一兩燒存性甘草一錢

研微炒爲末溫水調一錢灌之

凡感冒寒邪頭疼身痛強硬拘急惡寒嘔吐或腹痛及傷寒發熱頭疼惡風無論內傷生冷胸膈脹滿外感風寒濕氣行於經絡腰腳酸痛及婦人難產經水不調氣壅不通等症均治

白芷

七分川芎七分

薑製仙半夏七分官桂心七分

白茯苓八分

分桔梗

八分當歸三錢

白芍紹酒炒一錢五分

枳壳

五分川厚朴

薑汁

製三分

五分乾薑八分

陳皮炒六分

麻黃三分甘草清炙五分

茅山蒼术

米泔水炒

二錢

葱白頭三個

生薑三片

清水煎熟服之如調經前方加陳蘄

艾一錢

醋炒

中風試生死

凡昏倒不語不省人事牙關緊閉湯水不入者

生天南星一錢

生半夏

一錢北細辛研極細

猪牙皂一錢好麝香一分

共研極

又方

繩腰痧

細末以此藥用少許吹入鼻中。有嚏者可治。無嚏者不治。

凡中風痰厥昏迷卒倒。不省人事。氣欲絕者。用巴荳殼紙包搗。

油出盡去荳。用紙作撲。或加牙皂末燃燒薰入鼻內。卽醒可治。

凡一時昏倒。腹痛眩暈。腰間如有繩纏急者。以真麻油一盞灌下。得吐卽愈。

痧脹諸忌

凡痧脹忌食薑茶烟酒及熱粥。用藥忌甘草紫蘇半夏。總以提利極透爲要用。香草嫩頭七個。食鹽少許。沖湯涼服。氣通自愈。如寒

痧宜服
薑湯

切傷暑

凡暑月貪涼臥濕。或生冷不節。真邪相犯。以致吐利。或發熱頭疼。體痛。或心腹痛。或轉筋。或乾嘔。或四肢逆冷。或煩悶欲死。均可

治之。

用香薷一斤。

厚朴薑汁製半斤。

白扁豆微炒半斤剉

散體虛者。每日服

一錢。體實者。每日服

四

錢。用水二盞紹

酒半杯。煎至半盞。以前散藥入碗中。調和俟水冷。連進二服立

效。

暑月暎死

凡中暎猝死者。急取地漿水一升飲之。甚妙。或以熟土圍臍傍

令人尿臍中仍用熱土一大塊 大蒜五個搗爛去滓熱水

調灌卽活當以熱湯徐徐灌之少舉其頭令湯入腹卽醒

伏暑發熱

凡作渴嘔惡及赤白痢消渴腸風酒毒泄瀉諸病 黃連一斤切片以好紹酒二升半煮乾焙研糊丸如梧子大每服三錢熟水調下每日三服

太陽中暯

凡身熱頭痛而脉微細弱極此夏月傷冷水水行皮中所致 爪蒂七個水一升煮至五合頓服取吐卽愈

黃疸痧

黃疸痧一證古人多言爲濕熱及有五疸之分者曰黃疸曰穀疸曰酒疸曰勞疸曰黃汗皆未足以盡之而不知黃之大要有四曰陽黃曰陰黃曰表邪發黃曰膽黃此四黃症人往往忽之其害匪淺惟景岳論之甚詳 余特將各種疸症羅致之明辨之對症服藥自無不治

陽黃症

凡因濕多成熟熱則生黃此卽所謂濕熱證也然其証身熱煩渴或躁擾不寧或消穀善飢或小水熱痛赤澁或大便秘結其脈必洪滑有力此証不拘表裏或風濕外感或酒食內傷皆能致

之但察其元氣尙強脾胃無損而濕熱果盛者宜清火邪利小便濕熱去而黃自退

凡積熱閉結小水不利或致腰腹下部極痛或濕熱下利黃疸溺

血邪熱蓄血腹痛淋閉等証宜用大分清飲

茯苓

二錢澤瀉

三錢木通二錢猪苓一錢梔子一錢枳壳一錢車前子一錢

水

一鍾半煎八分食遠溫服

如內熱甚者加黃芩黃柏龍膽草

之屬

一味只須加

如大便堅硬脹滿者加大黃

二錢

如小水不

利熟甚者加茵陳

二三錢

如邪熱蓄血腹痛者加紅花

五錢

青皮

一分錢

凡挾熱泄瀉熱痢口渴喜冷小水不利濕熱閉澁症

茵陳

三錢

焦梔子

三錢

澤瀉

三錢

青皮

三錢

甘草

一錢

甘菊花

二錢水

三

鍾煎兩鍾

不時陸續飲之治熱瀉者一二服可愈

凡陰黃症多由內傷不足不可以黃爲意專用清利此症宜調補心脾腎之虛以培血氣血氣充足則黃必盡退人參

無力用一錢如

心脾腎之虛以培血氣血氣充足則黃必盡退人參

無力用

一錢

茯苓

二錢

炙甘草

一錢

加黑棗

七個

煨生

潞黨參

七

白朮

二錢

茯苓

二錢

水

一錢

加黑棗

七個

煨生

薑三片水煎服。若元氣虛不至甚而兼多寒濕者，茵陳五苓散方加減用之亦可。

傷寒表邪黃疸

凡表邪未清而濕熱又甚者，其証必表裏兼見，身面悉黃者，俱是用茵陳蒿末一錢，焦梔子三錢，澤瀉三錢，青皮三錢，甘草一錢。

甘菊花二錢，白茯苓二錢，水煎溫服。

若內熱甚而表邪仍在者，前方加柴胡五分。

白朮一錢，猪苓一錢，山楂一錢，煨荔枝核七個。

去甘菊花水煎溫服。若但有濕熱內實脹閉等症，而外無表邪者，及穀疸發熱不食，大小便閉，或食卽頭痛，宜用茵陳。

九錢大黃四錢，山梔五分，分作二服，水二鍾煎八分，食遠溫服。

若因內傷勞倦，致染傷寒者，亦多有發黃之症，但察其本無濕熱實邪等症，卽當以治陰黃疸之法調補治之。若祇知攻邪，則未有不敗。故孫真人曰：黃膽脈浮者，當以汗解之。方用桂枝加炙黃芪湯煎服，此卽補虛散邪之法也。

凡膽黃疸，皆因傷膽而然。膽既受傷，則臟氣之損敗可知。使非修緝培補，則必至決裂。故凡遇此等証，務宜大用甘溫，速救元氣。