

活動心法大全卷之三

明清江聶尚恒父可父著

清肝黎黃光會畏巖父校

痘出齊後起發灌膿數日內調治法

報痘三日後痘已出齊身體溫和精神清爽顆粒尖圓
潤澤根腳紅活胃背稀疎飲食如常二便不澀此順候
也不必服藥但節飲食避風寒防穢氣而已

痘出齊後三日內其時日十分緊要其形色症候最宜
精察蓋好痘全要膿漿濃滿其次亦要六七分膿漿方

可保無虞。痘一出。齊形色顯然。其膿之成與不成。足與不足。皆可逆觀矣。除以上順候。自然膿足。不必服藥外。其有不順者。後必無膿。或膿少而清。急於此三日內。觀形察色。分別寒熱虛實。用藥調治。以爲灌膿計。猶可及也。失此不治。多有緩不及事。而竟不成膿者矣。痘之生死。判於膿之有無。有膿則毒從外散。故生。無膿則毒留內攻。故死。是以膿濃滿而痂厚者。上也。膿未滿而痂薄者。次也。其下者。偏身俱水疱。然水疱七八分。而間有二三分膿疱者。猶可生也。其最下者。密不成顆。串爲一片。

而其皮下有膿漿。又或疔密而潰。膿水渴漬。猶可望生也。惟乾枯無膿漿。或薄漿不滿二三分者。必癢塌而死。無生意矣。是以出齊而調治。灌膿如拯溺。救焚不可緩也。

氣血流暢。則毒化爲膿。膿之不成。其病有二。毒氣熾盛。則血燥而凝。故不能運化而成膿。元氣虛弱。則血寒而縮。亦不能運化而成膿。故痘色紅紫乾枯。或帶焦黑者。毒熾而陰凝者也。必不成膿。急宜清毒活血湯。痘色淡白。疱不尖圓。根無紅暈者。氣虛而血縮者也。必

不成膿。急宜用參歸鹿茸湯。或于金內托散。

清毒活血湯

治紫陷一二劑其痘立轉。灌膿時六七日不大便亦此方起脹時同。

紫草茸

當歸

俱酒洗。

前胡

牛旁

木通

各六分

生地

黃

生白芍

俱酒洗。

連翹

桔梗

各五分

酒炒

苓連

各七分

甘草

四分

山查肉

八分

人參

三分

生黃芪

八分

生薑

一片同煎。煩渴者去參。芪加麥門冬。酒炒。花粉。各八分。

參歸鹿茸湯

治白陷。灰陷。痘不光。留疱。虛漿。清行膿。二三日尚不克滿。皆可服。以托痘。

鹿茸

酒塗炙去毛。勿用酥炙。恐其羶也。三錢。

嫩綿黃芪

蜜炙。一錢五分。當歸身

酒洗。一錢五分。炙甘草。六分。人參。一錢。生薑。一片。好龍眼肉。

三箇同煎去渣入好酒一盃溫服。兒有能飲酒者

濃煎藥汁與酒相半和服亦好。虛弱未甚者服此

一二劑其痘卽轉紅活行漿。因倦于足冷飲食少

者加木香分三丁香官桂各五寒戰咬牙者再加官桂

三製附子分八泄瀉者去當歸加麵炒白朮酒炒白芍

白茯苓各八木香丁香各三另用參朮散止瀉方見後

托膿之劑莫妙於此方以鹿茸補血力峻與草木諸

補藥不同。然恐鹿茸未必得故又錄千金方備用。

千金內托散。舊方有枳椇治自陷灰陷等與鹿茸湯

人參一錢當歸身 蜜炙黃芪各一錢 酒炒白芍

大川芎各六分 官桂 炙甘草 山查肉各五分 南木香

防風 白芷 炒厚朴各三分 生薑一片 龍眼肉三箇

同煎入好酒和服。隨症加減法同上。有用人乳

和藥服者。雖於灌膿有理。但人乳性涼脾胃弱而大

便滑者忌之。泄者尤忌之。

出齊後。當治不治。則漿不行。而五陷之症作矣。五陷者

白陷灰陷紫陷黑陷血陷也。

痘稠密紅紫而頂陷者。紫陷也。甚則轉而為黑陷也。此

毒熱熾盛蔽其氣凝其血而陷也。仍用前清毒活血湯治之。其隨症加減法亦如之。然當其紫陷時。不過一二劑而痘立起。其效如神。及至黑陷。則受毒已深。雖用此方救治而不活者。十嘗八九矣。

痘雖稠密。其色淡白。根無紅暈而頂陷者。白陷也。甚則轉而爲灰陷也。此血氣虛寒。不能運化毒氣以成漿。故陷也。宜用前參歸鹿茸湯。或千金內托散治之。其隨症加減法亦如之。

又有一種痘瘡。頭粒通紅。成血疱而不成漿者。此氣虛

不能統血而血溢妄居氣位也。詳見前論氣血條。宜用

參芪湯大補其氣。

參芪湯

人參

蜜炙黃芪

各五錢

炙甘草

一錢

官桂

五分

生薑

一片同煎。溫服。服此。血即轉白而成漿。

血。血。失。治。則。氣。愈。虛。而。為。血。陷。然。治。之。亦。不。外。此。方。血。

陷。與。紫。陷。相。類。但。血。陷。雖。紅。然。淡。而。不。紫。也。紫。陷。屬。熱。

氣。粗。身。熱。血。陷。屬。虛。氣。少。身。涼。不。可。不。辨。

身熱身涼
虛實顯然

何。西。丘。論。五。陷。說。一。脈。不。明。管。櫟。論。之。尤。外。錯。可。惡。

痘出齊二三日後毒熱化為膿漿漸漸克滿起頂光滑

人。不。美。精。神。清。爽。房。作。

明潤身體溫和飲食能進小便清利大便二三日一次

此順候也不必服藥但節飲食護風寒避穢氣而已

犯五陷者治已見前其或雖不陷頂而痘不光潤或痘

虛而漿不過三四分或雖有漿而清薄或行膿至二三

日尚不克滿此皆難以收靨宜用參歸鹿茸湯催足其

漿無根窠不能灌漿漿不足不能結靨此時看漿為主

膿漿不滿鷄冠血酒亦可用用三五年以上大雄鷄先

將好酒一盃頓溫次刺鷄冠血滴入和勻仍頓溫服之

服後或燥痛一時無妨其鷄不可殺

又有一種出痘稠密毒火既盛然元氣虛血氣弱津液
枯竭不能制火以致虛火炎蒸或煩或渴或咽喉痛或
鼻時出血難任溫補痘必不能成漿結痂大凡年長之
男女嗜慾久開血氣既耗者多有此症最爲難治時醫
見其多熱候率用清涼如犀角地黃湯之類不知原因
血氣不能勝毒氣而致有此症今又純用寒涼則血氣
愈虧損而毒氣愈肆行豈復有可生之理是以此等痘
症時醫治之十無一生殊可哀憐今特製參麥清補湯

以補之

參麥清補湯

與後清肺湯不同此兼補耳

人參

八分

麥門冬

去心酒蒸晒
干一錢二分

白花粉

酒蒸晒干

生黃芪

各一錢 前胡

牛蒡

各五分炒

炙甘草

生甘草

各三分

酒炒

白芍

生白芍

各四分

當歸

酒洗八分

紅花

酒洗三分

大川芎

生地黃

酒洗各三分

桔梗

三分

山查肉

五分

生薑

一片龍

眼三箇同煎溫服遇此症者此藥當頻頻服

痘出五六日內至七八日若膿漿不行亦當用前參歸

鹿茸湯托之

黃芪生用不必加減

若膿漿不起則無生意矣若有

四五分膿。猶可望生。

起發灌膿時有吐泄者。症各不同。

吐有二端。吐而酸苦有聲。吐訖反快者。毒火上騰也。梔

連二陳湯止之。
此痘色必紅紫

梔連二陳湯

薑汁炒黃連 薑汁炒梔子 各五分 白茯苓 八分 製半

夏 四分 去白陳皮 炙甘草 各二分 生薑一片同煎。緩

緩服。吐止卽勿服。
茯苓恐燥陽明也

吐而有物無聲。不酸不苦。吐訖困倦。不思飲食者。胃氣

損也。參砂和胃。士之方見前。此痘色必淡。

泄有二端。泄而糞黃臭穢。小便赤澀者。毒氣奔越也。痘色必紅紫。加味四苓散主之。泄而糞青白滑利者。虛寒也。痘色必淡白。參朮散主之。如虛滑不止。兼用七味豆蔻丸。

加味四苓散

此方治熱泄下。二方治虛寒泄瀉如神。

朱苓

木通

各八分

澤瀉

赤茯苓

各七分

車前子

略炒

黃連

黃芩

俱干炒

牛旁

製兌前各五分

燈心

團同煎

食前服。

參朮散

止瀉良方專治虛寒。

日本用裏白無油者。去麴刮去皮炒。一兩人參 白茯苓去皮砂仁

炙甘草去皮薏苡仁炒熟家蓮子去心真神麴炒

山查肉錢各五肉豆蔻麵裹煨熟。去麵切細。柯子肉去

核。廣陳皮洗淨。去肋膜南木香三錢以上共為極細

末。每用二錢。清米飲調。食前溫服。兒有不肯服者。人

稀粥內和服亦可。

七味豆蔻丸 米引浸透研爛和粥食之為妙

肉豆蔻 柯子製俱砂仁 南木香 白龍骨煨各

赤石脂煨枯白礬各七錢麵糊為丸。如棗豆大。每用酒

米飲下三十丸或二十丸量兒大小與之兒有不能
吞丸者將丸研碎入粥內服之亦可

此等丸散治痘之家必須豫製以防虛滑泄瀉若痘起
脹或收結時驟然泄瀉不止危在旦夕矣然止瀉用湯
藥多不效有服至異功散而不止者惟此丸散可以止
之惟毒熱作瀉者加味四苓散一二服即可止起脹
灌膿時或有六七日不大便而寒悶作痛者毒盛而秘
也。用前清毒活血湯去參朮加懷牛牛旁力滑腸夕二錢紫草當歸
各加至二錢煎藥熟去渣入生蜜半酒盃服之如又不

通用前藥加酒炒大黃三錢微利之若仍不通用猪膽
汁滴入穀道中卽通終不可用硝黃大下恐下後變他
症則危矣

身涼而汗不止者歸芪湯主之

歸芪湯

當歸身五錢蜜炒黃芪三錢蜜炒酸棗仁蜜炒水煎服

有痰用白附子熟地磨服切不可用二陳湯恐燥陽明
孤陽無陰不能施化也至收靨時用之無妨

活幼心法大全卷之三

終