

薛氏醫書
三

明醫雜著卷之五

鄞人王節齋集

後學薛 已註

卜兼三校

臍風

小兒初生百日内臍風方書率用南星僵蠶等風藥多不効當作胎毒瀉陽明火邪馬牙亦是胎毒用針挑破桑樹白汁塗之桑汁主小兒驚口及口瘡舌上瘡神効初生小兒時時與看頻傳桑汁不

然舌硬緊漸至撮口難治

愚按曾世顯云嬰兒一七之內腹肚脹硬臍畔浮腫口撮不開攢眉而叫名臍風或因剪臍帶少短或因束縛不緊牽動風入臍中或因鐵器斷臍冷器入內傳於脾絡致舌強唇青手足微搐不能吮乳啼聲似鴉喉痰潮響急搥破口泡去其毒水以艾灸臍中亦有復生者治法多端無如灸法或以天南星一錢生姜自然汁調灌爲妙。

變蒸

小兒不時變蒸變者異常也蒸者發熱也所以變
換五臟蒸養六腑須待變蒸多遍氣血方榮骨脉
始長

愚按錢仲陽先生云小兒在母腹中乃生骨氣
五臟六腑成而未全自生之後卽長骨脉五臟
六腑之神智自內而長自下而上故生後三十
二日一變蒸始卽智意異前蓋人有三百六十
五骨除手足中四十五碎骨外有三百二十數

自生下骨一日十段而上之十日百段三十二
日計三百二十段爲一變亦曰一蒸骨之餘氣
一自腦分入齦中作三十二齒則齒數當與變
日相合然而齒有不及三十二數者由變不足
其常也有或二十八日卽止長二十八齒以下
倣此但不過三十二之數凡一週遍乃生虛熱
諸病如是十周則小蒸畢也計三百二十日生
骨氣乃全而未壯也故初三十二日一變生腎
生志六十四日再變生膀胱其竅耳與眦冷腎

與膀胱俱生腎水水數一故先變主之九十

日三變生心喜一百二十八日四變生小腸其

發目而微驚心爲火火數二一百六十日五

變生肝哭一百九十二日六變生膽其發目不

開而赤肝主木木數三二百二十四日七變生

肺聲二百五十六日八變生大腸其發膚熱而

汗或不汗肺者金金數四二百八十八日九變

生脾智三百二十日十變生胃其發不食腹痛

而吐乳此後乃齒生能言知喜怒故云始全也

太倉云氣入四肢長碎骨於十變後六十四日

長其經脈手足受血故能持物能立能行也經

云變凡蒸謂蒸畢而足一歲之日也師曰不汗

而熱者發其汗大吐者微止不可餘治全嬰方

云者長氣血變者上氣蒸者發熱也輕則

體熱虛馬耳冷微汗唇生白泡三日可愈重者

寒熱脈乳腹疼啼叫不能乳食食而卽吐呢五

日方愈其後與傷寒相似但以唇上白泡驗之

亦有受胎氣壯實不熱不驚或無證候而暗變

者竊謂

此症小兒所不能免不必服藥古方以

黑散

索丸子主之非惟臟腑不能勝受抑且

反傷氣

血慎之慎之嘗見一小兒至二變發熱

有痰或

治以抱龍丸一粒卒至不救可以驗矣

然父母

愛子之心勝稍有疾病急於求醫而醫

者不究

病情率爾投劑殊不知病因多端見症

相類難

以卒辨况古人稟厚方多峻厲之劑緩

服可也

潮熱

小兒潮熱或壯熱不退多是變蒸及五臟相勝不
必用藥又多是飲食停積鬱熱由中發外見於肌
表只理其中清陽明之熱而表熱自除不可認作
外感輕易發汗用小柴胡輕利等藥重傷其內又
潮熱不退恐是出痘亦當審察勿使用藥

愚按

症若因飲食停積或腹痛吐瀉或肚腹

膨脹宜

用保和丸以消導健脾胃若飲食既消或

腹痛不

食或肚腹膨脹宜用四君子以保養胃

氣若因

誤行汗下損傷元氣宜用參耆歸朮陳

皮甘草以補中氣大凡傷食脾胃必損宜固胃
氣庶無變症若寅卯辰時熱者屬肝經也巳午
未時熱者屬心經也申酉戌時熱者屬肺經也
亥子丑時熱者屬腎經也當詳其虛實而治之
凡屬虛熱實熱投以攻補之劑其病既不增減
乃是病根深固而藥力未能及耳須宜多服功
力既至諸病悉退切不可改爲別治設或藥不
對症禍在反掌慎之○李閣老子患潮熱飲食
如故自申酉時甚至子丑時方止遍身似疥大

便秘結小便赤澁熱渴飲冷余以爲脾胃實熱
傳於肺與大腸先用清涼飲四劑結熱始退又
用四物湯加柴胡黃連數劑其瘡漸愈彼欲速
効另用槐角丸之類諸症益甚遂求於施院長
亦用四物湯加柴胡黃連加桃仁赤芍藥至百

劑而愈

施院長名鑑
字銀臺弟

大小便白

小兒大小便時時審看小便如米泔或澄停少頃
變作泔濁此脾胃濕熱也若大便泔白色或如魚

凍或帶紅或色黃黑此積滯濕熱也宜理脾消滯
清中宮去濕熱節飲食若忽然變青此是變蒸也
不必用藥若久不愈用補脾制肝藥一二服亦不
宜多用

愚按小便如泔或大便泔白宜用肥兒丸若積
滯黃黑宜用四君子加黃連木香若色青日久
不復或兼泄瀉或兼腹痛當用六君子加木香
芍藥若肌體色黃小便不利髮黃脫落鼻下瘡
痍嗜土少食大便青褐色者須用梔子茯苓湯

詳見治疳
要藥下

小兒病多屬肝脾二經

小兒病大率屬脾土肝木二經肝只是有餘有餘
之病似重急而爲治却易見効亦速脾只是不足
不足之病似輕緩而爲治却難見効亦遲二經爲
病惟脾居多用藥最要分別若肝木自旺則爲急
驚目直視或動搖手足搐搦風痰上壅等症此爲
有餘宜伐木瀉肝降火清心若脾胃虛而肝木來
侮亦見驚搐動搖諸症但其勢微緩名曰慢驚宜

補養脾胃不可錯認將脾經誤作肝經治也

愚按急驚乃風火之症脾土受制肝經實熱者
用瀉青丸徑伐其肝或導赤散以瀉其子肝經
虛熱者用六味地黃丸以滋腎水補中益氣湯
以養脾土則風木自息脾土自安矣若因乳食
不調脾胃虧損本來侮土似慢驚而見抽搐搖
頭劓目咬牙等症宜用六君子加釣藤鈎若脾
胃虧損寒水反來侮土成慢驚而見前症用前
藥加姜桂如未應更加附子多有復甦者○舉

人杜克宏子發熱抽搐口噤痰湧此肝膽經實
火之症卽急驚風也先用瀉青丸一服又用六
味丸二服諸症頓退乃以小柴胡湯加芎歸山
梔釣藤釣而安却用補中益氣湯而愈

急驚

急驚是有餘之症屬肝木心火陽邪太旺宜直瀉
之降火下痰是也五藏俱有陰陽如肝氣爲陽爲
火肝血爲陰爲水肝氣旺則肝之血衰矣火妄動
則水被煎沸不寧矣陽旺陰消風火相搏陰血走

散勢所必至也故亦宜養血急驚雖屬肝心然木
火旺則肺金受虧不能平木木來剋土斯損矣故
亦宜養脾况治驚諸藥大率祛風化痰瀉火峻厲
及腦麝辛散之味易於消陰血損脾胃者故治有
餘急驚之症先須降火下痰一二服後加養血安
神之藥若飲食少大便澀或吐瀉則當兼補脾胃
若脾胃原虛當於直瀉藥中加補脾藥若屢作屢
服利驚驅逐之藥便宜認作脾虛血散治驚藥內
加養血補脾藥不可用溫熱丁香等藥恐助胃火

宜參朮芍藥等以補脾中氣血麥門冬黃連以清
金制木

愚按前症若肝經風熱抽搐目瞶筋急痰盛等
症用四物湯以生肝血釣藤鈎以清肝火更用
四君子以補脾土若肝經血燥發熱驚搐眼瞶
痰盛筋攣用六味丸以滋腎水生肝血用四君
子加芍藥以補脾土生肺金若肺金剋肝木用
六君子以實脾土芍藥木香以平肺金若屢服
利驚之劑而脾胃虛寒者須用六君子以補脾