

圖集

古方補陣

卷五十三

景岳全書古方八陣卷之五十三

圖集

會稽

張介賓

會卿著

會稽

曾

超

謙庵訂

補陣

四君子湯一

治脾胃虛弱飲食少思或大便不實體瘦面黃

或胸膈虛痞吞酸痰嗽或脾胃虛弱善患瘧痢等證

人參

白朮

茯苓

各二錢

炙甘草一錢

加薑棗水煎服或加粳米百粒

加味四君湯二

治痔漏下血面色痿黃怔忡耳鳴腳軟氣弱

及一切脾胃氣虛口淡食不知味又治氣虛不能攝血以致
下血不禁

人參

白朮炒

茯苓

炙甘草

黃芪炙

白扁豆炒

右水煎服或爲末每服三錢滾湯調服

生附四君湯三

方在小兒四三

治脾胃虛寒吐瀉

五味異功散四

治脾胃虛寒飲食少思嘔吐或久患軟嗽

浮氣逆腹滿等證

人參

白朮炒

茯苓

炙甘草

陳皮各一錢

此卽四君子湯加陳皮也

右加薑棗水煎服

六君子湯五

治脾胃虛弱飲食少思或久患瘧痢或食飲難

化或嘔吐吞酸或欬嗽喘促若虛火等證須加炮薑其功尤

速

卽前四君子湯加陳皮半夏各一錢五分

加味六君湯六

治一切脾胃虛弱泄瀉及傷寒病後米穀不

化腸中虛滑發渴微痛久不瘥者及治小兒脾疳瀉痢

人參

白朮

黃芪

山藥

甘草

白茯苓

各一兩

砂仁

厚朴

肉豆蔻

麩裹煨各七錢

右每服一兩用水煎服或爲細末用米湯調服二錢不拘時

香砂六君子湯 七

治過服涼藥以致食少作嘔或中氣虛滯

惡心脹滿等證

人參

白朮

茯苓

半夏

陳皮

各一錢

砂仁

炒

藿香

各八分

炙甘草

六分

右薑水煎服

局方四物湯

八

治血虛營弱一切血病當以此為主

熟地黃

當歸

各三錢

川芎

一錢

芍藥

二錢

水二鍾煎服

薛氏加味四物湯

九

即前方加山梔柴胡丹皮

正傳加味四物湯

十

治血熱陰虛諸痿四肢軟弱不能舉動

當歸

一錢

五味子

九粒

熟地

三錢

麥冬

黃柏

蒼朮

各一錢

白芍藥

川芎

各七分

人參

黃連

各五分

杜仲

七分半

牛膝

足不更者不用

知母

各三分

水二鍾煎一鍾空心溫服酒糊丸服亦可

東垣加減四物湯

十一

方在寒陣九九

治腸風下血

保命柴胡四物湯

十二

治日久虛勞微有寒熱脉滑而數者

當歸

熟地

芍藥

川芎

各錢半

柴胡

八分

人參

黃芩

半夏

甘草

各三錢

加生薑三片水煎服

萬氏柴胡四物湯 十三

方在痘疹一四三

治疹後餘熱

奇效四物湯 十四

方在婦人百十一

治肝經虛熱血崩

增損四物湯 十五

方在婦人百十

治脾虛不攝去血不止

元戎四物湯 十六

方在攻陣二六

治血虛臟結

良加減四物湯 十七

方在婦人百十二

治婦人血積

四物二連湯 十八

方在婦人百十三

治婦人陰虛內熱

局方八珍湯 十九

治氣血兩虛調和陰陽

即前四君子四物湯相合也○本方加黃柏知母即名補陰
八珍湯方見外科三二

十全大補湯 二十

治氣血俱虛惡寒發熱自汗盜汗肢體困

倦眩暈驚悸瞢熱作渴遺精白濁二便見血小便短少便血

閉結喘欬下墜等證

即前八珍湯加黃芪肉桂各一錢

人參養榮湯

二

治脾肺俱虛惡寒發熱肢體瘦倦食少

作瀉口乾心悸自汗等證

人參

黃芪

當歸

白朮

炙甘草

桂心

陳皮

各一錢

熟地

五味

茯苓

各七分

白芍

錢半

遠志

五分

加薑棗水煎服

金匱

小建中湯

二

治虛勞裏急腹痛失精四肢痠疼手足煩

熱咽乾口燥等證

炙甘草

桂枝

生薑

各三兩

大棗

十二枚

芍藥

六兩

膠飴

一升

右六味以水七升煮取三升去查內膠飴更上微火消解溫服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故也

按此卽桂枝湯加膠飴也今方俱改兩爲錢而以阿膠代膠飴殊失本方之妙矣

金

建中湯

二三

治胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒氣上

衝上下疼痛不可觸近

人參 二兩

蜀椒 二合炒
去汗

乾薑 四兩

膠飴

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一升微火煎取
升半分二次溫服如一炊頃可食溫粥覆之

局方

十四味大建中湯 二四

治陽虛氣血不足腰腳筋骨疼痛

及榮衛失調積勞虛損形體羸瘠短氣嗜卧漸成勞瘵者

人參 大者一兩

茯苓

甘草

川芎

當歸

白芍

熟地

黃芪

肉桂

附子

炮

麥冬

半夏

肉苁蓉

酒浸各等分

右咀每服五錢水二鍾薑三片棗二枚煎入分空心溫服

八味大建中湯 二五

治中氣不足手足厥冷小腹攣急或腰

滿不食陰縮多汗腹中寒痛唇乾精出寒熱煩冤四體痠痛
及無根失守之火出於肌表而為疹為斑厥逆嘔吐等證

人參

甘草

炙各一錢

黃芪

炙

當歸

芍藥

酒炒

桂心

各二錢

半夏

附子

製各二錢半

右咀每服五錢水二鍾薑三片棗二枚煎七分食前服

人參建中湯

二六

治虛勞自汗

即前小建中湯加入人參二兩煎法同

黃芪建中湯 二七

治諸虛羸瘠百病

即前小建中湯加黃芪一兩五錢煎法同

當歸建中湯 二八

治婦人血虛自汗

即前小建中湯加當歸二兩煎法同

三味建中湯 二九

治表虛自汗

芍藥 二錢

甘草 一錢

官桂 五分

薑三片棗一枚水煎服

東垣補中益氣湯 三一

治勞倦傷脾中氣不足清陽不升外感

不解體倦食少寒熱瘧痢氣虛不能攝血等證

人參

黃芪

白朮

甘草

炙各錢半

當歸

陳皮

升麻

柴胡

各三分

右加薑棗水煎空心午前服

東垣調中益氣湯

三二

治濕熱所傷體重煩悶口失滋味或嘔

嗽稠粘寒熱不調體倦少食等證

黃芪

一錢

人參

炙甘草

蒼朮

各五分

橘紅

木香

柴胡

升麻

各二分

水煎空心服○一方有白芍三分五味十五粒

歸脾湯

三三

治思慮傷脾不能攝血致血妄行或健忘怔忡

驚悸盜汗嗜卧少食或大便不調心脾疼痛癰痢鬱結或因
病用藥失宜剋伐傷脾以致變證者最宜用之

人參

黃芪

白朮

茯苓

棗仁

各二錢

遠志

當歸

各一錢

木香

炙甘草

各五分

水二鍾加圓眼肉七枚煎七分食遠服

愚意此湯之用木香特因鬱結疼痛者設如無痛鬱等證
須除去木香以避香燥豈不於氣虛血動者為尤善乎至
志味辛氣升而散凡多汗而躁熱者亦宜酌用

加味歸脾湯 三四

治脾經血虛發熱等證

卽前方加柴胡山梔各一錢

人參湯

三五

治吐血咯血後宜服并治吐血不止

人參

一兩爲細末

五更時用雞蛋清調如稀糊每用二錢茶匙抄服服訖却

參盡則效○愚意此方固佳其或有惡腥者但以真牛乳

調頓熟或溫飲之凡無火及微火者豈不更妙○一方治吐

衄咯血不止用人參爲末以雞子清投新汲水攪勻調服

二錢